This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR

QA
302
.W2

ANALYSE
DES MESURES
DES RAPPORTS ET DES ANGLES:
OU
REDUCTION DES INTEGRALES
AUX LOGARITHMES,
ET
AUX ARCS DE CERCLE.

PAR D. C. WALMESLEY, B. A.

A PARIS,
Chez BABUTY Fils, Libraire, Quay des Auguſtins, entre les rues Pavée & Giſt-le-Cœur, à l'Etoile.

M. DCC. LIII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.

ANALYSE

DES MESURES

DES RAPPORTS ET DES ANGLES

&c.

AUX LOGARITHMES,

ET

AUX ARCS DE CERCLE.

A MONSEIGNEUR
LE COMTE
D'ARGENSON,
MINISTRE
ET SÉCRÉTAIRE D'ÉTAT.

MONSEIGNEUR,

LA permiſſion que vous m'avez accordée de faire paroître cet Ouvrage ſous vos auſpices,

eſt un bonheur dont je ne puis être redevable qu'à votre goût pour les Sciences, & à cette bonté, qui ſe fait un devoir d'encourager tous ceux qui les cultivent. Etranger & inconnu, à quel titre pouvois-je aſpirer à un avantage ſi flateur ? Mais vous penſez, MONSEIGNEUR, *que tous ceux qui s'appliquent à augmenter leurs connoiſſances, appartiennent à une même République en quelque lieu que le Ciel les ait fait naître. Ce n'eſt ni le François, ni l'Anglois que vous voyez dans un Ecrivain, mais l'homme utile, ou du moins qui s'efforce de l'être. Quel bonheur pour les Sciences de ſe voir ſous la protection d'un Miniſtre plein de ces principes ? C'eſt en n'admettant point ces diſtinctions de Patrie, qu'un grand homme parvient à rendre ſon*

EPITRE.

Pays la Patrie commune des talens. La France ſçait déja ce qu'elle vous doit dans un autre genre, & n'attribue pas moins les ſuccès de ſes Armes à votre prudence, qu'à la valeur de ſes Guerriers : Que n'a-t'elle pas droit d'attendre de Vous dans cette nouvelle partie du Miniſtére, qui vient de vous être confiée ? L'étendue de vos Lumiéres, cet Eſprit de Gouvernement, qui eſt héréditaire dans votre Illuſtre Maiſon, lui répondent que ſes eſpérances ne ſçauroient être trompées.

Qu'il eſt beau, MONSEIGNEUR, *d'être en même-temps propre & ſupérieur à tous les Emplois, & de réunir des ſoins, qui ont toujours été regardés comme incompatibles ! C'eſt ſervir & honorer doublement*

EPITRE.

l'Etat, dont la tranquillité & la réputation dépendent également de la gloire des Armes, & de celle des Lettres.

J'ai l'honneur d'être,

MONSEIGNEUR,

Votre très-humble & très-obéissant Serviteur,
D. C. WARMESLEY.

PREFACE.

Hist. of Sci.
Petrella
9-6-24
10251

PREFACE.

QUOIQU'IL ſe ſoit écoulé l'eſpace de plus de vingt ans depuis que le Public a vû paroître les fondemens de la Théorie qu'on donne ici, cependant on ne voit point qu'elle ait été reçue par tout avec le ſuccès qu'une Théorie de cette nature ſemble mériter. Je parle ici du Livre de M. CÔTES, intitulé *Harmonia Menſurarum*, publié après ſa mort par M. SMITH, l'an 1722 : ce Livre eſt ſi rare & ſi peu lû, qu'on ſeroit porté à en conclure ſon peu d'importance ; néanmoins ſi on conſulte les Ouvrages d'un petit nombre d'Auteurs qui ont pris la peine de le lire : on trouve non-ſeulement qu'ils

en ont été très-ſatisfaits, mais qu'ils en parlent avec les plus grands Eloges, lui donnant à la vérité le titre d'Ouvrage d'un eſprit, qui impatient de ſuivre les pas des Sçavans qui l'avoient précédés, s'eſt frayé un chemin nouveau qu'il s'eſt contenté de s'ouvrir à lui-même ſans le rendre pratiquable aux autres ; il indique une entrée à ſes découvertes, mais qu'il laiſſe envéloppée d'une grande obſcurité ; il reſſerre ſon Ouvrage dans des bornes ſi étroites, qu'il devient difficile aux Lecteurs les plus attentifs ; & ce qui révolte davantage les eſprits, eſt qu'il débute par des choſes nouvelles ſans deſcendre à une explication ſuffiſante pour en donner une idée diſtincte.

Quoi qu'il en ſoit, pourvû qu'on jette les yeux ſur l'Ouvrage dont nous parlons, on voit à l'inſtant que les ſolutions qu'il donne d'un grand nombre de problêmes, ſont les plus ſimples dans leurs conſtructions qui ayent été données par aucun Géométre précédent, & que les calculs qu'il faudroit faire pour en tirer une valeur déterminée, ſont peu pénibles en comparaiſon de ceux qu'on

à coutume de faire dans les autres méthodes. Cette nouvelle méthode conſiſte à réduire les intégrales qui dépendent des ſections coniques, *aux Meſures des Rapports & des Angles*, & elle doit être regardée comme la plus courte & la plus facile qu'on puiſſe employer dans la Théorie & dans la Pratique : car pour ce qui eſt des meſures des rapports, comme on peut les rapporter aux Logarithmes auxquels elles ſont analogues, & comme les meſures des Angles peuvent être très-commodément exprimés par les arcs de Cercle, il ſuit que dans l'un & l'autre cas pour avoir la valeur d'une intégrale, il ne faut faire autre choſe qu'avoir recours aux Tables des Logarithmes, des Sinus & Tangentes, dans leſquelles prenant le Logarithme du Rapport, ou le nombre des dégrés de l'Angle qu'il faut meſurer, on cherchera le quatriéme terme d'une proportion dont on connoît les trois autres.

On reconnoîtra ſur-tout la facilité & la ſimplicité de cette méthode dans la pratique, en la comparant avec la méthode uſitée de réduire les quantités en ſeries infi-

nies, & de chercher l'intégrale demandée en prenant la ſomme d'un grand nombre de termes, ce que chacun ſçait être d'un long & pénible travail, quelquefois même preſque impoſſible à cauſe de la lenteur de la convergence des ſeries. C'eſt pour cette raiſon que le Célébre Géométre MACLAURIN, donne à ſes Lecteurs l'avis ſuivant (*Tréatiſe of Fluxions*, *art.* 755). » Toutes les fois » qu'on trouve qu'une intégrale ne peut être » exprimée par un nombre fini de termes, » il ne faut pas d'abord avoir recours à une » ſerie infinie; les Arcs de Cercle & les Lo» garithmes ne peuvent être exprimés exa» ctement par une formule Géométrique, » néanmoins on a trouvé des méthodes de » les calculer avec une ſi grande préciſion, » que par leur moyen il eſt facile de me» ſurer tout ce qui ſe rapporte aux aires des » ſections coniques on Arcs de Parabole «.

On ne peut aſſez admirer la méthode de l'Illuſtre M. NEWTON, expoſée dans les excellens Traités, *de Quadraturâ curvarum*, & *Methodus Fluxionum & ſerierum infinitarum*, qui eſt de rapporter autant qu'il eſt

poſſible les intégrales aux aires des ſections coniques, & d'en exprimer la valeur par ces aires regardées comme données : les Tables qu'il a compoſées à ce ſujet, ſont ſi belles & ſi commodes, qu'il ne faut qu'en étudier la Théorie & en faire l'application pour être convaincû de ce que nous avançons ; on voit avec ſurpriſe l'uſage qu'il en a fait par les belles conſtructions qu'il donne d'un grand nombre de problêmes difficiles dans ſon Livre intitulé *Philoſophiæ Naturalis Principia Mathematica*, dont à la vérité il ſupprime le calcul, en choiſiſſant plutôt de les démontrer d'une maniére Géométrique & Synthétique. Il ſembloit qu'à ce dégré de perfection auquel M. NEWTON avoit porté le calcul intégral, on ne pouvoit plus eſpérer d'ajouter quelque choſe ; cependant M. CÔTES ſentit bien que cette méthode & ces conſtructions pouvoient ſe ſimplifier en rappellant les aires des ſections coniques aux meſures des rapports & des angles, ce qu'il exécuta d'abord. Enſuite, non content de s'arrêter-là, il porta ſes vûes beaucoup plus loin, & s'ouvrit

un champ très-vaſte juſques-là inconnu, trouvant moyen de réduire aux ſections coniques, un nombre infini de différentielles qu'on avoit jugé juſqu'alors irréductibles, & ce qu'il n'avoit pû exécuter par les meſures des Rapports ou des Angles ſéparément, il en vint à bout par l'union de toutes les deux. Ce qui donna occaſion à cette derniére découverte, fut une belle propriété qu'il reconnut dans le Cercle; elle lui donna moyen de réſoudre les différentielles complexes dont les dénominateurs ſont binômes, en pluſieurs autres plus ſimples. Il réuſſit auſſi dans la réduction des différentielles complexes dont les dénominateurs contiennent un nombre quelconque de termes; mais ſa méthode pour ces derniéres n'étoit pas ſi générale que celle qu'il avoit trouvée pour les binômes. On peut voir ce même ſujet traité d'une façon différente dans les Ouvrages du Célébre JEAN BERNOULLI *Tome II. N°. CXIV.* mais ſa ſolution quoique très-élégante, n'eſt pas ſi commode que celle de M. CÔTES.

Ce qu'il y a de fâcheux eſt que, dans le

temps

temps que M. Côtes travailloit à cette dernière découverte, qui eſt certainement la partie la plus belle & la plus remarquable de ſa Théorie, une mort prématurée nous enleva ce grand Homme : mais M. Smith, ſon Succeſſeur dans la Chaire de Profeſſeur, eut ſoin de conſerver & d'aſſortir tout ce qu'il avoit laiſſé d'écrits ſur cette matiére ; il trouva néanmoins la Théorie à peine commencée, M. Côtes n'ayant eu que le temps d'en préparer & arranger la matiére : il y mit donc lui-même la derniére main, & l'acheva ſuivant les idées de l'Auteur autant qu'il s'en put inſtruire. Enſuite l'Illuſtre M. de Moivre y tournant ſes Etudes parvint à rendre plus général le Théorême ſur le Cercle dont on a parlé ci-deſſus, & par-là trouva le moyen de réſoudre les cas qui échapoient à la méthode de M. Côtes, comme on peut voir dans ſon Livre intitulé *Miſcellanea Analytica*.

Ayant donc reconnu les avantages de cette méthode, & étant encouragé par des perſonnes que je reſpecte beaucoup, j'ai tâché de développer ſes principes autant qu'il m'a été poſſible, de l'expoſer dans toute ſon étendue,

me ſervant des lumiéres que j'ai tiré des Auteurs ci-devant cités & ſur-tout de MAC-LAURIN : mais comme ce qu'ils nous ont laiſſé ſur ce ſujet eſt écrit d'une maniére trop générale, & que ces grands Hommes ſe ſont contentés d'ouvrir le chemin aux calculs, on a été obligé de les développer & de les continuer à leur but. Les termes de *Meſure de Rapport* & de *Module*, ne cauſeront, je crois, aucune peine aux Lecteurs, après qu'on aura déterminé par des définitions claires les idées qu'on s'en doit former. L'obſcurité dans laquelle M. CÔTES a laiſſé cette Théorie, faiſant que peu de perſonnes peuvent donner le temps néceſſaire pour l'étudier à fond, on s'eſt efforcé d'y apporter les éclairciſſemens qui lui ſembloient convenables : elle ſera peut-être d'autant plus agréable aux Géométres qu'elle a une liaiſon étroite avec ce qui eſt le plus commun dans la Géométrie ; ſçavoir, les rapports & les angles.

J'ai diviſé ce Traité en quatre Parties. La premiére traite des Meſures des Rapports, & enſeigne la maniére de trouver les intégrales par les Logarithmes. La ſeconde traite de la Meſure des Angles, comment on y réduit les

intégrales, en exprimant leurs valeurs par des Arcs de Cercle. La troiſiéme Partie qui a beaucoup plus d'étendue que les deux précédentes, comprend la Théorie des différentielles complexes, & fait voir de quelle maniére on trouve leurs intégrales par le moyen des Logarithmes & des Arcs de Cercle; j'y ai ajouté auſſi la Théorie des cas où la méthode de M. Côtes ne lui donnoit pas ces intégrales, & dont par conſéquent M. Smith n'a point donné de Tables; j'ai calculé ces Tables qui manquoient afin que la ſuite des formes fût complette. Dans la quatriéme & derniére Partie on fait voir la ſimplicité & l'utilité de cette Théorie dans l'application qu'on en a fait aux problêmes de différente eſpéce, comme de la Rectification & de la Quadrature des courbes, & aux problêmes de Mécanique. On trouve dans le calcul intégral de M. Stone, quelques-uns de ces problêmes qui regardent la Rectification & la Quadrature des courbes, qu'il a auſſi réſolu en ſe ſervant des Tables de M. Côtes. Toutes les fois que dans cette application de la Théorie j'ai calculé la valeur des intégrales en nombres, je me ſuis ſervi des

Tables des Logarithmes, des Sinus & Tangentes de M. GARDINER, qui ſont connues pour être les plus exactes & les plus amples.

Comme les Tables des intégrales que M. SMITH compoſa ſur la Théorie de M. CÔTES ſont très-commodes dans la ſolution des problêmes, j'en ai fait voir la conſtruction & l'uſage, & je les ajouterai à la fin de cet Ouvrage, omettant celles que M. CÔTES lui-même avoit compoſé correſpondantes à celles de M. NEWTON, parce qu'elles ne s'étendent qu'aux deux premiéres parties de la Théorie, & qu'elles ſont compriſes dans celles de M. SMITH. On peut voir dans la troiſiéme Partie de quelle maniére on peut continuer ces Tables à l'infini.

Pendant qu'on imprimoit ce Traité, j'ai reçu d'Angleterre un Livre écrit par M. SIMPSON, très-Sçavant Géométre, dont je n'ai pas eû le bonheur d'avoir connoiſſance plutôt à cauſe des fâcheux temps, qui avoient interrompu pendant pluſieurs années toute communication entre les Royaumes: ce Livre contient un excellent morceau ſur cette Théorie; j'en ai fait mention vers la fin de la troiſiéme Partie.

REDUCTION
DES INTEGRALES
AUX LOGARITHMES,
ET
AUX ARCS DE CERCLE.

PREMIERE PARTIE.

De la Réduction des Intégrales aux Logarithmes.

ON a découvert une liaiſon ſi étroite entre les deux progreſſions, la Géométrique & l'Arithmétique, que la connoiſſance de quelque terme dans l'une de ces progreſſions nous conduit d'une maniére aiſée à la connoiſ-

ſance du terme correſpondant dans l'autre, & cela parce que les termes de la progreſſion arithmétique croiſſans uniformément comme les puiſſances des rapports entre le premier & les autres termes de la progreſſion geométrique, déſignent, ou pour mieux dire, meſurent la grandeur de ces puiſſances : de cette analogie nous ſont venus les *Logarithmes*. Mais parce qu'on peut imaginer un nombre infini de progreſſions arithmétiques, & par conſéquent de différentes eſpéces de Logarithmes, qui ſerviroient également pour ces ſortes de meſures, & que même les Logarithmes ne ſont que l'application d'un cas particulier qui eſt celui des nombres, tandis qu'on eſt libre de choiſir d'autres quantités de tel genre qu'on voudroit pour cet uſage : Nous allons donner une méthode générale pour trouver ces ſortes de quantités, que nous appellerons avec M. Côtes, *Meſures des rapports géométriques* ; d'où il ſera facile de retomber ſur les Logarithmes, auxquels on réduira toutes ces meſures.

DES MESURES DES RAPPORTS.

ART. 1. Soit une ſuite de rapports en progreſſion géométrique, $\frac{A}{B} \cdot \frac{A^2}{B^2} \cdot \frac{A^3}{B^3} \cdot \frac{A^4}{B^4}$. &c. Soit auſſi une progreſſion arithmétique qui ait cette forme, $a. 2a. 3a. 4a.$ &c. dans laquelle a repréſente une quantité de telle grandeur & de telle eſpéce qu'on voudra ; ſi on ſuppoſe que a déſigne la meſure du rapport $\frac{A}{B}$, $2a$ ſera la meſure du rapport $\frac{A^2}{B^2}$, $3a$ celle du rapport $\frac{A^3}{B^3}$,

$4a$ celle du rapport $\frac{A^4}{B^4}$, & ainſi de ſuite, de façon que ces meſures ſont proportionnelles aux expoſans des puiſſances des rapports, le rapport doublé a une meſure double, le rapport triplé a une meſure triple, &c. Voilà ce qu'on entend par meſure de rapport, d'où l'on formera la définition ſuivante.

DEFINITION I.

1. LES Meſures des rapports ſont des quantités quelconques en progreſſion arithmétique, qui correſpondent à une ſuite de rapports en progreſſion géométrique, de telle ſorte que ces quantités ſont toujours proportionnelles aux puiſſances des rapports qu'elles meſurent.

2. Ces meſures, comme on voit, ſont plus ou moins grandes ſelon la grandeur de la quantité a, qu'on peut choiſir à volonté; ſi on augmente du double ou du triple la quantité a, toutes les meſures ſeront doubles ou triples de ce qu'elles étoient auparavant; d'où il ſuit que a peut ſervir de module, ou de quantité fixe qui détermine la grandeur de toute la ſuite des meſures: on pourra donc définir le module en cette façon.

DEFINITION II.

LE Module eſt une quantité fixe & conſtante, à laquelle ſe rapportent toutes les meſures des rapports, & qui en détermine la grandeur.

De l'idée qu'on vient de donner des meſures des rapports, on déduira les conſéquences ſuivantes.

3. I. Soit donnée une progreſſion géométrique de cette forme ∴ A. B. C. D. E. F. &c. ſi l'on veut que la quantité *a* meſure le rapport $\frac{A}{B}$, 2*a* ſera la meſure du rapport $\frac{A}{C}$, 3*a* celle de $\frac{A}{D}$, 4*a* celle de $\frac{A}{E}$, & ainſi des autres ; car puiſque par la nature des progreſſions la raiſon de A à C eſt doublée de celle de A à B, c'eſt-à-dire, A². B² :: A. C, & puiſque (par l'Art. 1.) 2*a* eſt la meſure de la raiſon $\frac{A^2}{B^2}$, il meſurera auſſi la raiſon $\frac{A}{C}$; pareillement puiſque A². B² :: A. D, & que 3*a* meſure la raiſon $\frac{A^2}{B^2}$, il meſurera auſſi ſon égale $\frac{A}{D}$; de même on trouve que 4*a* eſt la meſure de $\frac{A}{E}$, & ainſi du reſte.

4. II. De ce qu'on vient de faire voir dans l'article précédent, il eſt aiſé de trouver la meſure du rapport entre deux termes quelconques de la progreſſion ci-deſſus ; car pour avoir la meſure du rapport entre le premier & un autre terme quelconque, il eſt clair qu'il n'y a qu'à prendre la quantité *a* autant de fois qu'il y a de termes avant celui du rapport, qui eſt le dernier dans la progreſſion ; ainſi 4*a* eſt la meſure du rapport $\frac{A}{E}$, parce qu'il y a quatre termes devant E. On trouvera auſſi de la même maniére la meſure du rapport entre deux autres termes quelconques, en ſuppoſant que la progreſſion commence à celui de ces deux termes qui eſt le premier en rang : ainſi pour avoir la meſure du rapport $\frac{C}{F}$, on commencera la progreſſion au terme C de cette façon ∴ C. D. E. F. &c. & puiſque $\frac{C}{D} = \frac{A}{B}$, & qu'il ſe trouve trois termes devant F, 3*a* eſt la meſure du rapport $\frac{C}{F}$.

5. III.

§. III. C'eſt une propriété qu'on ſçait convenir à la progreſſion géométrique & à la progreſſion arithmétique comparées enſemble, que ce qui ſe fait par la multiplication & la diviſion dans la premiére, ſe change en l'addition & la ſouſtraction dans la ſeconde : d'où il ſuit qu'il eſt aiſé d'avoir les meſures des raiſons compoſées ; par exemple, pour avoir la meſure de la raiſon compoſée $\frac{A}{C} \times \frac{A}{E}$, il ne faut qu'ajouter enſemble les meſures, $2a$, $4a$, des raiſons compoſantes, & la ſomme $6a$ ſera la meſure cherchée ; pareillement la meſure de $\frac{A}{D} \times \frac{C}{F}$ eſt $6a$, celle de $\frac{A}{C} \times \frac{B}{E} \times \frac{D}{F}$ eſt $7a$. Cette propriété nous conduit auſſi à une autre méthode très-facile pour trouver la meſure du rapport de deux termes quelconques d'une progreſſion géométrique, & des rapports compoſés de quelque maniére que ce ſoit : ſi on demande la meſure de la raiſon $\frac{B}{F}$, on conſidérera que cette raiſon eſt le produit de toutes les raiſons intermédiaires, en y comprenant auſſi les termes B & F, c'eſt-à-dire, $\frac{B}{F} = \frac{B}{C} \times \frac{C}{D} \times \frac{D}{E} \times \frac{E}{F}$; or comme toutes ces raiſons compoſantes ſont égales, & par conſéquent ont chacune la même meſure ; la ſomme des meſures de ces raiſons, ou la quantité a priſe autant de fois qu'il y a de raiſons compoſantes, ou qu'il y a de termes devant F, en commençant la progreſſion au terme B, donnera la meſure demandée, laquelle par conſéquent eſt $4a$: de même $5a$ eſt la meſure de la raiſon compoſée $\frac{A}{D} \times \frac{C}{E}$, car $\frac{A}{D} = \frac{A}{B} \times \frac{B}{C} \times \frac{C}{D}$, & $\frac{C}{E} = \frac{C}{D} \times \frac{D}{E}$, & la ſomme des meſures de toutes ces raiſons eſt $5a$.

Par ce même principe on trouvera la mesure d'une raison divisée par une autre raison, en ôtant la mesure de la derniére de celle de la premiére ; ainsi la mesure du rapport $\frac{B}{E}$ divisé par $\frac{D}{F}$ est $3a - 2a = a$, celle de $\frac{D}{F}$ divisé par $\frac{B}{E}$ est $2a - 3a = -a$, la mesure d'un rapport divisé par le même rapport est nulle, parce qu'en ôtant la mesure d'elle-même, il ne reste rien ; la mesure de $\frac{C}{E}$ divisée par $\frac{C}{E}$ est $2a - 2a = 0$: & si un rapport composé étoit divisé par un autre rapport composé, on en trouveroit la mesure de la même maniére.

De cet article on peut évidemment conclure que, si la mesure du rapport d'une quantité plus grande à une moindre est supposée positive, celle d'une quantité moindre à une plus grande sera négative, & celle du rapport des quantités égales est nulle.

6. IV. Si on suppose que le second terme B de la progression $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ A. B. C. D. E. F. &c. est égal à une puissance quelconque de A désignée par $1 - \frac{m}{n}$, alors cette progression se changera en celle-ci $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ A. $A^{1-\frac{m}{n}}$. $A^{1-\frac{2m}{n}}$. $A^{1-\frac{3m}{n}}$, &c. or puisque $\frac{A}{A^{1-\frac{m}{n}}} = A^{\frac{m}{n}}$, & $\frac{A}{A^{1-\frac{2m}{n}}} = A^{\frac{2m}{n}}$, &c. il est clair que les exposans des puissances des raisons entre le premier & les termes suivans, composent une progression arithmétique, $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}\frac{m}{n}.\frac{2m}{n}.\frac{3m}{n}.\frac{4m}{n}$.&c. entiérement semblable à la progression des mesures des mêmes raisons $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}a.\ 2a.\ 3a.\ 4a.$ &c. Ces exposans sont donc proportionnels aux mesures, & se trouvent de la même façon ; l'exposant

d'une raiſon compoſée dans cette progreſſion géométrique eſt égal à la ſomme des expoſans de toutes les raiſons compoſantes, l'expoſant d'une raiſon diviſée par une autre eſt l'excès de l'expoſant de la premiére ſur l'expoſant de la ſeconde : ainſi parce qu'on a $\frac{A}{A^{1-\frac{3m}{n}}} = \frac{A}{A^{1-\frac{m}{n}}} \times \frac{A^{1-\frac{m}{n}}}{A^{1-\frac{2m}{n}}} \times \frac{A^{1-\frac{2m}{n}}}{A^{1-\frac{3m}{n}}}$, l'expoſant $\frac{3m}{n}$ de la raiſon $\frac{A}{A^{1-\frac{3m}{n}}} = A^{\frac{3m}{n}}$ eſt la ſomme des expoſans des trois raiſons compoſantes ; c'eſt-à-dire, à cauſe que chacune de ces raiſons eſt égale à $A^{\frac{m}{n}}$, cet expoſant eſt égal à trois fois $\frac{m}{n}$: de ſorte qu'on peut dire en général que comme la ſomme des meſures des raiſons compoſantes donne la meſure de la raiſon compoſée, de même la ſomme des expoſans de ces mêmes raiſons donne l'expoſant de la raiſon compoſée.

7. V. Les mêmes choſes étant ſuppoſées comme dans l'article précédent, on voit que, puiſque les expoſans des puiſſances des raiſons ſont proportionnels aux meſures, ces expoſans peuvent ſervir de meſures aux raiſons ; ainſi la meſure de $\frac{A}{A^{1-\frac{2m}{n}}} = A^{\frac{2m}{n}}$, ſeroit $\frac{2m}{n}$, celle de $\frac{A^{1-\frac{3m}{n}}}{A^{1-\frac{2m}{n}}} = A^{-\frac{m}{n}}$, ſeroit $-\frac{m}{n}$, & de même pour les autres. Maintenant ſi on ſuppoſe que $\frac{m}{n} = -1$, la progreſſion géométrique aura cette forme $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ A. A^2. A^3. A^4. &c. ou ſi on la continue en deſcendant, $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ &c. A^{-3}. A^{-2}. A^{-1} A. A^1. A^2. A^3. &c. & la ſuite des expoſans pourra encore exprimer les meſures des rapports entre les termes : tout cela ſuit clairement de la premiére définition. Mais on

ſçait que les Logarithmes ne ſont autre choſe que cette progreſſion arithmétique, &c. — 3. — 2. — 1. 0. 1. 2. 3. &c. qu'ainſi on peut ſe ſervir des Logarithmes pour meſurer les rapports. Dans les premiers articles pour repréſenter les meſures on a pris la ſuite, *a*. 2*a*. 3*a*. 4*a*. &c. dans laquelle *a* eſt une quantité quelconque, afin de faire voir que les quantités de toute eſpéce, les lignes, les eſpaces, les ſolides, les nombres, &c. peuvent également déſigner ces meſures, pourvû qu'elles correſpondent arithmétiquement aux raiſons géométriques; les Logarithmes ſont donc des meſures numériques des rapports. Or comme les Logarithmes ſont exactement exprimés par les eſpaces hyperboliques, & que c'eſt l'uſage des Logarithmes dans le calcul intégral qui fait une partie principale de notre Théorie, nous allons faire voir en particulier de quelle maniére on trouve les meſures des rapports par le moyen de l'hyperbole, ce qui ſervira auſſi beaucoup pour éclaircir l'idée que nous avons déja donnée de ces meſures.

PROBLÊME I.

8. *TROUVER les meſures des rapports par le moyen de l'hyperbole.*

Pour trouver la meſure d'un rapport donné, on tirera une ligne indéfinie AO, (*Fig.* 1.) ſur laquelle on prendra deux parties AC, AP, qui ayent entr'elles le même rapport que le donné; enſuite du point A on élévera ſur AO la perpendiculaire AG, & prenant AG, AO, pour aſymptotes on décrira

une hyperbole équilatére quelconque Dpc, & ayant mené les ordonnées Pp, Cc, on diviſera la ligne PC en un nombre infini de parties PQ, QR, RS, &c. de telle ſorte qu'on ait la progreſſion géométrique $\dddot{-}$ AP. AQ. AR. AS..... AC; & de tous les points Q. R. S. &c. on menera auſſi les ordonnées Qq, Rr, Ss, &c. cela poſé; tous les petits eſpaces hyperboliques Pq, Qr, Rs, &c. ſont égaux entr'eux; car ſi on ôte les termes de la progreſſion $\dddot{-}$ AP, AQ. AR. AS. &c. les uns des autres, on aura les proportions ſuivantes PQ. AP:: QR. AQ:: RS. AR:: &c. donc $\frac{PQ}{AP} = \frac{QR}{AQ} = \frac{RS}{AR}$ = &c. & en ſuppoſant que le produit ab marque la puiſſance de l'hyperbole, on aura $Pp = Pq \times PQ = \frac{ab \times PQ}{AP}$, de même $Qr = \frac{ab \times QR}{AQ}$, $Rs = \frac{ab \times RS}{AR}$, &c. d'où il eſt évident que tous ces eſpaces ſont égaux, ajoûtant les uns aux autres on formera la progreſſion arithmétique $\dddot{-}$ Pq. Pr. Ps... ... Pc, qui correſpond à la progreſſion géométrique $\dddot{-}$ AP. AQ. AR. AS..... AC, donc cette ſuite d'eſpaces peut exprimer *(par l'art. 3.)* les meſures des rapports entre les termes de cette progreſſion géométrique, Pq ſera la meſure du rapport $\frac{AQ}{AP}$, Pr celle du rapport $\frac{AR}{AP}$, Ps celle de $\frac{AS}{AP}$, & enfin tout l'eſpace PpcC ſera la meſure du rapport $\frac{AC}{AP}$: ou encore puiſque Pq meſure le rapport $\frac{AQ}{AP}$, Qr le rapport $\frac{AR}{AQ}$, Rs le rapport $\frac{AS}{AR}$, &c. & que $\frac{AC}{AP} = \frac{AQ}{AP} \times \frac{AR}{AQ} \times \frac{AS}{AR} \times$ &c. la meſure de $\frac{AC}{AP}$ eſt égale *(par l'art. 5.)* à la ſomme des meſures de toutes ces raiſons; c'eſt-à-dire, égale à l'eſpace PpcC. C. Q. F. T.

$\times$ $Pq = Pp \cdot P\varrho = \frac{ab \cdot P\varrho}{AP}$,

COROLLAIRE I.

9. ON voit donc que l'eſpace hyperbolique qui répond à la différence des termes d'une raiſon quelconque, eſt toujours la meſure de cette raiſon. Qu'on mene une ordonnée BD, & l'eſpace Bp meſurera la raiſon $\frac{AP}{AB}$, l'eſpace Bc meſurera la raiſon $\frac{AC}{AB}$; la meſure de la raiſon d'une quantité à elle-même, par exemple, $\frac{AC}{AC}$, eſt 0.

COROLLAIRE II.

10. IL ſuit de ce qui eſt démontré dans le Problême précédent, que ſi on prend ſur l'aſymptote des parties AB, AP, AC, &c. en progreſſion géométrique, les eſpaces Bp, Bc, &c. formeront une progreſſion arithmétique; donc on pourroit ici rappeller tous les raiſonnemens qu'on a fait dans les articles ci-deſſus, pour expoſer les propriétés & les conſéquences qui ſuivent de l'analogie qui ſe trouve entre ces deux progreſſions; on va appliquer ici à l'hyperbole en peu de mots quelques-uns de ces raiſonnemens, pour rendre plus clair ce qu'on aura à dire ſur ce ſujet dans la ſuite. La meſure d'une raiſon compoſée eſt égale à la ſomme des meſures de toutes les raiſons compoſantes; la meſure de $\frac{AC}{AB} = \frac{AP}{AB} \times \frac{AC}{AP}$ eſt Bp + Pc = Bc, celle de $\frac{AP}{AB} \times \frac{AC}{AB}$ eſt Bp + Bc, celle de $\frac{\overline{AP}^2}{\overline{AB}^2}$ eſt 2Bp, celle de $\frac{\overline{AP}^n}{\overline{AB}^n}$ eſt $n \times$ Bp. Pareillement la meſure d'une raiſon diviſée par une autre raiſon eſt égale à la différence des meſures de ces raiſons ; ainſi la meſure de la raiſon $\frac{AC}{AB}$ diviſée

par $\frac{AP}{AB}$ eſt $Bc - Bp = Pc$, & s'il y avoit un produit de pluſieurs raiſons diviſé par le produit de pluſieurs autres, la meſure de la fraction entiére ſeroit égale à la différence entre la ſomme des meſures de toutes les raiſons qui compoſent le Numérateur, & la ſomme de toutes les raiſons dans le Dénominateur ; ainſi la meſure du rapport d'une quantité plus grande à une moindre étant poſitive, celle du rapport d'une quantité moindre à une plus grande eſt négative, car $\frac{AP}{AC}$ eſt égal à $\frac{AC}{AP}$ diviſé par $\frac{AC^2}{AP^2}$, donc la meſure de $\frac{AP}{AC}$ eſt $Pc - 2Pc = -Pc$. Réciproquement on peut dire que la ſomme de pluſieurs eſpaces hyperboliques eſt la meſure de la raiſon compoſée de toutes les raiſons meſurées par ces eſpaces, ainſi $Bp + Bc$ meſure la raiſon $\frac{AP}{AB} \times \frac{AC}{AB}$; & ſi de la ſomme de pluſieurs eſpaces on ôte la ſomme de pluſieurs autres, la différence ſera la meſure de la raiſon compoſée de toutes les raiſons meſurées par les premiers eſpaces, diviſées par les raiſons que les autres eſpaces meſurent.

COROLLAIRE III.

11. ON voit facilement que ces eſpaces hyperboliques, qui meſurent les rapports, ont une grandeur arbitraire : car entre les aſymptotes AB, AG, (*fig.* 2.) ſoient décrites deux hyperboles équilatéres Dpc, $b\pi k$, & qu'on mene les ordonnées BDb, $P p \pi$; cela poſé, on pourra ſe ſervir de l'eſpace $BDpP$, ou $Bb\pi P$, pour meſurer le rapport $\frac{AP}{AB}$, & en général, ſi on décrivoit entre les mêmes aſymptotes

AB, AG, une infinité d'hyperboles équilatéres, elles pourroient toutes également ſervir pour meſurer les rapports, puiſque les mêmes propriétés leur conviennent à toutes, & qu'on pourroit leur appliquer à chacune tous les raiſonnemens précédens. Mais il faut obſerver que ces meſures ſuivroient la proportion des puiſſances des hyperboles qu'on employeroit : car il eſt démontré dans les Traités des ſections coniques, qu'en tirant deux ordonnées quelconques BDb, P$p\pi$, qui rencontrent deux hyperboles décrites entre les mêmes aſymptotes aux points D, b, p, π, & menant DG, bH, paralléles à l'aſymptote AB, les eſpaces BDpP, B$b\pi$P, ſont entr'eux comme les parallélogrammes AD, Ab, c'eſt-à-dire, comme les puiſſances de ces deux hyperboles ; la démonſtration eſt la même pour toutes les hyperboles qu'on voudroit y ſuppoſer : afin donc de déterminer la grandeur des meſures ſelon les différens cas, on doit (par l'article 2.) ſe ſervir de la puiſſance de l'hyperbole comme module.

COROLLAIRE IV.

12. TOUT ce qu'on a dit dans le Problême & les Corollaires précédens touchant les eſpaces hyperboliques, doit s'entendre des Logarithmes, puiſqu'ils ne ſont autre choſe que ces eſpaces réduits en nombres ; ainſi par tout où il y a *meſure de rapport*, on peut ſubſtituer *Logarithme de rapport*, & nous nous ſervirons ordinairement dans la ſuite de cette façon de parler. Soit donc (*fig.* 2.) AB = 1,

AP

AP=2, AC=3, &c. & l'eſpace B*p* ſera le Logarithme du rapport $\frac{AP}{AB}=\frac{2}{1}$, l'eſpace B*c* le Logarithme de $\frac{AC}{AB}=\frac{3}{1}$, le rapport $\frac{AC}{AB}$ diviſé par $\frac{AP}{AB}$ donne $\frac{AC}{AP}=\frac{3}{2}$, ainſi ôtant le Logarithme de $\frac{2}{1}$ du Logarithme de $\frac{3}{1}$, on aura le Logarithme de $\frac{3}{2}$. Mais parce que ceux, qui ont conſtruit les tables des Logarithmes, ont voulu prendre l'ordonnée BD pour le terme qui ſéparât les Logarithmes poſitifs des négatifs, & ainſi avoir o pour le Logarithme de l'unité; dans ce cas au lieu de dire, les Logarithmes des rapports $\frac{2}{1}$, $\frac{3}{1}$, $\frac{4}{1}$, &c. on peut dire ſimplement, les Logarithmes des nombres, 2, 3, 4, &c.

Il eſt clair auſſi, par ce qui a été démontré dans le Corollaire précédent, qu'on peut avoir un nombre infini de différentes eſpéces de Logarithmes ſelon la grandeur des puiſſances des hyperboles dont on ſe ſert pour leur conſtruction, & que par conſéquent ſi on nomme L le Logarithme d'un nombre quelconque dans une eſpéce, M le module ou la puiſſance de l'hyperbole à laquelle ſe rapporte cette eſpéce, & *m* & *l* le module & le Logarithme du même nombre dans une autre eſpéce, on aura L. M :: *l*. *m*; NEPER en compoſant ſes tables des Logarithmes, ſuppoſa M=1, & de-là par le calcul trouva que le Logarithme du nombre 10 étoit 2, 30258509 &c. mais BRIGGS, pour avoir des Logarithmes plus commodes dans la pratique, choiſit l'unité pour le Logarithme de 10, & par le moyen de la proportion L (2, 30258509 &c.). M (1) :: *l* (1). *m*=0, 43429448 &c. il trouva o, 43429448 &c.

pour ſon module. Cette même proportion fait voir auſſi que les Logarithmes d'une eſpéce ſont toujours en même raiſon que les Logarithmes correſpondans d'une autre eſpéce.

PROBLÊME II.

13. *TROUVER les différentielles logarithmiques des quantités variables.*

Soit AB, a, (*fig.* 2.) BD, b; la variable AP, x; & ſoit tirée la ligne Qq infiniment proche de Pp, & on aura $PQ=dx$, & l'eſpace $PpqQ=\frac{abdx}{x}$, qui eſt la différentielle de l'eſpace $BDpP$ Logarithme du rapport $\frac{AP}{AB}$: ſi on vouloit que BP fût la variable x, alors la différentielle logarithmique du rapport $\frac{AP}{AB}$ auroit cette forme $\frac{abdx}{a+x}$, lorſque AP eſt plus grand que AB, & cette autre $\frac{-abdx}{a-x}$ lorſque AP eſt moindre: mais comme cette différentielle, de même que le Logarithme ſon intégrale, augmente ou diminue (par l'art. 11.) en même raiſon que ſon module ab, en nommant généralement M ce module, la différentielle logarithmique du rapport $\frac{AP}{AB}$ ſera $M\times\frac{dx}{x}$, ou $M\times\frac{dx}{a+x}$, ou $M\times\frac{-dx}{a-x}$. C. Q. F. T.

COROLLAIRE I.

14. SI on réduit la différentielle $\frac{dx}{a+x}$ en ſerie par la diviſion, on trouve $\frac{dx}{a+x}=\frac{dx}{a}-\frac{x\,dx}{a^2}+$

$\frac{x^2dx}{a^3} - \frac{x^3dx}{a^4}$ + &c. & pareillement $\frac{dx}{a-x} = \frac{dx}{a} + \frac{xdx}{a^2} + \frac{x^2dx}{a^3} + \frac{x^3dx}{a^4}$ + &c. donc l'intégrale de $M \times \frac{dx}{a+x}$ eſt $M \times \frac{x}{a} - \frac{x^2}{2a^2} + \frac{x^3}{3a^3} - \frac{x^4}{4a^4}$ + &c. & celle de $M \times \frac{-dx}{a-x}$ eſt $M \times -\frac{x}{a} - \frac{x^2}{2a^2} - \frac{x^3}{3a^3} - \frac{x^4}{4a^4}$ &c. ces deux intégrales donnent le Logarithme de $\frac{AP}{AB}$, ou de AP ſi on ſuppoſe AB = 1.

On doit remarquer ici que, quoique dans ces calculs le module M puiſſe avoir différentes valeurs à l'infini, cependant il eſt toujours le Logarithme d'une raiſon qui ne varie point; car puiſque l'eſpace Bp eſt à l'eſpace Bπ comme le parallélogramme AD eſt au parallélogramme Ab, il s'enſuit que ſi on ſuppoſe Bp = AD, on aura auſſi Bπ = Ab, & la même égalité ſubſiſte à l'égard de toutes les hyperboles qu'on puiſſe imaginer décrites entre les aſymptotes AB, AG; donc le module M ſera égal au Logarithme de la raiſon conſtante $\frac{AP}{AB}$: pour trouver cette raiſon on ſuppoſera AB = 1, & on nommera la variable AP, x; & l'eſpace Bp, z; on aura donc $M \times \frac{dx}{x} = dz$, on ſuppoſera auſſi $x = 1 + Az + Bz^2 + Cz^3 + Dz^4$ + &c. les coefficiens A, B, C, D &c. ſont indéterminés; on a donc $Mdx = xdz = dz + Azdz + Bz^2dz + Cz^3dz + Dz^4dz$ + &c. par conſéquent en prenant les intégrales $Mx = z + \frac{Az^2}{2} + \frac{Bz^3}{3} + \frac{Cz^4}{4} + \frac{Dz^5}{5}$ + &c. + Q, (Q eſt la quantité qu'il faut ajoûter pour rendre l'intégra-

le complette;) de plus on a auſſi $Mx = M + AMz + BMz^2 + CMz^3 + DMz^4 +$ &c; en comparant enſemble les termes correſpondans de ces deux ſuites égales, on trouve $Q = M$, $AM = 1$, $A = \frac{1}{M}$; $BM = \frac{A}{2}$, $B = \frac{1}{2M^2}$; $C = \frac{1}{2 \times 3 \times M^3}$, $D = \frac{1}{2 \times 3 \times 4 \times M^4}$, &c. d'où l'on tire $x = 1 + \frac{z}{M} + \frac{z^2}{2M^2} + \frac{z^3}{2 \times 3 \times M^3} + \frac{z^4}{2 \times 3 \times 4 \times M^4} +$ &c. & en ſuppoſant $z = M$, on aura AP ou $x = 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} +$ &c. $= 2,7182818$ &c. donc le module M eſt le Logarithme de la raiſon invariable $\frac{1}{2,7182818 \text{ &c.}}$: cette raiſon eſt appellée par M. Côtes *la raiſon modulaire.*

COROLLAIRE II.

15. En faiſant attention à ce qu'on a démontré dans le Problême; ſçavoir, que la différentielle logarithmique de $\frac{x}{a}$ eſt $M \times \frac{dx}{x}$, celle de $\frac{a+x}{a}$ eſt $M \times \frac{dx}{a+x}$, celle de $\frac{a-x}{a}$ eſt $M \times \frac{-dx}{a-x}$, on voit que ces différentielles ne ſont autre choſe que, *la différence de la quantité propoſée diviſée par la quantité même & multipliée par le module*; ce qui nous donne une méthode très-facile pour trouver la différentielle logarithmique d'une quantité quelconque. Par exemple, pour avoir la différentielle logarithmique de $\frac{e+fz^n}{e}$, on prendra ſa différence $\frac{nfz^{n-1}dz}{e}$ qu'on

diviſera par $\frac{e+fz^n}{e}$ & qu'on multipliera par M, ce qui donne $M \times \frac{nfz^{n-1}dz}{e+fz^n}$ pour la différentielle cherchée; ainſi en ſuppoſant que L marque le Logarithme de $\frac{e+fz^n}{e}$, on a $dL = M \times \frac{nfz^{n-1}dz}{e+fz^n}$; pareillement la différentielle logarithmique de $\frac{a+z^n}{a-z^n}$ eſt $M \times \frac{2naz^{n-1}dz}{aa-z^{2n}}$; on pourroit auſſi trouver cette derniére différentielle très-facilement par l'art. 10, où nous avons démontré que le Logarithme d'une raiſon diviſée par une autre raiſon eſt égal au Logarithme de la premiére moins le Logarithme de la ſeconde, donc puiſque la raiſon $\frac{a+z^n}{a-z^n}$ eſt égale à la raiſon $\frac{a+z^n}{a}$ diviſée par la raiſon $\frac{a-z^n}{a}$, on prendra la différentielle logarithmique de $\frac{a+z^n}{a} - \frac{a-z^n}{a}$, qui eſt $M \times \frac{nz^{n-1}dz}{a+z^n} + M \times \frac{nz^{n-1}dz}{a-z^n}$, dont la ſomme eſt $M \times \frac{2naz^{n-1}dz}{aa-z^{2n}}$, comme on a trouvé auparavant; & en général la différentielle logarithmique de $\frac{a+z^n}{a-z^n}^{\lambda}$ eſt $M \times \frac{2n\lambda az^{n-1}dz}{aa-z^{2n}}$, ce qui eſt conforme à l'art. 10. où on a démontré que le Logarithme de $\frac{a+z^n}{a-z^n}^{\lambda}$ & par conſéquent auſſi ſa différentielle logarithmique eſt au Logarithme & à la différentielle logarithmique de $\frac{a+z^n}{a-z^n}$ comme λ à 1. Il eſt à pro-

pos de ſe ſervir de l'art. 10. pour trouver les différentielles logarithmiques des quantités compoſées, le calcul en devient plus ſimple & plus facile : ainſi ſoit L le logarithme du produit $x \times y \times z \times u$ &c. & que $l.x, l.y, l.z, l.u$ &c. ſignifient le logarithme de chaque quantité reſpective de ce produit, & on aura $L = l.x + l.y + l.z + l.u +$ &c. Donc par ce Corollaire $dL = M \times \frac{dx}{x} + M \times \frac{dy}{y} + M \times \frac{dz}{z} + M \times \frac{du}{u} +$ &c ; auſſi par le même article & ce corollaire ſi L marque le logarithme de $\frac{x \times y \times z}{s \times t \times u}$ &c. on aura $dL = M \times \frac{dx}{x} + M \times \frac{dy}{y} + M \times \frac{dz}{z}$ &c. $- M \times \frac{ds}{s} - M \times \frac{dt}{t} - M \times \frac{du}{u}$ &c. pareillement la différentielle logarithmique de $\frac{x^n}{a+x \times b+x \times c+x \times \text{&c.}}$ eſt $M \times \frac{ndx}{x} - M \times \frac{dx}{a+x} - M \times \frac{dx}{b+x} - M \times \frac{dx}{c+x} -$ &c. Ces exemples donnent occaſion de faire une remarque digne de notre attention, qui eſt, que par cette maniére d'opérer on réduit les fractions compoſées en pluſieurs fractions ſimples, ce qui peut être d'uſage en pluſieurs cas, comme on verra ci-après.

COROLLAIRE III.

16. On doit conclure de ces calculs que la différentielle logarithmique d'une quantité variable eſt la même, ſoit que cette quantité ſoit multipliée par quelque grandeur conſtante ou non : par le corol-

laire précédent la différentielle logarithmique de x eſt $M \times \frac{dx}{x}$, celle de $\frac{x}{a}$ eſt $M \times \frac{dx}{x}$, celle de bx eſt auſſi $M \times \frac{dx}{x}$. La raiſon de ceci paroîtra claire en décrivant entre les aſymptotes AB, AG, (*fig.* 3.) une hyperbole équilatére Dpc, & prenant ſur l'aſymptote AB, la ligne $AB = 1$, $AE = b$, $AP = x$, & AC telle que AB. AE :: AP. AC, & menant de tous ces points des ordonnées BD, EF, Pp, Cc; car on aura $AC = bx$, l'eſpace hyperbolique BF égal à l'eſpace Pc, & ſi on méne les ordonnées Pq, /2 gk, infiniment proches de Pp, Cc, en ſuppoſant que BD eſt le terme où commencent les logarithmes, la différentielle logarithmique de x eſt Pq différence de l'eſpace Bp, & celle de bx eſt Ck différence de l'eſpace Bc; mais puiſque $Pc = BF$, Pc demeure toujours conſtant: donc on aura $Pq = Ck$, qui eſt ce qu'il falloit prouver. La même choſe ſuit évidemment de l'art. 10. par lequel on a cette équation log. bx = log. b + log. x, donc les différences des deux membres ſont égales, mais la différence du log. b eſt o, puiſque c'eſt une quantité conſtante, donc la différence du log. bx eſt égale à celle du log. x. Ce qu'on vient de dire ſuppoſe que les logarithmes de x & de bx ſont pris dans la même eſpéce; car s'ils ſont de différentes eſpéces, on doit mettre $M \times \frac{bdx}{x}$ pour la différentielle logarithmique de bx,

COROLLAIRE IV.

17. LES différentielles logarithmiques $M \times \frac{dx}{x}$, $M \times \frac{dx}{a+x}$, $M \times \frac{-dx}{a-x}$ peuvent auſſi nous ſervir de formules pour découvrir les intégrales de toutes les différentielles de cette nature ; car puiſque (par l'art. 15.) elles ſont diviſées par les quantités dont elles ſont les différentielles logarithmiques, il s'enſuit que *l'intégrale d'une de ces différentielles eſt le logarithme de la quantité qui la diviſe :* ainſi l'intégrale de $M \times \frac{dx}{x}$ eſt log. x, ou log. $\frac{x}{a}$ (par l'art. 9.) ſi cette intégrale doit s'évanouir lorſque $x = a$, ou en général log. bx par le corollaire précédent, on déterminera la quantité conſtante b en rendant l'intégrale complette ; ſi par exemple cette intégrale devient nulle lorſque $x = 1$, on aura log. $b = 0$, donc $b = 1$, puiſque l'unité a zero pour ſon logarithme (par l'art. 9.) & généralement ſi cette intégrale s'évanouit, lorſque $x = Q$, on aura log. $bQ = 0$, ou $bQ = 1$, & $b = \frac{1}{Q}$: pareillement l'intégrale de $M \times \frac{dx}{a+x}$ eſt log. $a+x$, ou log. $\frac{a+x}{a}$, ou log. $b \times \overline{a+x}$; l'intégrale de $M \times \frac{-dx}{a-x}$ eſt log. $a-x$, ou log. $\frac{a-x}{a}$, ou log. $b \times \overline{a-x}$.

Maintenant pour avoir les modules qui déterminent l'eſpéce de ces logarithmes, on décompoſera les différentielles en cette maniére ; *on multipliera la différentielle*

différentielle donnée par la quantité dont le logarithme est l'intégrale, & on la divisera par la différence de cette quantité, & le quotient sera le module cherché; car qu'on multiplie $M \times \frac{dx}{x}$ par x ou bx, & qu'on le divise par dx ou bdx, le quotient donne le module M: ainsi si on demande l'intégrale de la différentielle $\frac{z^{n-1}dz}{e+fz^n}$ avec son module, par la premiére régle cette intégrale est le logarithme de $\frac{e+fz^n}{e}$, en supposant qu'elle est nulle lorsque $z^n = o$; & par la seconde régle multipliant la proposée par $\frac{e+fz^n}{e}$ & divisant par $\frac{nfz^{n-1}dz}{e}$, on trouve le quotient $\frac{1}{nf}$ égal au module, donc l'intégrale de $\frac{z^{n-1}dz}{e+fz^n}$ est le logarithme de $\frac{e+fz^n}{e}$ au module $\frac{1}{nf}$, qu'on marquera de cette façon $\frac{1}{nf}\left(\frac{e+fz^n}{e}\right)$. Pour trouver l'intégrale de $\frac{z^{-1}dz}{e+fz^n}$, on multipliera le numérateur & le dénominateur par z^{-n}, ce qui donnera $\frac{z^{-n-1}dz}{ez^{-n}+f} = \frac{z^{-1}dz}{e+fz^n}$, par ce moyen cette différentielle se trouve réduite à la même forme que la précédente, si ce n'est que l'exposant n est ici négatif. Donc on trouvera de la même maniére que l'intégrale, qu'on suppose être nulle lorsque $z^{-n} = o$, ou $z^n = \infty$, est $-\frac{1}{ne}\left(\frac{ez^{-n}+f}{f}\right) = -\frac{1}{ne}\left(\frac{e+fz^n}{fz^n}\right)$. La même méthode

nous donne auſſi l'intégrale de la différentielle $\frac{z^{\frac{n}{2}-1}dz}{e-fz^n}$; car $e-fz^n=\sqrt{e}+\sqrt{fz^n}\times\sqrt{e}-\sqrt{fz^n}$, & prenant la différentielle logarithmique de $\frac{\sqrt{e}+\sqrt{fz^n}}{\sqrt{e}-\sqrt{fz^n}}$ & la multipliant par une quantité indéterminée A, on trouve $A\times\frac{\frac{n}{2}\sqrt{f}\times z^{\frac{n}{2}-1}dz}{\sqrt{e}+\sqrt{fz^n}}+A\times\frac{\frac{n}{2}\sqrt{f}\times z^{\frac{n}{2}-1}dz}{\sqrt{e}-\sqrt{fz^n}}$, & la ſomme $A\times\frac{n\sqrt{ef}\times z^{\frac{n}{2}-1}dz}{e-fz^n}$ des deux différentielles doit être ſuppoſée égale à la propoſée $\frac{z^{\frac{n}{2}-1}dz}{e-fz^n}$, ce qui donne $A=\frac{1}{n\sqrt{ef}}$: donc $\frac{z^{\frac{n}{2}-1}dz}{e-fz^n}=\frac{1}{2\sqrt{e}}\times\frac{z^{\frac{n}{2}-1}dz}{\sqrt{e}+\sqrt{fz^n}}+\frac{1}{2\sqrt{e}}\times\frac{z^{\frac{n}{2}-1}dz}{\sqrt{e}-\sqrt{fz^n}}$; or l'intégrale de $\frac{1}{2\sqrt{e}}\times\frac{z^{\frac{n}{2}-1}dz}{\sqrt{e}+\sqrt{fz^n}}$ par ce corollaire eſt égale au logarithme de $\frac{\sqrt{e}+\sqrt{fz^n}}{\sqrt{e}}$ au module $\frac{1}{n\sqrt{ef}}=\frac{1}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}$, & l'intégrale de $\frac{1}{2\sqrt{e}}\times\frac{z^{\frac{n}{2}-1}dz}{\sqrt{e}-\sqrt{fz^n}}$ eſt égale au logarithme négatif de $\frac{\sqrt{e}-\sqrt{fz^n}}{\sqrt{e}}$ au même module, donc l'intégrale totale

de $\frac{z^{\frac{n}{2}-1}dz}{e-fz^n}$ eſt $\frac{1}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}\left(\frac{\sqrt{e}+\sqrt{fz^n}}{\sqrt{e}}\right)-\frac{1}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}\left(\frac{\sqrt{e}+\sqrt{z^n}}{\sqrt{e}}\right)$
$=\frac{1}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}\left(\frac{\sqrt{e}+\sqrt{fz^n}}{\sqrt{e}-\sqrt{fz^n}}\right)$ (par l'art. 10.)

COROLLAIRE V.

18. IL ſuit de ce qu'on vient de dire, qu'on trouvera facilement ces ſortes d'intégrales par les logarithmes de Neper, de Briggs, ou de quelque autre eſpéce que ce ſoit. Soit m le module des tables des logarithmes dont on ſe ſert, L le logarithme véritable qui donne l'intégrale cherchée, l ce logarithme tel qu'on le trouve dans les tables, & M le module de l'intégrale, & l'article 12 nous donne $m . l :: M . L = \frac{M \times l}{m} = Mlr$, en ſuppoſant $\frac{1}{m} = r$: ſi on ſe ſert des tables de Briggs, qui ſont les plus communes, on a $m = 0,434294481\,9$ &c. & $r = 2,302585092\,99$ &c. & ſi on demande l'intégrale de $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e+fz^n}$ qui eſt (par le corol. précédent) $\frac{D}{nf}\left(\frac{e+fz^n}{e}\right)$ D repréſentant ici une quantité donnée, l marquera le logarithme de $\frac{e+fz^n}{e}$ pris dans les tables de Briggs, & on aura $M = \frac{D}{nf}$; en mettant donc ces valeurs dans la formule $\frac{Ml}{m}$ ou Mlr, on aura l'intégrale de-

mandée : si c'étoit l'intégrale de $\frac{Dz^{n-1}dz}{e-fz^n}$ qui est, $\frac{D\sqrt{e}}{ne\sqrt{f}}\left(\frac{\sqrt{e}+\sqrt{fz^n}}{\sqrt{e}-\sqrt{fz^n}}\right)$, qu'on demandoit ; alors on a $M=\frac{D\sqrt{e}}{ne\sqrt{f}}$, & l le logarithme de $\frac{\sqrt{e}+\sqrt{fz^n}}{\sqrt{e}-\sqrt{fz^n}}$, & la formule par le moyen de ces valeurs donne l'intégrale demandée ; il faut faire la même chose pour les autres exemples.

REMARQUE I.

19. SI on veut connoître le point B dans l'asymptote (*fig.* 2.) & l'ordonnée BD, d'où commencent les espaces hyperboliques ou logarithmes, qui expriment la valeur des intégrales dont a parlé dans les articles précédens, par exemple, le terme de l'intégrale de la différentielle $\frac{z^{n-1}dz}{e+fz^n}$, il faudra supposer AB $=a$, BD $=b$, BP $=z^n$, ce qui donnera PQ $=nz^{n-1}dz$, & l'espace $PpqQ=\frac{nabz^{n-1}dz}{a+z^n}$, la comparaison de cette différentielle avec la proposée $\frac{z^{n-1}dz}{e+fz^n}=\frac{1}{f}\times\frac{z^{n-1}dz}{\frac{e}{f}+z^n}$, donnera $nab=\frac{1}{f}$, $ab=\frac{1}{nf}$, & $a=\frac{e}{f}$, d'où l'on tire aussi $b=\frac{1}{ne}$: par conséquent le rapport, dont le logarithme donne l'intégrale de la proposée, est $\frac{\frac{e}{f}+z^n}{\frac{e}{f}}=\frac{e+fz^n}{e}$.

REMARQUE II.

20. TOUT ce que nous avons démontré touchant les eſpaces hyperboliques ou Logarithmes, peut être appliqué à la courbe, qu'on appelle, *Logarithmique*; car on ſçait que les propriétés qui conviennent aux eſpaces hyperboliques, conviennent également aux abſciſſes de l'aſymptote de la logarithmique, que les ordonnées à cette courbe priſes en progreſſion géométrique, coupent les abſciſſes de telle ſorte qu'elles forment une progreſſion arithmétique, & qu'ainſi ces abſciſſes ſont les logarithmes ou meſures des rapports entre les ordonnées, que ces abſciſſes dans différentes courbes logarithmiques ſuivent la proportion des ſoûtangentes de ces courbes; or la ſoûtangente dans chaque logarithmique eſt une quantité conſtante; donc elle doit être cenſée le Module qui détermine la grandeur de ces meſures.

REMARQUE III.

21. CE que nous avons dit juſqu'ici, ſuffit pour faire voir clairement, comment les eſpaces compris entre l'hyperbole & ſes aſymptotes, peuvent être employés pour meſurer les rapports entre les abſciſſes priſes ſur les aſymptotes, ou entre les ordonnées qui bornent ces eſpaces, puiſque ces ordonnées ſont en raiſon réciproque des abſciſſes: De-là il s'enſuit qu'il ne doit reſter preſqu'aucune difficulté touchant les intégrales, qui ſe rapportent aux ſecteurs hyperboliques, ou aux eſpaces compris entre l'hyperbole

& ſes axes, parce que ces eſpaces ne ſont autre choſe que la ſomme ou la différence d'un triangle rectiligne & d'un ſecteur, & le ſecteur eſt égal, comme l'on ſçait, à l'eſpace hyperbolique compris entre deux ordonnées menées des deux extrémités du ſecteur ſur l'aſymptote. Mais parce qu'il ſe trouve beaucoup d'intégrales, qui ſe rapportent immédiatement à ces ſecteurs & eſpaces, & que les ſecteurs hyperboliques ont une grande analogie avec les ſecteurs du cercle, & par conſéquent avec les arcs de cercle; on va expoſer les différens rapports dont ils ſont les meſures, & la maniére de les réduire aux logarithmes, ce qui apportera de l'éclairciſſement à ce qu'on dira dans la ſuite touchant les meſures des angles.

PROBLÈME III.

22. *TROUVER les rapports dont les ſecteurs hyperboliques ſont les meſures ou logarithmes.*

Du centre O (fig. 4.) & des demi-axes OA, AB, qu'on décrive une hyperbole équilatére AP, du centre O à un point quelconque P de l'hyperbole, qu'on tire la droite OP qui coupe AB en D, & du point P l'ordonnée PK à l'axe OA, qui étant prolongée rencontre l'aſymptote OB en I; & des points A & P qu'on tire ſur l'aſymptote les perpendiculaires AH, PQ; cela poſé: le ſecteur OAP eſt égal à l'eſpace HAPQ meſure du rapport $\frac{OQ}{OH}$ ou $\frac{AH}{PQ}$ (par l'art. 8.) mais les triangles ſemblables ABH, PIQ,

donnent AH . PQ :: AB . IP, & par la nature de l'hyperbole $\overline{KI + KP} \times IP = \overline{AB}$, d'où l'on tire KP + KI . AB :: AB . IP, & par la nature des progressions géométriques KI + KP . AB :: $\sqrt{KI + KP}$. $\sqrt{IP}$; donc AH . PQ :: $\sqrt{KI + KP}$. $\sqrt{IP}$. de plus à cause des triangles semblables OAD, OKP, & OAB, OKI, on trouve AB . AD :: KI . KP, d'où l'on tire AB + AD . AB :: KI + KP . KI, & AB — AD . AB :: IP . KI, & ces deux proportions donnent cette autre AB + AD . AB — AD :: KI + KP . IP ; donc on aura $\sqrt{AB + AD} . \sqrt{AB - AD}$ :: AH . PQ : d'où l'on voit que si on nomme OA ou AB, a ; AD, x ; OK, y ; OQ, v ; OH, c, on aura l'égalité des raisons suivantes, $\frac{v}{c} = \frac{a}{y - \sqrt{yy - aa}} = \frac{y + \sqrt{yy - aa}}{a} = \sqrt{\frac{y + \sqrt{yy - aa}}{y - \sqrt{yy - aa}}} = \sqrt{\frac{a + x}{a - x}}$, dont la mesure commune est le secteur OAP, ou ce qui est la même chose, le secteur OAP est le logarithme de chacune de ces raisons au module $\frac{aa}{2}$ valeur du triangle OAB qui est égal à la puissance de l'hyperbole. *C. Q. F. T.*

COROLLAIRE I.

23. MENANT la droite Op infiniment proche de OP, qui coupe AD en q, & tirant sur Op la perpendiculaire Dm, on formera deux triangles semblables OAD, Dmq, qui donneront, OD ($\sqrt{aa + xx}$).

$OA\ (a) :: Dq\ (dx) . Dm = \frac{a\,dx}{\sqrt{aa+xx}}$, & $\frac{Dm \times OD}{2}$ $= \frac{a^2 dx}{2} = DOq$: mais DOq est à POp différence du secteur OAP, comme $\overline{OD}^2$ est à $\overline{OP}^2$, ou comme $\overline{OA}^2$ à $\overline{OK}^2$; mais puisque $\overline{OA}^2 . \overline{OK}^2 :: \overline{AD}^2 . \overline{KP}^2$, & que par la nature de l'hyperbole $\overline{KP}^2 = \overline{OK}^2 - \overline{OA}^2$, on aura $\overline{OA}^2 . \overline{AD}^2 :: \overline{OK}^2 . \overline{OK}^2 - \overline{OA}^2$, ce qui donne $\overline{OA}^2 - \overline{AD}^2 . \overline{OA}^2 :: \overline{OA}^2 . OK^2$; donc $DOq . POp :: \overline{OA}^2 - \overline{AD}^2 . \overline{OA}^2$, ou $\frac{a\,dx}{2} . POp ::$ $aa - xx . aa$, & $POp = \frac{a^2 dx}{2 \times aa - xx}$, qui est la différence du secteur OAP qu'on trouve en se servant de la tangente AD, & dont l'intégrale (par l'art. précédent) est le Logarithme de $\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}$ au module $\frac{aa}{2}$, c'est-à-dire $\frac{aa}{2}\left(\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}\right) = \frac{aa}{4}\left(\frac{a+x}{a-x}\right)$, car par l'art. 10. les Logarithmes sont proportionnels aux puissances des quantités dont ils sont les Logarithmes, & il revient au même de multiplier le Logarithme ou son module par une quantité quelconque, ainsi au lieu de $M\left(\frac{\overline{a+x}^{\lambda}}{\overline{a-x}^{\lambda}}\right)$ on peut mettre $_{\lambda}M\left(\frac{a+x}{a-x}\right)$, & réciproquement.

Ce qu'on vient d'exposer fait découvrir l'intégrale de la différentielle générale $\frac{Dz^{\overline{n}-1}\,dz}{e - fz^n}$ ou

Dz

$\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{f\times\frac{e}{f}-z^n}$; car en comparant cette différentielle à celle-ci $\frac{a^3dx}{2\times aa-xx}$, on voit que pour les rendre semblables, on n'a qu'à supposer $a=\sqrt{\frac{e}{f}}$, $x=z^{\frac{n}{2}}$, ce qui donne $\frac{ne}{4f}\sqrt{\frac{e}{f}}\times\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{\frac{e}{f}-z^n}=\frac{a^3dx}{2\times aa-xx}$ dont l'intégrale est $\frac{De}{2f}\left(\sqrt{\frac{\sqrt{\frac{e}{f}}+z^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\frac{e}{f}}-z^{\frac{n}{2}}}}\right)$; or la différentielle $\frac{ne}{4f}\sqrt{\frac{e}{f}}\times\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{\frac{e}{f}-z^n}$ divisée par $\frac{ne}{4}\sqrt{\frac{e}{f}}$ donne la proposée $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{f\times\frac{e}{f}-z^n}$, & par conséquent son intégrale est $\frac{2D}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}\left(\sqrt{\frac{\sqrt{\frac{e}{f}}+z^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\frac{e}{f}}-z^{\frac{n}{2}}}}\right)$ ou $\frac{D}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}\left(\frac{\sqrt{\frac{e}{f}}+z^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\frac{e}{f}}-z^{\frac{n}{2}}}\right)$, ou enfin $\frac{D}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}\left(\frac{\sqrt{e}+\sqrt{fz^n}}{\sqrt{e}-\sqrt{fz^n}}\right)$, qui est la même qu'on a trouvé art. 17.

COROLLAIRE II.

24. Si dans la différentielle $\frac{a^3dx}{2\times aa-xx}$ il arrive

que x ſoit plus grand que a, alors le rapport $\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}$ devient impoſſible, & par conſéquent auſſi ſon logarithme qui donne la valeur de l'intégrale, & le cas demeure le même en ſe ſervant du rapport $\frac{a+x}{a-x}$ délivré du ſigne radical, parce que ce rapport étant une quantité négative, ſon logarithme eſt encore impoſſible : dans ce cas il faut du centre O élever la ligne OE parallèle & égale à AB, & mener parallélement à OA la ligne EF qui rencontre AP prolongée en F ; cela fait, la droite EF ſera égale à x, car à cauſe des triangles ſemblables OAD, OEF, on aura $OA + AD . OA - AD :: EF + OE . EF - OE$, donc $\sqrt{\frac{OA+AD}{OA-AD}} = \sqrt{\frac{EF+OE}{EF-OE}} = \sqrt{\frac{EF+OA}{EF-OA}} = \sqrt{\frac{a+x}{a-x}}$; or le rapport $\sqrt{\frac{EF+OA}{EF-OA}}$ eſt réel, & auſſi ſon logarithme qui donnera par conſéquent l'intégrale demandée : il eſt même évident à cauſe de la proportion $AD . AB :: OE (AB) . EF$, que lorſque AD eſt moindre ou plus grande que AB, AB eſt auſſi moindre ou plus grande que EF, & qu'ainſi lorſque l'un des deux rapports $\sqrt{\frac{OA+AD}{OA-AD}}$, $\sqrt{\frac{EF+OA}{EF-OA}}$, eſt impoſſible, l'autre eſt néceſſairement réel. L'une des valeurs de x étant connue, il eſt facile de trouver l'autre, puiſque AB ou a eſt moyen proportionnel entre ces deux valeurs. De plus on doit remarquer que, puiſqu'on a toujours

$\sqrt{\frac{OA+AD}{OA-AD}} = \sqrt{\frac{EF+OA}{EF-OA}}$, on peut se servir de celui de ces deux rapports qui est impossible sans faire aucune réduction, car il est évident qu'en prenant son logarithme comme s'il étoit réel, on aura celui qu'on cherche. Ce qu'on vient de dire dans ce corollaire doit aussi être appliqué de la même maniére à la différentielle générale $\frac{Dz^{n-1}dz}{e-fz^n}$.

COROLLAIRE III.

25. QU'ON tire une droite OA (*fig.* 5.) égale au semi-axe OA de l'hyperbole, & du centre O & du rayon OA qu'on décrive une demi circonférence de cercle ALB, ensuite prenant OC égale à la tangente AD, on menera l'ordonnée CL & le rayon OL, & on aura AC. CL :: CL . CB, ou plutôt, puisque AC = LO − OC, & CB = LO + OC, LO − OC . CL :: CL . LO + OC, & par la nature des progressions géométriques LO − OC. CL :: CL . LO + OC :: $\sqrt{LO-OC}$. $\sqrt{LO+OC}$, ce qui donne $\sqrt{\frac{LO+OC}{LO-OC}}$ ou $\sqrt{\frac{AO+AD}{AO-AD}} = \frac{LO+OC}{CL} = \frac{CL}{LO-OC}$; d'où il suit qu'en nommant OA ou LO, R; OC ou AD, T; CL, S = $\sqrt{RR-TT}$, le secteur OAP (par l'art. 23.) sera égal à $\frac{RR}{2}\left(\frac{R+T}{S}\right)$ ou $\frac{RR}{2}\left(\frac{S}{R-T}\right)$. Ces valeurs sont réelles, comme nous avons

vû, lorſque R eſt plus grand que T : mais lorſque R eſt moindre que T, & qu'on veut ſe ſervir d'un rapport réel, il faut outre la conſtruction précédente tirer la tangente L T qui rencontre le diamétre en T (*fig. 6.*), & à cauſe des triangles ſemblables OCL, LOT, on aura CO . LO :: LO . OT, ce qui donne $OT = EF$ (*fig. 4 & 6.*) & $\frac{LO+OC}{CL} = \frac{LO+OT}{LT}$, auſſi $\frac{CL}{LO-OC} = \frac{LT}{OT-LO}$; donc en nommant OA, R; OT, T; LT, $S = \sqrt{TT-RR}$, le ſecteur OAP ſera égal à $\frac{RR}{2}\left(\frac{R+T}{S}\right)$, ou $\frac{RR}{2}\left(\frac{S}{T-R}\right)$ qui ſont des valeurs réelles. On aura ſouvent beſoin dans la ſolution des Problêmes des réductions des rapports dont on vient de parler. Suppoſant donc $R = \sqrt{\frac{e}{f}}$, $T = z^{\frac{n}{2}}$, ou $T = \frac{e}{fz^{\frac{n}{2}}}$, ſelon que $z^{\frac{n}{2}}$ eſt moindre ou plus grand que $\sqrt{\frac{e}{f}}$, $S = \sqrt{\frac{fz^n-e}{f}}$, ou $S = \sqrt{\frac{e\times z-fz^n}{fz^{\frac{n}{2}}}}$, on peut exprimer l'intégrale de $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e-fz^n}$ qu'on a trouvé article 23. de cette façon $\frac{2D}{ne}R\left(\frac{R+T}{S}\right)$, ou $\frac{2D}{ne}R\left(\frac{S}{R-T}\right)$ lorſque $z^{\frac{n}{2}}$ eſt moindre que $\sqrt{\frac{e}{f}}$, & $\frac{2D}{ne}R\left(\frac{S}{T-R}\right)$ lorſqu'il eſt plus grand.

Ce Corollaire fait voir qu'on peut exprimer les

intégrales de toutes les différentielles réduites à cette forme $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e-fz^n}$ par le logarithme du rapport entre les trois côtés d'un triangle rectangle ; c'eſt de cette façon de marquer les intégrales, dont ſe ſervit M. Côtes dans les premiéres tables qu'il compoſa à ce ſujet.

COROLLAIRE IV.

26. De ce que le ſecteur OAP eſt égal à l'eſpace HAPQ, il ſuit que leurs différences ſont auſſi égales, donc nommant OQ, v ; OH, c ; la puiſſance de l'hyperbole étant $\frac{aa}{2}$, ou aura $\frac{aa}{2} \times \frac{dv}{v} = \frac{a^3 dx}{2 \times aa - xx}$; or le dernier Problême nous donne un moyen facile pour la réduction de la différentielle $\frac{a^3 dx}{2 \times aa - xx}$ à cette forme ſimple $\frac{aa}{2} \times \frac{dv}{v}$; car par ce qui y eſt démontré, il faut pour cela ſuppoſer $\frac{v}{c} = \sqrt{\frac{a+x}{a-x}}$, ce qui donne $\frac{dv}{v} = \frac{a\,dx}{aa - xx}$, & $\frac{aa}{2} \times \frac{dv}{v} = \frac{a^3 dx}{2 \times aa - xx}$. De-là on voit qu'on n'a qu'à généralement ſuppoſer $\frac{v}{c} = \sqrt{\frac{\sqrt{\frac{e}{f}} + z^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\frac{e}{f}} - z^{\frac{n}{2}}}}$, ou plus ſimplement $v = \frac{\sqrt{\frac{e}{f}} + z^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\frac{e}{f}} - z^{\frac{n}{2}}}$, & on aura $\frac{dv}{v} = n\sqrt{\frac{e}{f}} \times \frac{z^{\frac{n}{2}-1}dz}{\frac{e}{f} - z^n}$, & puiſque le modu-

le eſt $\frac{e}{2f}$, ſi on multiplie les deux différentielles par $\frac{e}{2f} \times \frac{2D}{ne}\sqrt{\frac{f}{e}} = \frac{D}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}$, on trouve $\frac{D}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}} \times \frac{dv}{v} = \frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e-fz^n}$.

COROLLAIRE V.

27. NON ſeulement le dernier Problême fournit une méthode facile pour réduire à une expreſſion logarithmique très-ſimple la différentielle du ſecteur AOP, lorſque cette différentielle eſt tirée de la tangente, mais auſſi lorſqu'elle dépend du calcul de l'ordonnée & de l'abſciſſe qui répondent à ce ſecteur; & par ce même Problême on réduit aux logarithmes toutes les intégrales qui ſe rapportent aux eſpaces compris entre l'hyperbole & ſes axes. Soit tirée l'ordonnée pk infiniment proche de PK, & les valeurs des lignes étant ſuppoſées les mêmes que dans le Problême, le triangle OPK eſt égal à $\frac{y}{2}\sqrt{yy-aa}$, dont la différence eſt $\frac{dy\sqrt{yy-aa}}{2} + \frac{yydy}{2\sqrt{yy-aa}}$ égale à la ſomme des eſpaces POp, KPpk, donc en retranchant l'eſpace KPpk ou $dy\sqrt{yy-aa}$, il reſtera $\frac{-yydy}{2\sqrt{yy-aa}} - \frac{dy\sqrt{yy-aa}}{2} = \frac{aady}{2\sqrt{yy-aa}}$ pour la valeur de POp; par conſéquent l'intégrale de $\frac{aady}{2\sqrt{yy-aa}}$ par le Problême eſt $\frac{aa}{2}\left(\frac{y+\sqrt{yy-aa}}{a}\right)$, ou

$\frac{aa}{2}\left(\frac{a}{y-\sqrt{yy-aa}}\right)$ ou $\frac{aa}{2}\left(\sqrt{\frac{y+\sqrt{yy-aa}}{y-\sqrt{yy-aa}}}\right)$. Maintenant pour réduire la différentielle $\frac{aady}{2\sqrt{yy-aa}}$ à une expreſſion logarithmique ſimple, on voit qu'elle doit être égale à la différentielle logarithmique de $\frac{v}{c}$, comme en effet ſuppoſant $\frac{v}{c}=\frac{y+\sqrt{yy-aa}}{a}$, on trouve $\frac{dv}{v}=\frac{dy}{\sqrt{yy-aa}}$, & $\frac{aa}{2}\times\frac{dv}{v}=\frac{aady}{2\sqrt{yy-aa}}$; pareillement ſi on ſuppoſoit $\frac{v}{c}=\frac{a}{y-\sqrt{yy-aa}}$, ou $\frac{v}{c}=\sqrt{\frac{y+\sqrt{yy-aa}}{y-\sqrt{yy-aa}}}$, on trouveroit encore $\frac{aa}{2}\times\frac{dv}{v}=\frac{aady}{2\sqrt{yy-aa}}$.

Pour revenir aux intégrales, ſi on nomme T le triangle OPK, l'eſpace APK ou l'intégrale de $dy\sqrt{yy-aa}$, par ce qu'on a dit dans ce corollaire, eſt égale à $T-\frac{aa}{2}\left(\frac{y+\sqrt{yy-aa}}{a}\right)$, ou &c.

Pour étendre davantage ce corollaire, qu'on ſuppoſe $a=\sqrt{\frac{e}{f}}$, $y=z^{\frac{n}{2}}$, & l'on trouve $\frac{aady}{2\sqrt{yy-aa}}=\frac{ne}{4\sqrt{f}}\times\frac{z^{\frac{n}{2}-1}dz}{\sqrt{fz^n-e}}$, donc l'intégrale de cette nouvelle différentielle ſera $\frac{e}{2f}\left(\frac{\sqrt{fz^n}+\sqrt{fz^n-e}}{\sqrt{e}}\right)$, ou $\frac{e}{2f}\left(\frac{\sqrt{e}}{\sqrt{fz^n}-\sqrt{fz^n-e}}\right)$, ou $\frac{e}{2f}\left(\sqrt{\frac{\sqrt{fz^n}+\sqrt{fz^n-e}}{\sqrt{fz^n}-\sqrt{fz^n-e}}}\right)$, ou enfin $\frac{e}{4f}\left(\frac{\sqrt{fz^n}+\sqrt{fz^n-e}}{\sqrt{fz^n}-\sqrt{fz^n-e}}\right)$; d'où l'on déduira facilement l'intégrale de la diffé-

rentielle générale $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{\sqrt{fz^n-e}}$, qui ſera $\frac{2D}{n\sqrt{f}}\left(\frac{\sqrt{fz^n}+\sqrt{fz^n-e}}{\sqrt{e}}\right)$, ou &c. & de même celle de $Dz^{\frac{n}{2}-1}dz\sqrt{fz^n-e}$ ſera $\frac{2D\sqrt{f}}{n}T-\frac{De}{n\sqrt{f}}\left(\frac{\sqrt{fz^n}+\sqrt{fz^n-e}}{\sqrt{e}}\right)$, ou &c. De cette maniére, ſi du point P on tire ſur le ſecond axe la perpendiculaire PM, l'eſpace OAPM étant égal à la ſomme du ſecteur OAP & du triangle OPM ou OKP, on en trouvera la valeur en logarithmes, ce qui donnera l'intégrale de $\frac{yydy}{\sqrt{yy-aa}}$, ou de $\frac{n\sqrt{f}}{2}\times\frac{z^{\frac{3n}{2}-1}dz}{\sqrt{fz^n-e}}$ différence de l'eſpace OAPM. On trouvera donc la valeur des intégrales de tous ces corollaires par l'article 18.

REMARQUE.

28. DANS le dernier Corollaire on a ſuppoſé $\frac{v}{c}=\frac{y+\sqrt{yy-aa}}{a}$ & $\frac{v}{c}=\frac{a}{y-\sqrt{yy-aa}}$, leſquelles expreſſions peuvent être réduites à de plus ſimples; car puiſque (par l'art. 16.) on trouve la même différentielle logarithmique d'une quantité variable ſoit qu'elle ſoit multipliée par une grandeur conſtante ou non; il s'enſuit qu'on aura la même différentielle qu'on a trouvée dans le corollaire, ſi on ſuppoſe ſimplement $v=y+\sqrt{yy-aa}$, & $v=\frac{1}{y-\sqrt{yy-aa}}$,

ou

ou $y = \frac{aa+vv}{2v}$, & $y = \frac{1+aavv}{2v}$; ceci a lieu auſſi dans l'article 26.

COROLLAIRE VI.

29. OUTRE qu'on a vû dans les corollaires précédens, comment on peut par le moyen du dernier Problême transformer les différentielles complexes en d'autres très-ſimples, il ne ſera pas inutile d'obſerver que le même Problême ſert encore à transformer des différentielles complexes en d'autres de différente eſpéce, & de les délivrer du ſigne radical, ou réciproquement: ainſi ſi on vouloit changer la différentielle $\frac{dy}{\sqrt{yy-aa}}$ en une autre qui n'eût pas le ſigne radical, en prenant l'équation $\sqrt{\frac{y+\sqrt{yy-aa}}{y-\sqrt{yy-aa}}} = \sqrt{\frac{a+x}{a-x}}$ on trouve $x = \frac{a}{y}\sqrt{yy-aa}$, $y = \frac{aa}{\sqrt{aa-xx}}$, ce qui donne $dy = \frac{aaxdx}{aa-xx^{\frac{1}{2}}}$, $\sqrt{yy-aa} = \frac{ax}{\sqrt{aa-xx}}$, & $\frac{dy}{\sqrt{yy-aa}} = \frac{adx}{aa-xx}$.

REMARQUE.

30. DANS les calculs des articles précédens nous nous ſommes toujours ſervis de l'hyperbole équilatére, parce qu'elle eſt la plus ſimple, & que toutes les autres hyperboles peuvent y être réduites: car des demi-axes conjugués OA, OH, (*fig.* 7.) ſoit décrite une hyperbole quelconque AC, & qu'on

mene au premier axe une ordonnée CK, & la droite OC ; ſoit décrite auſſi des demi-axes égaux OA, OB, une hyperbole équilatére AP, qui rencontre l'ordonnée CK prolongée en P, & qu'on tire OP ; cela poſé, on ſçait par ce qui eſt démontré dans les traités des ſections coniques, que les eſpaces AKC, AKP, & les ſecteurs OAC, OAP, ſont entr'eux dans la raiſon conſtante de KC à KP ou de OH à OB. Pareillement des demi-axes conjugués OG, OB, ſoit décrite (*fig.* 8.) une hyperbole quelconque GC, & qu'on mene au ſecond axe OB l'ordonnée CK, & qu'on tire OC ; ſoit auſſi décrite des demi-axes égaux OB, OA, une hyperbole équilatére AP qui rencontre en P l'ordonnée CK, qu'on tire auſſi OP ; & les eſpaces OGCK, OAPK, & les ſecteurs OGC, OAP, ſont dans la raiſon conſtante de OG à OA : donc les ſecteurs & eſpaces compris entre les hyperboles & leurs axes ont un rapport donné avec ceux de l'hyperbole équilatére ; d'où il ſuit que leurs différentielles s'exprimeront par les mêmes formules générales $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e-fz^n}$, $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{\sqrt{fz^n-e}}$, & leurs valeurs par les intégrales de ces formules.

Qu'on décrive (*fig.* 9.) une hyperbole quelconque AF qui ait pour premier demi-axe la ligne OA, & pour aſymptote la ligne OK ; qu'on décrive auſſi une hyperbole équilatére AP ſur le même demi-axe, & dont l'aſymptote eſt OQ ; du ſom-

met A qu'on tire la tangente commune AB, qui rencontre les deux asymptotes en E & B, & si on prend des abscisses égales OD, OC, & OQ, OK, & qu'on mene aux courbes respectives les ordonnées DG, CH, QP, KF, on peut démontrer que les espaces CHFK, DGPQ, sont entr'eux dans la raison constante du triangle OAE au triangle OAB, ou de AE à AB; par conséquent la différentielle $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e+fz^n}$ sert d'expression générale aux différences des espaces compris entre les hyperboles & leurs asymptotes de telle espéce que soient les hyperboles, & les différentes intégrales de cette différentielle donneront en logarithmes les valeurs de ces espaces.

Fin de la premiére Partie.

SECONDE PARTIE
DE LA
REDUCTION
DES INTEGRALES
AUX ARCS DE CERCLE.

APRES avoir parlé des différentielles les plus ſimples dont les intégrales ſe réduiſent aux Logarithmes, il reſte maintenant à parler de celles dont les intégrales peuvent s'exprimer par des Arcs de cercle ; enſuite on donnera une méthode pour transformer en ces différentielles ſimples, celles qui ſont compoſées.

La circonférence du cercle a été de tout temps regardée par les Géométres comme la plus convenable entre les lignes droites ou courbes pour meſurer les angles, & cela pour cette raiſon que les arcs de cette courbe (le cercle étant donné) ſont toujours comme les grandeurs des angles ; c'eſt cette analogie qui fournit une méthode facile, lorſque l'un des deux, l'angle ou l'arc, eſt connu, de dé-

couvrir l'autre : or puiſque les angles ſe trouvent très-commodément par les tables des Sinus & Tangentes, lorſque les Sinus ou Tangentes en ſont connus, il s'enſuit qu'on parviendra d'une maniére aiſée & expéditive à la connoiſſance de la grandeur abſolue des arcs qui meſurent ces angles. Pour cette raiſon on va conſidérer les arcs de cercle comme les meſures des angles, & de-là on déduira les intégrales des différentielles dont il s'agit ici.

DES MESURES DES ANGLES.

PROBLÊME I.

31. *TROUVER la meſure d'un angle.*

Soit propoſé un angle quelconque AOC (*fig.* 10.) dont on demande la meſure. Du centre O & du rayon OA pris à volonté ſoit décrite une portion de circonférence de cercle ACB qui coupe OC en C, ſoit mené le rayon O*c* infiniment proche de OC, & ayant prolongé OC & O*c* juſqu'à ce qu'elles rencontrent la tangente AD élevée du point A en D & *q*, on tirera ſur O*q* la perpendiculaire D*m*, & nommant OA, *a*; AD, *x*; les triangles ſemblables OAD, D*mq* donneront OD . OA :: D*q* . D*m*, & les petits ſecteurs CO*c*, DO*m* donneront OD . OC (OA) :: D*m* . C*c*; en multipliant enſemble ces deux proportions, on trouve $\overline{OD}^2(aa+xx)$. $\overline{OA}^2$ (aa) :: D*q* (dx) . C*c* $= \frac{aadx}{aa+xx}$: mais C*c* eſt la différence de l'arc AC, donc l'intégrale de

$\frac{aadx}{aa+xx}$ donnera l'arc AC qui eſt la meſure de l'angle propoſé AOC. *C. Q. F. T.*

COROLLAIRE I.

32. AVANT que de tirer les conſéquences que fournit ce Problême, il eſt à propos de l'éclaircir en peu de mots. On voit que la grandeur de l'arc AC, qui meſure l'angle AOC, eſt arbitraire, & qu'on peut, en prenant des rayons de différentes longueurs, décrire une infinité de circonférences, dont les arcs compris entre les droites OA, OC, pourroient chacun également ſervir de meſure à l'angle AOC, de même qu'on a vû art. 11. qu'il y a une infinité d'eſpaces hyperboliques de différentes grandeurs, qui ſont tous les meſures d'une même raiſon : c'eſt pourquoi pour ne pas être dans le cas de trouver des intégrales indéterminées, il faut ſe ſervir de quelque module pour déterminer lequel de tous les arcs poſſibles d'être inſcrits dans le même angle eſt celui que demande l'état de la queſtion, puiſque c'eſt la longueur des arcs, & non la grandeur des angles, qui donne la valeur des intégrales cherchées ; on doit imiter en cela les anciens Géométres qui, pour fixer leurs idées touchant la grandeur des angles, trouvoient qu'il étoit néceſſaire de diviſer toutes les circonférences de Cercle en un nombre égal de parties ſans avoir égard à la différente longueur des circonférences : or puiſque les arcs ſemblables ſont en même raiſon que les rayons,

& que le rayon eſt la ligne la mieux connue dans le cercle, & entre dans tous les calculs qui regardent cette courbe, il eſt à propos qu'on le choiſiſſe pour le module auquel doivent ſe rapporter toutes les meſures des angles, d'autant plus que dans ce cas on trouve, comme on verra ci-après, les meſures des angles tout à fait analogues aux meſures des raiſons & les expreſſions ſemblables. On doit donc conclure de ce qu'on vient de dire que l'arc AC eſt la meſure de l'angle AOC au module ou au rayon a, c'eſt l'intégrale de la différentielle $\frac{aadx}{aa+xx}$, on marquera cette intégrale de la ſorte $a\,(AOC)$, comme on a fait pour les meſures des rapports : ainſi cette expreſſion $a\,(AOC)$ ſignifie l'arc qui meſure l'angle AOC, lequel arc eſt décrit du rayon a. Maintenant par le moyen de cette formule $\frac{aadx}{aa+xx}$, on trouvera facilement l'intégrale de la différentielle générale $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e+fz^n}$; car ſuppoſant $a=\sqrt{\frac{e}{f}}$, $x=z^{\frac{n}{2}}$, on trouve $\frac{aadx}{aa+xx}=\frac{ne}{2}\times\frac{z^{\frac{n}{2}-1}dz}{e+fz^n}$, dont l'intégrale, comme on vient de voir, eſt $\sqrt{\frac{e}{f}}\,(AOC)$; par conſéquent l'intégrale de $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e+fz^n}$ eſt $\frac{2D}{ne}\times\sqrt{\frac{e}{f}}\,(AOC)$, c'eſt-à-dire, égale à la quantité

$\frac{2D}{ne}$ multipliée par l'arc AC décrit du rayon $\sqrt{\frac{e}{f}}$ & dont la tangente est $z^{\frac{n}{2}}$, ou ce qui revient au même, puisque les arcs ſemblables ſont proportionnels aux rayons, cette intégrale eſt égale à l'arc décrit du rayon $\frac{2D}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}$, & dont le rayon eſt à la tangente comme $\sqrt{\frac{e}{f}}$ à $z^{\frac{n}{2}}$: généralement on dit que l'expreſſion $\frac{2D}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}$ (AOC) eſt la meſure de l'angle AOC au module $\frac{2D}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}$.

COROLLAIRE II.

33. L'ON ſçait que le rayon du cercle eſt à la demi-circonférence, comme 1 à 3, 1415926535 &c. donc ſi on nomme R le rayon on aura cette proportion, 3, 1415926535 &c.. 1 :: 180 dégrés. R = 57, 2957795130 &c. dégrés, ou 57°. 17'. 44" environ; ce qui fait voir que le rayon dans tout cercle eſt égal à un arc de 57°. 17'. 44". Par ce moyen connoiſſant un angle, on connoîtra la longeur de l'arc qui le meſure, le rayon étant donné ; car il eſt évident que l'arc de 57°. 17'. 44", eſt à la longueur du rayon, ou au nombre des parties dont on ſuppoſe le rayon compoſé, comme le nombre de dégrés d'un autre angle quelconque eſt à la longueur de l'arc qui le meſure ; ſoit ſuppoſé 57°. 17'. 44" ou 57, 295779 &c. = m, ſoit N le nombre de dégrés d'un angle connu

connû quelconque, Z la longueur de l'arc qui le mesure, R le rayon avec lequel cet arc est décrit, & la proportion sera $m . N :: R . Z$, donc $Z = \frac{N \times R}{m}$ $= N \times R \times r$, en supposant $\frac{1}{m} = \frac{1}{57,295779 \text{ \&c.}} = 0,$ 0174532925 &c. $= r$. C'est par cette formule qu'on trouve les intégrales des différentielles qui se rapportent au cercle ; par exemple si on veut avoir la valeur de l'intégrale $\frac{2D}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}(A'OC)$ trouvée dans le corollaire précédent, il est clair que, puisque le rayon est à la tangente de l'angle AOC comme $\sqrt{\frac{e}{f}}$ à $z^{\frac{n}{2}}$, on trouvera le nombre de degrés que contient cet angle par les tables des Sinus & Tangentes, ce qui donne la valeur de N, & puisque l'arc désigné par $\frac{2D}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}(AOC)$ est décrit du rayon $\frac{2D}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}$ (par le corol. précédent), on a $R = \frac{2D}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}$; en mettant donc ces valeurs de N & R dans la formule $\frac{N \times R}{m}$, ou $N \times R \times r$, on trouvera l'arc de cercle qui est l'intégrale cherchée.

COROLLAIRE III.

34. LA valeur qu'on a donnée dans les deux Corollaires précédens à l'intégrale de $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e+fz^n}$ suppose

qu'elle doit s'évanouir lorſque la tangente AD ou $z^{\frac{n}{2}} = 0$; mais ſi au contraire cette intégrale doit être nulle lorſque $z^{\frac{n}{2}} = \infty$ ou $\frac{1}{z^{\frac{n}{2}}} = 0$, dans ce cas il faut élever ſur OA la perpendiculaire OB qui rencontre la circonférence en B, du point B tirer la tangente BF qui rencontre en F la ligne OC prolongée, cela fait, au lieu de l'angle AOC on ſe ſervira de ſon complement BOC, parce que la tangente du premier eſt infinie lorſque la tangente de l'autre eſt nulle ; & parce que les triangles ſemblables OAD, OBF donnent $AD\left(z^{\frac{n}{2}}\right) . OA\left(\sqrt{\frac{e}{f}}\right) :: OA\left(\sqrt{\frac{e}{f}}\right) . BF = \frac{e}{fz^{\frac{n}{2}}}$, ſi on ſubſtitue $\frac{e}{fz^{\frac{n}{2}}}$ au lieu de $z^{\frac{n}{2}}$ & $-\frac{ez^{-\frac{n}{2}-1}dz}{f}$ au lieu de $z^{\frac{n}{2}-1}dz$ dans la différentielle $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e+fz^n}$, elle deviendra $-\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e+fz^n}$, d'où il ſuit que l'intégrale de $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e+fz^n}$ dans le cas de ce corollaire eſt $-\frac{2D\sqrt{\frac{e}{f}}}{ne}$ (BOC). Il eſt facile de trouver la tangente de l'angle BOC, celle de AOC étant donnée, puiſque la proportion ci-deſſus fait voir que le rayon eſt moyen proportionnel entre ces deux tangentes : mais pour connoître l'angle BOC, il n'eſt nullement néceſſaire de connoître ſa tangente,

puiſqu'en cherchant dans les tables l'angle AOC on aura auſſi ſon complément BOC, & enſuite par la formule du corollaire précédent on trouvera l'arc de cercle qui eſt la valeur de l'intégrale $\frac{2D}{ne}\sqrt{\frac{e}{f}}$ (BOC).

Enfin ſi l'intégrale de $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e+fz^n}$ ne s'évanouit, ni avec la tangente AD, ni avec la tangente BF, on rendra cette intégrale complète, comme on a coutume de faire, ſelon que l'état de la queſtion en détermine les bornes.

COROLLAIRE IV.

35. SI des point C, *c*, (*fig.* 11.) on mene les ordonnées CK, *ck*, infiniment proche l'une de l'autre, en nommant OK, *y*; & comme auparavant OA *a*; AD, *x*; les triangles ſemblables OKC, OAD, donneront, OK (*y*). KC ($\sqrt{aa-yy}$):: OA (*a*). AD $= x = \frac{a}{y}\sqrt{yy-aa}$; d'où l'on tire $dx = -\frac{a^2dy}{yy\sqrt{aa-yy}}$, & en mettant ces valeurs de *x* & de *dx* dans la différentielle $\frac{aadx}{aa+xx}$ qui exprime le petit arc C*c*; on trouve $\frac{aadx}{aa+xx} = -\frac{ady}{\sqrt{yy-aa}}$; de cette maniére on peut transformer une différentielle en une autre de différente eſpéce, la réduire de la tangente à l'abſciſſe, ou de l'abſciſſe à la tangente. Main-

tenant puiſque l'intégrale de $-\frac{ady}{\sqrt{aa-yy}}$ eſt a (AOC); ſi on ſuppoſe $a=\sqrt[n]{\frac{e}{f}}$, $z^{\frac{n}{2}}=y$, on trouve $\frac{ady}{\sqrt{aa-yy}}=\frac{n\sqrt[n]{e}\times z^{\frac{n}{2}-1}dz}{2\sqrt{e-fz^n}}$, dont l'intégrale eſt $-\sqrt[n]{\frac{e}{f}}$ (AOC); par conſéquent celle de $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{\sqrt{e-fz^n}}$ eſt $-\frac{2D}{n\sqrt[n]{e}}\sqrt[n]{\frac{e}{f}}$ (AOC) $=-\frac{2D}{n\sqrt[n]{f}}$ (AOC), c'eſt-à-dire, égale à la meſure de l'angle AOC au module $\frac{2D}{n\sqrt[n]{f}}$, en prenant cette intégrale négativement; & puiſque le rayon eſt au co-ſinus de cet angle comme $\sqrt[n]{\frac{e}{f}}$ à $z^{\frac{n}{2}}$, on trouvera ſa valeur en degrés dans les tables des Sinus, enſuite avec le module $\frac{2D}{n\sqrt[n]{f}}$ par l'art. 33. on déterminera la longueur de l'arc qui meſure cet angle & qui eſt l'intégrale cherchée. L'équation $x=\frac{a}{y}\sqrt{aa-yy}$ trouvée au commencement de ce corollaire fait voir que le rayon eſt à la tangente du même angle AOC, comme $\sqrt[n]{\frac{e}{f}}$ à $\sqrt[n]{\frac{e}{f}}\times\sqrt{\frac{e-fz^n}{fz^n}}$, ou comme $\sqrt[n]{f}$ à $\sqrt{\frac{e-fz^n}{z^n}}$ en réduiſant cette raiſon aux moindres termes, ce qu'il eſt à propos de faire toujours, d'autant que par-là on abrége le calcul ſans courir riſ-

que d'erreur, puiſque la raiſon du rayon au ſinus, au co-ſinus, ou à la tangente demeurant la même, on trouve toujours le même angle. On doit ici obſerver comme dans le corollaire précédent, que ſi l'intégrale de $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{\sqrt{e-fz^n}}$ doit devenir nulle lorſque $z^{\frac{n}{2}} = 0$, elle ſera exprimée par $\frac{2D}{n\sqrt{f}}$ (BOC), & le rayon ſera au ſinus de l'angle BOC comme $\sqrt{\frac{e}{f}}$ à $z^{\frac{n}{2}}$, & à ſa tangente comme $\sqrt{f}$ à $f\sqrt{\frac{z^n}{e-fz^n}}$, ou comme 1 à $\sqrt{\frac{fz^n}{e-fz^n}}$.

On doit encore remarquer que l'intégrale de $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{\sqrt{e-fz^n}}$ change de ſigne, toutes les fois qu'elle change ſa valeur à l'égard de l'angle AOC & BOC, & cela parce qu'à meſure que l'arc AC augmente, le co-ſinus OK, ou $z^{\frac{n}{2}}$ diminue, & par conſéquent ſa différence $\frac{n}{2}z^{\frac{n}{2}-1}dz$ devient négative : ceci a lieu auſſi dans le corollaire précédent.

Ce corollaire ſert encore à réduire aux arcs de cercle les eſpaces KCA, OBCK, & par ce moyen à trouver les intégrales des différentielles qui s'y rapportent. L'eſpace KCA eſt la différence entre le ſecteur AOC & le triangle OKC, & ſa diffé-

rentielle eſt $-dy\sqrt{aa-yy} = -\frac{nz^{\frac{n}{2}-1}dz}{2\sqrt{f}}\sqrt{e-fz^n}$; or le ſecteur AQC eſt égal par ce corollaire à $\frac{e}{2f}$ (AOC), donc l'intégrale de $-\frac{nz^{\frac{n}{2}-1}dz}{2\sqrt{f}}\sqrt{e-fz^n}$ eſt $\frac{e}{2f}$(AOC) — T, en nommant T le triangle OKC; d'où l'on tire $\frac{De}{n\sqrt{f}}$(AOC) — $\frac{2D\sqrt{f}}{n}$T pour l'intégrale de $-Dz^{\frac{n}{2}-1}dz\sqrt{e-fz^n}$; pareillement puiſque l'eſpace OBCK eſt égal à la ſomme du ſecteur BOC & du triangle OKC, & que ſa différentielle eſt $dy\sqrt{aa-yy} = \frac{nz^{\frac{n}{2}-1}dz}{2\sqrt{f}}\sqrt{e-fz^n}$, on trouvera que l'intégrale de $Dz^{\frac{n}{2}-1}dz\sqrt{e-fz^n}$ eſt $\frac{De}{n\sqrt{f}}$(BOC) + $\frac{2D\sqrt{f}}{n}$T.

COROLLAIRE V.

36. ON a trouvé dans le dernier Problême $\frac{aadx}{aa-xx}$ pour la valeur de l'arc Cc, laquelle étant multipliée par $\frac{a}{2}$ donne $\frac{a^3dx}{2\times aa+xx}$, qui eſt la valeur du petit ſecteur COc: or ſi du centre O & du demi-axe OA, on décrit une hyperbole équilatére A'P, & qu'on prolonge les droites OC, Oc, juſqu'à ce qu'elles la rencontrent aux points P, p, on a vû

(art. 23.) que le petit secteur POp est égal à $\frac{a^3dx}{2\times aa-xx}$; il est donc visible que les deux différentielles qui expriment les secteurs POp, COc, ne diffèrent entr'elles que par le signe — ou + qui est devant le quarré xx, & que comme on a, $aa - xx = \overline{a+\sqrt{xx}} \times \overline{a-\sqrt{xx}} = \overline{a+x} \times \overline{a-x}$, & comme aussi la différentielle logarithmique de $\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}$ donne $\frac{adx}{aa-xx}$ qui étant multipliée par le module $\frac{aa}{2}$ donne $\frac{a^3dx}{2\times aa-xx}$ valeur du secteur POp; pareillement on a, $aa + xx = \overline{a+\sqrt{-xx}} \times \overline{a-\sqrt{-xx}}$. $= \overline{a+x\sqrt{-1}} \times \overline{a-x\sqrt{-1}}$, & la différentielle logarithmique de $\sqrt{\frac{a+x\sqrt{-1}}{a-x\sqrt{-1}}}$ est $\frac{adx\sqrt{-1}}{aa+xx}$, qui étant multipliée par le module $\frac{aa}{2\sqrt{-1}}$ donne $\frac{a^3dx}{2\times aa+xx}$ valeur du secteur COc: d'où il suit que, comme le secteur hyperbolique est égal au logarithme de $\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}$ au module $\frac{aa}{2}$, de même le secteur circulaire AOC est égal au logarithme de $\sqrt{\frac{a+x\sqrt{-1}}{a-x\sqrt{-1}}}$ au module $\frac{aa}{2\sqrt{-1}}$; on pourra donc exprimer les secteurs de cercle par des logarithmes imaginaires, & réduire les différences de ces secteurs à la simple forme $M\times\frac{dv}{v}$ en supposant $v = \sqrt{\frac{a+x\sqrt{-1}}{a-x\sqrt{-1}}}$, car

on auroit $\frac{dv}{v} = \frac{adx\sqrt{-1}}{aa+xx}$, & $\frac{a^3dx}{2\times aa+xx} = \frac{aa}{2\sqrt{-1}} \times \frac{dv}{v}$.

On peut encore réduire à cette forme ſimple la différentielle $\frac{ady}{\sqrt{aa-yy}}$, car puiſque $v = \sqrt{\frac{a+x\sqrt{-1}}{a-x\sqrt{-1}}}$, & que par le corollaire précédent $x = \frac{a}{y}\sqrt{aa-yy}$, on déduit $v = \sqrt{\frac{y+\sqrt{yy-aa}}{y-\sqrt{yy-aa}}}$, ou bien pour avoir une valeur plus ſimple de v, à cauſe de l'équation $y+\sqrt{yy-aa} \times y-\sqrt{yy-aa} = aa$, on aura $y+\sqrt{yy-aa}, a :: a, y-\sqrt{yy-aa}$, & $\sqrt{y+\sqrt{yy-aa}}\cdot\sqrt{y-\sqrt{yy-aa}} :: y+\sqrt{yy-aa}, a :: a, y-\sqrt{yy-aa}$, ce qui donne $v = \frac{y+\sqrt{yy-aa}}{a} = \frac{a}{y-\sqrt{yy-aa}}$, comme nous avons trouvé pour l'hyperbole (art. 22.), d'où l'on tire $\frac{ady}{\sqrt{yy-aa}} = \frac{a}{\sqrt{-1}} \times \frac{dv}{v}$.

REMARQUE I.

37. IL ſeroit inutile de traiter ici en particulier des ſecteurs & eſpaces ellyptiques, puiſqu'ils ont un rapport donné avec les ſecteurs & eſpaces circulaires : car ſi du centre O (*fig.* 12.) & des demi-axes OA, OB, on décrit un quart d'ellypſe AB, & du rayon OA un quart de cercle AD, & qu'on mene une ordonnée quelconque CPK, qui coupe le cercle en C & l'ellypſe en P, & qu'on tire les lignes OC, OP;

OP ; on ſçait que les ſecteurs AOC, AOP, & COD, POB, & que les eſpaces AKC, AKP, & ODCK, OBPK, ſont tous entr'eux dans la raiſon conſtante de AO à OB : on trouvera donc la valeur de tous les ſecteurs & eſpaces ellyptiques par des arcs de cercle, en ſe ſervant des formules générales $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e+fz^n}$, $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{\sqrt{e-fz^n}}$, $Dz^{\frac{n}{2}-1}dz\sqrt{e-fz}$, qui ſont, comme on voit, communes au cercle & à l'ellypſe.

REMARQUE II.

58. OUTRE la grande ſimilitude, qu'on a déja remarquée dans l'art. 56. entre les calculs & les expreſſions tirées du cercle & de l'hyperbole, ſi on compare les quatre premiers corollaires du dernier Problême avec ceux du Problême troiſiéme de la premiére Partie, on trouve que les calculs qu'on y a expoſés ſont encore tout-à-fait ſemblables & analogues tant par rapport aux différentielles, que par rapport aux Intégrales. Les Intégrales qui ſe rapportent à l'hyperbole ſont des meſures de rapports, au lieu que celles qui ſe rapportent au cercle ſont des meſures d'angles, les modules dans les deux cas étant les mêmes. Tout ce qui diſtingue les différentielles qui regardent l'hyperbole d'avec celles du cercle n'eſt que la diverſité des ſignes qui ſe trouvent devant la quantité qui déſigne le rayon de l'hyperbole ou du cercle ; ainſi dans la dif-

férentielle générale $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e+fz^n}$, où le rayon eſt exprimé par $\sqrt{\frac{e}{f}}$, ſi l'une des deux quantités e, f, eſt négative, cette différentielle & ſon intégrale ſe rapportent à l'hyperbole, & au cercle ſi ces quantités ſont toutes deux poſitives ou négatives : les différentielles $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{\sqrt{e+fz^n}}$, $Dz^{\frac{n}{2}-1}dz\sqrt{e+fz^n}$, dans leſquelles $\sqrt{f}$ peut repréſenter le rayon, ſe rapportent à l'hyperbole lorſque f eſt poſitif, & au cercle lorſqu'il eſt négatif. C'eſt cette belle harmonie entre ces deux courbes, qui parut à M. CÔTES non ſeulement digne d'être examinée avec une attention particuliére, & approfondie par une étude opiniâtre, mais même le détermina à donner à l'ouvrage, qu'il compoſa ſur ces calculs, le titre de *Harmonia menſurarum.*

Réduction des Différentielles compoſées à celles dont on a déja parlé.

PROBLÊME.

39. QU'IL ſoit propoſé de trouver l'intégrale de la différentielle $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ par les logarithmes & les arcs de cercle.

COMME on a donné dans les articles précédens la

manière de trouver l'intégrale d'une différentielle dont le dénominateur eſt binome, il ne s'agit ici que de réduire la propoſée en une autre dont le dénominateur ſeroit binome: or les ſections coniques fourniſſent une méthode fort ſimple pour parvenir à cette réduction; car en ſuppoſant $e+fz^n+gz^{2n}=yy$, on voit que cette équation marque un lieu géométrique, qui eſt toujours une ſection conique, & dont la conſtruction nous donneroit la réduction requiſe. Du centre O (*fig.* 13.) & du demi-axe OA qu'on décrive une hyperbole quelconque AD, & qu'on mene ſur l'axe OA prolongé une ordonnée DC, qui ſera nommée y, ſoit donnée une partie OB, laquelle on nommera c; OA, a; le demi-axe conjugué, b; BC, z^n; & par la nature de la courbe on a $\overline{DC}^2\ (yy)\ .\ \overline{OC}^2-\overline{AO}^2\ (\overline{c+z^n}^2-aa)\ ::\ bb.\ aa$; ce qui donne $yy=\frac{bbcc}{aa}-bb+\frac{2bbc}{aa}z^n+\frac{bb}{aa}z^{2n}=e+fz^n+gz^{2n}$, & en comparant les termes correſpondans, on trouve $\frac{bbcc}{aa}-bb=e$, $\frac{2bbc}{aa}=f$, $\frac{bb}{aa}=g$, d'où l'on tire $c=\frac{\frac{1}{2}f}{g}=$ OB, & OC $=\frac{\frac{1}{2}f}{g}+z^n$; il ne faudra donc que ſuppoſer $\frac{\frac{1}{2}f}{g}+z^n=x^{\frac{n}{2}}$, ou $z^n=x^{\frac{n}{2}}-\frac{\frac{1}{2}f}{g}$, & l'on déduira $e+fz^n+gz^{2n}=\frac{eg-\frac{1}{4}ff}{g}+gx^n$, & $\frac{Dz^{n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}=\frac{D}{2}\times$

$\frac{x^{\frac{n}{2}-1}dx}{\frac{eg-\frac{1}{4}ff}{g}+gz^n}$: de cette maniére la différentielle proposée eſt réduite à la formule générale binome $\frac{Dz^{\frac{n}{2}-1}dz}{e+fz^n}$, & ſe rapporte à l'hyperbole ou au cercle ſuivant que $\frac{1}{4}ff$ eſt plus grand ou moindre que eg (par l'art. 38.); ſi $\frac{1}{4}ff$ ſurpaſſe eg, alors $\frac{Dz^{n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}} = -\frac{D}{2} \times \frac{x^{\frac{n}{2}-1}dx}{\frac{\frac{1}{4}ff-eg}{g}+gx^n}$, dont l'intégrale (par l'art. 23.) eſt $-\frac{D}{2n\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}} \left\{ \frac{\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}+x^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}-x^{\frac{n}{2}}} \right\}$ $= -\frac{D}{2n\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}} \left\{ \frac{\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}+\frac{1}{2}f+gz^n}{\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}-\frac{1}{2}f-gz^n} \right\}$. Soit l le Logarithme de $\frac{\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}+\frac{1}{2}f+gz^n}{\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}-\frac{1}{2}f-gz^n}$ pris dans les tables de Briggs, dont m eſt ſuppoſé le module, & cette intégrale (par l'art. 10.) ſera $-\frac{D}{2n\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}} \times \frac{l}{m}$; mais parce que cette intégrale n'eſt point complette, ſi on ſuppoſe qu'elle eſt nulle lorſque $z^n = 0$, ſoit L le logarithme de $\frac{\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}+\frac{1}{2}f}{\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}-\frac{1}{2}f}$, & l'inté-

grale complette sera $\frac{D}{2n\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}} \times \frac{L-l}{m}$.

Si $\frac{1}{4}ff$ est moindre que eg, alors l'intégrale de $\frac{D}{2} \times \frac{x^{\frac{n}{2}-1}\,dx}{\frac{eg-\frac{1}{4}ff}{g}+gx^n}$ se trouve (par l'art. 32.) égale à $\frac{D}{n\sqrt{eg-\frac{1}{4}ff}}$ (AOC) (*fig.* 10.), le rayon étant à la tangente de l'angle AOC comme $\frac{\sqrt{eg-\frac{1}{4}ff}}{g}$ à $x^{\frac{n}{2}}$, ou comme $\sqrt{eg-\frac{1}{4}ff}$ à $\frac{1}{2}f+gz^n$: mais on voit que la tangente $\frac{1}{2}f+gz^n$ ne s'évanouit point lorsque $z^n=0$, ni par conséquent l'angle AOC, pour rendre donc l'intégrale complette dans la supposition qu'elle est nulle lorsque $z^n=0$, soit tirée la droite OH qui rencontre la circonférence en N & la tangente AD en H, ensorte qu'on ait OA . AH :: $\sqrt{eg-\frac{1}{4}ff}$. $\frac{1}{2}f$, & l'intégrale demandée sera $\frac{D}{n\sqrt{eg-\frac{1}{4}ff}}$ (NOC), dont on aura la valeur par l'art. 33. *C. Q. F. T.*

REMARQUE.

DANS la construction du lieu de l'équation $e+fz^n+gz^{2n}=yy$ donnée dans le Problême, on a omis les cas où ce lieu seroit une ellypse ou un cercle, parce que le cas seul qu'on a construit, suffit pour la réduction qu'on cherche, en prenant garde de mettre devant les termes f, g, les signes, qui leur

conviennent, c'eſt-à-dire, qu'ils ont devant eux dans la différentielle propoſée.

COROLLAIRE.

40. LA même méthode s'applique à la différentielle $\frac{Dz^{n-1}dz}{\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}$; car en ſuppoſant $\frac{\frac{1}{2}f}{g}+z^n=x^{\frac{n}{2}}$, on trouve que la propoſée eſt égale à cette autre $\frac{Dx^{\frac{n}{2}-1}dx}{2\sqrt{eg-\frac{1}{4}ff}+gx^n}$, qui ſe rapporte à la formule générale des binomes, & dont on trouvera l'intégrale par le moyen des logarithmes (par l'art. 27.), ou par un arc de cercle (par l'art. 35.) ſuivant que le terme gz^{2n} ou gx^n eſt précédé du ſigne + ou —; on rendra les intégrales complettes de la maniére qu'on a fait dans le Problême.

Il y a beaucoup d'autres différentielles compoſées, qu'on peut auſſi réduire aux binomes, mais parce qu'elles trouveront mieux leurs places dans la ſuite, nous omettrons d'en parler ici.

Fin de la ſeconde Partie.

TROISIEME PARTIE.

DE LA

REDUCTION

DES INTEGRALES.

AUX LOGARITHMES,

ET

AUX ARCS DE CERCLE

PRIS ENSEMBLE.

ON a considéré jusqu'ici les Logarithmes & les Arcs de cercle séparément, ce qui ne nous a donné le moyen d'intégrer que les différentielles les plus simples de celles qui peuvent être rapportées aux sections coniques; c'est pourquoi pour étendre la théorie en y comprenant les différentielles les plus composées qui ont rapport à ces courbes, on va maintenant faire usage des Logarithmes & Arcs de cercle conjointement ensemble; par cette

union on parviendra à ce qui eſt propoſé : mais pour concevoir clairement les principes d'où l'on déduit cette méthode, il eſt néceſſaire de donner par avance quelques Lemmes.

LEMME I.

41. *ETANT donnés le ſinus & co-ſinus d'un arc de cercle, trouver le ſinus & co-ſinus d'un arc double, triple, &c.*

Du centre O ſur le diamétre AOB (*fig.* 14.) qu'on décrive une demi-circonférence de cercle AMB, ſur laquelle qu'on prenne un arc quelconque AM moindre qu'un quart de cercle, & MD égal à AM, des points M, D, qu'on tire les rayons MO, DO, & les ſinus MP, DH, & ſoit E le point où DH rencontre MO ; cela poſé, ſi on nomme OP co-ſinus de l'arc AM, c ; & le rayon AO, 1 ; les triangles ſemblables HEO, PMO donneront HO . HE :: OP . MP, & de ce que MO coupe l'angle AOD également en deux, on aura HE . ED :: HO . OD, ce qui donne HD . OD + HO :: HE . HO, d'où l'on tire OP . MP :: HD . OD + HO, & parce que $\overline{HD}^2 = \overline{OD}^2 - \overline{HO}^2 = \overline{OD + HO} \times \overline{OD - HO}$ en quarrant les termes de la derniére proportion, on trouve, $\overline{OP}^2 . \overline{MP}^2$ :: OD + HO . OD — HO, & $\overline{OP}^2 + \overline{MP}^2 . \overline{OP}^2$ :: 2OD . OD + HO, ou, parce que $\overline{OP}^2 + \overline{MP}^2 = \overline{OD}^2$, $\overline{OD}^2 . \overline{OP}^2$ :: 2 . OD + HO, donc en mettant les valeurs analytiques des termes de cette proportion, on a $1 . cc :: 2 . 1 + HO$

$1 + HO$, ce qui donne $HO = 2cc - 1$, qui eſt le co-ſinus de l'arc AD double de AM, & $DH = \sqrt{OD^2 - HO^2} = 2c\sqrt{1-cc}$, qui eſt le ſinus du même arc AD.

Il eſt donc clair que, le rayon étant ſuppoſé égal à l'unité, le co-ſinus d'un arc double de celui qui a c pour ſon co-ſinus, eſt égal à deux fois le quarré du co-ſinus c moins l'unité, on pourra donc par cette régle ſans autre calcul trouver le co-ſinus d'un arc double de celui dont le co-ſinus eſt $2cc - 1$, ce co-ſinus par conſéquent ſera $8c^4 - 8c^2 + 1$, & appartiendra à un arc quadruple de AM, & le ſinus correſpondant ſera $\overline{8c^3 - 4c}\sqrt{1-cc}$. Delà on trouveroit pareillement le ſinus & co-ſinus d'un arc huit fois, ſeize fois, &c. plus grand que l'arc AM.

Maintenant pour trouver le ſinus & le co-ſinus d'un arc triple ſoit pris ſur la demi-circonférence AMB, (*fig.* 15.) l'arc MF double de AM, & ſoient encore tirés les rayons MO, FO, & les ſinus MP, FG, dont FG rencontre MO au point E, qu'on tire auſſi ſur MO la perpendiculaire FH, & ſuppoſant comme ci-devant $OP = c$, $AO = 1$, on aura, comme nous avons vû, $HO = 2cc - 1$, & $FH = 2c\sqrt{1-cc}$, & les triangles ſemblables PMO, GEO, EFH donneront $OP\ (c) . MO\ (1) :: GO . EO = \frac{GO}{c}$, & $OP\ (c) . PM\ (\sqrt{1-cc}) :: FH\ (2c\sqrt{1-cc}) . HE = \frac{2c-2c^3}{c}$, d'où l'on tire $HE + EO = \frac{GO+2c-2c^3}{c} = HO = 2cc - 1$, donc $GO = 4c^3 - 3c$, &

$FG = \overline{4cc - 1}\sqrt{1 - cc}$. Par le moyen du co-ſinus $4c^3 - 3c$, on trouvera comme ci-deſſus le co-ſinus d'un arc double de AF, c'eſt-à-dire, d'un arc ſix fois plus grand que AM; ce co-ſinus ſera donc $32c^6 - 48c^4 + 18c^2 - 1$, & le ſinus $\overline{32c^5 - 32c^3 + 6c}\sqrt{1 - cc}$.

Pour trouver le ſinus & co-ſinus de l'arc quintuple de AM, il faut prendre l'arc AD double, & l'arc DL triple de AM (*fig.* 16.) & tirer encore les rayons DO, LO, & les ſinus DH, LN, dont LN rencontre DO en E, on menera auſſi la perpendiculaire LG ſur DO; cela poſé, par les calculs précédens on a déterminé les valeurs de HO, DH, GO, LG, leſquelles par un raiſonnement ſemblable à celui, qu'on a fait pour trouver le co-ſinus de l'arc triple, donneront $NO = 16c^5 - 20c^3 + 5c$, qui eſt le co-ſinus de l'arc AL quintuple de AM, & par conſéquent on aura le ſinus $LN = \overline{16c^4 - 12c^2 + 1}\sqrt{1 - cc}$.

De la même maniére par le moyen du ſinus & co-ſinus de l'arc double & de l'arc quintuple de AM, on déduira le ſinus & co-ſinus de l'arc ſeptuple, & ainſi des autres. *C. Q. F. T.*

COROLLAIRE I.

42. ON trouve donc par le Problême, que ſi on nomme s & c le ſinus & co-ſinus d'un arc quelconque moindre qu'un quart de cercle, & s'', s''', s^{iv}, &c. & c'', c''', c^{iv}, &c. les ſinus & co-ſinus des arcs

double, triple, quadruple, &c. on aura les équations ſuivantes

$s = \sqrt{1 - cc}$. $\quad c = c$.

$s^{II} = 2c\sqrt{1 - cc}$. $\quad c^{II} = 2cc - 1$.

$s^{III} = 4cc - 1\sqrt{1 - cc}$. $\quad c^{III} = 4c^3 - 3c$.

$s^{IV} = 8c^3 - 4c\sqrt{1 - cc}$. $\quad c^{IV} = 8c^4 - 8c^2 + 1$.

$s^{V} = 16c^4 - 12c^2 + 1\sqrt{1 - cc}$. $\quad c^{V} = 16c^5 - 20c^3 + 5c$.

$s^{VI} = 32c^5 - 32c^3 + 6c\sqrt{1 - cc}$. $\quad c^{VI} = 32c^6 - 48c^4 + 18c^2 - 1$.

$s^{VII} = 64c^6 - 80c^4 + 24c^2 - 1\sqrt{1 - cc}$. $\quad c^{VII} = 64c^7 - 112c^5 + 56c^3 - 7c$.

&c. $\quad$ &c.

A l'égard de ces équations on doit obſerver que, ſi on décrit (*fig.* 17.) un cercle ADBEA, & qu'on tire les deux diamétres AB, DE perpendiculaires l'un à l'autre, & qu'on prenne un arc AM moindre que AD, ſi on regarde le ſinus & co-ſinus de cet arc AM comme poſitifs, qui eſt le cas des équations précédentes, tous les arcs de cercle multiples de AM, qui ſe terminent dans la demi-circonférence ADB, auront des ſinus poſitifs, & tous ceux qui ſe terminent dans la demi-circonférence AEB, auront des ſinus négatifs : de même tous les arcs multiples de AM terminés dans la demi-circonférence DAE, auront des co-ſinus poſitifs, & tous les autres terminés dans la demi-circonférence DBE, des co-ſinus négatifs.

Dans les calculs du Problême nous avons ſuppoſé que tous les arcs multiples de AM étoient compris dans le quart de cercle AD, mais ſi l'arc AM étoit tel que ſes multiples s'étendiſſent dans les autres parties de la circonférence au-delà du point D, il faudroit changer les ſignes des équations ſuivant la régle qu'on vient de donner:

COROLLAIRE II.

43. SI l'arc AM eſt plus grand qu'un quart de cercle mais qui n'excéde pas la demi-circonférence, alors ſon co-ſinus (par le Corol. précédent) ſera $-c$, & par conſéquent toutes les équations, dans leſquelles le co-ſinus c ſe trouve avec des dimenſions impaires, changeront leurs ſignes; donc la ſuite des équations dans ce cas aura cette forme.

$$s = \sqrt{1 - cc}. \qquad c = -c.$$

$$s'' = -2c\sqrt{1 - cc}. \qquad c'' = 2cc - 1.$$

$$s''' = (4cc - 1)\sqrt{1 - cc}. \qquad c''' = -4c^3 + 3c.$$

$$s^{iv} = (-8c^3 + 4c)\sqrt{1 - cc}. \qquad c^{iv} = 8c^4 - 8c^2 + 1.$$

$$s^{v} = (16c^4 - 12c^2 + 1)\sqrt{1 - cc}. \qquad c^{v} = -16c^5 + 20c^3 - 5c.$$

$$s^{vi} = (-32c^5 + 32c^3 - 6c)\sqrt{1 - cc}. \qquad c^{vi} = 32c^6 - 48c^4 + 18c^2 - 1.$$

$$s^{vii} = (64c^6 - 80c^4 + 24c^2 - 1)\sqrt{1 - cc}. \qquad c^{vii} = -64c^7 + 112c^5 - 56c^3 + 7c.$$

&c. &c.

Comme nous n'avons beſoin que de ces deux cas,

Il ſeroit inutile d'examiner les deux autres, où l'arc AM ſeroit ſuppoſé plus grand que la demi-circonférence mais qui ne ſurpaſſe pas les trois quarts, & plus grand que les trois quarts mais qui ne ſurpaſſe pas la circonférence entiére.

COROLLAIRE III.

44. SI on jette les yeux, ſur les équations aux co-ſinus des Corollaires précédens, on voit que la racine c a toujours autant de valeurs que l'arc dont c eſt le co-ſinus contient de fois celui dont le co-ſinus eſt exprimé par l'équation entiére, par exemple, c aura cinq valeurs dans l'équation $c^v = 16c^5 - 20c^3 + 5c$ qui exprime le co-ſinus c^v d'un arc cinq fois plus grand que celui dont le co-ſinus eſt c. Pour trouver toutes ces valeurs de c, il faut décrire (*fig.* 18.) une circonférence de cercle ACEA, ſur laquelle on prendra l'arc AL dont le co-ſinus ſoit égal à c^v, & l'arc AB qui ſoit la cinquiéme partie de AL, dont par conſéquent le co-ſinus eſt c, ce qui donne une des valeurs de la racine c; enſuite en commençant au point B on diviſera la circonférence entiére en cinq parties égales BC, CD, DE, EF, FB, & les co-ſinus des arcs AF, AC, AE, AD, donneront les autres valeurs de la racine c (les arcs AF, AE, ſe prennent en deſcendant du point A dans la partie inférieure du cercle, & les arcs AC, AD, en montant dans la partie ſupérieure): car on ſçait qu'une équation a toujours autant de racines que le Problême qu'elle

exprime peut avoir de ſolutions, & qu'un Problême eſt ſuſceptible d'autant de ſolutions qu'il comprend de cas différens, dont l'analyſe dépend des mêmes quantités données & eſt fondée ſur des raiſonnemens tout-à-fait ſemblables : or on aura toujours les mêmes quantités données, & il faudra raiſonner d'une façon ſemblable, ſoit qu'on cherche le co-ſinus d'un arc qui ſoit la cinquiéme partie de AL, ou celui d'un arc qui ſoit la cinquiéme partie de AFDL c'eſt-à-dire de la circonférence totale moins AL, ou encore celui de la cinquiéme partie de ALDFAL c'eſt-à-dire de la circonférence totale plus AL, ou celui de la cinquiéme partie de AFDLAFDL c'eſt-à-dire de deux fois la circonférence moins AL, ou enfin celui de la cinquiéme partie de ALDFALDFAL c'eſt-à-dire de deux fois la circonférence plus AL : d'où il ſuit qu'en nommant C la circonférence & A l'arc AL, l'équation $c^v = 16c^5 - 20c^3 + 5c$ donnera les co-ſinus des cinq arcs ſuivans, $\frac{A}{5}$, $\frac{C-A}{5}$, $\frac{C+A}{5}$, $\frac{2C-A}{5}$, $\frac{2C+A}{5}$; mais on voit que $AB = \frac{A}{5}$, $AF = \frac{C-A}{5}$, $AC = \frac{C+A}{5}$, $AE = \frac{2C-A}{5}$, $AD = \frac{2C+A}{5}$, donc &c.

Il eſt clair auſſi par la diviſion du cercle qu'il ne peut avoir que cinq de ces arcs, car en prenant davantage, on reviendroit ſur les mêmes points de diviſion, l'équation donc ne pourra donner que cinq valeurs de la racine c.

On fera le même raiſonnement à l'égard de toutes les autres équations aux co-ſinus, ſoit que l'arc AL ſoit moindre ou plus grand qu'un quart de cercle, de ſorte que l'on peut dire généralement que, ſi λ marque le nombre des parties dans leſquelles l'arc AL eſt diviſé, les racines de ces équations ſeront les co-ſinus des arcs $\frac{A}{\lambda}$, $\frac{C-A}{\lambda}$, $\frac{C+A}{\lambda}$, $\frac{2C-A}{\lambda}$, $\frac{2C+A}{\lambda}$, $\frac{3C-A}{\lambda}$, $\frac{3C+A}{\lambda}$, &c. & ces arcs ſe trouvent en diviſant la circonférence en autant de parties égales que λ contient d'unités, en commençant au point B, AB étant ſuppoſé égal à $\frac{AL}{\lambda}$.

COROLLAIRE IV.

45. Si dans les équations ci-deſſus on ſuppoſe que chacun des co-ſinus c, c'', c^{IV}, &c. eſt égal à $= 1$, c'eſt-à-dire, que l'arc AL devient égal à la demi-circonférence (*fig.* 19.), dans ce cas en diviſant la circonférence, comme on a enſeigné dans le Corollaire précédent, on aura $A = \frac{1}{2}C$, $BC = 2AB$, $AF = AB$, (F eſt ſuppoſé le dernier point des diviſions) & les arcs dont les co-ſinus donnent les racines des équations, ſeront $\frac{\frac{1}{2}C}{\lambda}$, $\frac{\frac{1}{2}C}{\lambda}$, $\frac{\frac{3}{2}C}{\lambda}$, $\frac{\frac{1}{2}C}{\lambda}$, $\frac{\frac{5}{2}C}{\lambda}$, $\frac{\frac{5}{2}C}{\lambda}$, c'eſt-à-dire, AB, AF, AC, AE, &c. d'où il ſuit que les arcs, & par conſéquent leurs ſinus & co-ſinus ſeront deux à deux égaux, & que

si λ eſt un nombre impair, le dernier de ces arcs ſera $\frac{\frac{\lambda}{2}C}{\lambda} = \frac{C}{2}$, donc la valeur d'un des co-ſinus ſera égale à -1.

Si dans les équations on ſuppoſe chacun des co-ſinus c, c'', c''', &c. égal à 1, c'eſt-à-dire, que l'arc AL devient égal à la circonférence entiére (*fig.* 20.), alors on aura $A = C$, $BC = AB$, & les arcs ſeront $\frac{C}{\lambda}, \frac{0}{\lambda}, \frac{C}{\lambda}, \frac{2C}{\lambda}, \frac{2C}{\lambda}, \frac{3C}{\lambda}, \frac{3C}{\lambda}$, &c. c'eſt-à-dire, AB, AE, AC, AD, &c. car à cauſe du terme $\frac{0}{\lambda}$, on aura $AF = 0$: d'où il ſuit que les arcs, & par conſéquent leurs ſinus & co-ſinus ſont encore dans ce cas-ci égaux deux à deux ; le co-ſinus de l'arc déſigné par $\frac{0}{\lambda}$ eſt égal à 1, & ſi λ eſt un nombre pair, le dernier des arcs eſt marqué par $\frac{C}{2}$, dont le co-ſinus eſt -1.

COROLLAIRE V.

46. SI on ſuppoſe que les quantités, a, b, b, k, &c. marquent les co-ſinus des arcs $\frac{A}{\lambda}$, $\frac{C-A}{\lambda}$, $\frac{C+A}{\lambda}$, &c. ou, ce qui eſt la même choſe, qu'elles ſont les racines des équations aux co-ſinus, il eſt clair que ces équations ſont compoſées du produit des quantités $c-a$, $c-b$, $c-b$, $c-k$, &c; on

on connoîtra facilement le nombre des racines positives & négatives par les signes dont les termes des équations sont affectés, comme l'on sçait par les principes de l'Algébre : ainsi supposant $c^v = 1$, les racines de l'équation $16c^5 - 20c^3 + 5c - 1 = 0$, seront exprimées par les co-sinus des arcs AB, AE, AC, AD, (*fig.* 20.) lesquels étant égaux deux à deux (par le Corol. précédent), si a est le co-sinus de l'arc AB, il le sera aussi de AE, & de même si b est le co-sinus de AC, il le sera aussi de AD, & parce que cette équation a trois racines positives & deux négatives, il suit qu'elle est composée de ces équations simples, $c - 1 = 0$, $c - a = 0$, $c - a = 0$, $c + b = 0$, $c + b = 0$.

COROLLAIRE VI.

47. PUISQUE les seconds termes manquent partout dans les équations aux co-sinus, il est constant que la somme des racines ou des co-sinus positifs est égale à la somme des co-sinus négatifs; ainsi dans l'exemple du Corollaire précédent $2a + 1 = 2b$.

LEMME II.

48. *SI dans un cercle quelconque* ARQSA (fig. 21.) *décrit du centre* O *on tire deux diamétres* AQ, RS, *perpendiculaires l'un à l'autre, & qu'on prenne sur la circonférence un arc* AL, *dont le co-sinus soit nommé* t, *& l'arc* $AB = \frac{AL}{\lambda}$, *& qu'on*

diviſe la circonférence en commençant au point B *en un nombre de parties égales marqué par* λ, *comme* BC, CD, DE, *&c. ſi outre cela on prend un point quelconque* P *dans le diamétre* AQ, *duquel on mene à tous les points de diviſion les lignes* PB, PC, PD, PE, *&c. je dis qu'on aura* $\overline{PB}^2 \times \overline{PC}^2 \times \overline{PD}^2 \times \overline{PE}^2 \times$ *&c.* $= \overline{OA}^{2\lambda} - 2t \times \overline{OP}^{\lambda} + \overline{OP}^{2\lambda}$, *ſi l'arc* AL *eſt moindre que* AR; *&* $\overline{PB}^2 \times \overline{PC}^2 \times \overline{PD}^2 \times \overline{PE}^2 \times$ *&c.* $= \overline{OA}^{2\lambda} + 2t \times \overline{OP}^{\lambda} + \overline{OP}^{2\lambda}$, *ſi l'arc* AL *eſt plus grand que* AR, *mais moindre que* ARQ.

DEMONSTRATION.

Du point B qu'on tire le rayon BO, & BN perpendiculaire au diamétre AQ, & ſuppoſant OA $= 1$, on nommera OP, x, &, a, b, h, k, &c. les co-ſinus des arcs AB, AC, AD, AE, &c. & l'on aura $\overline{PB}^2 = \overline{PN}^2 + \overline{BO}^2 - \overline{ON}^2 = 1 - 2ax + xx$, de même $\overline{PC}^2 = 1 - 2bx + xx$, ſi les arcs AB, AC, ſont terminés dans la demi-circonférence RAS du même côté que le point P; & $\overline{PD}^2 = 1 + 2hx + xx$, $\overline{PE}^2 = 1 + 2kx + xx$, ſi les arcs AD, AE, ſont terminés dans la demi-circonférence RQS oppoſée au point P, & ainſi des autres. Cela poſé, pour démontrer ce Lemme, il faut transformer les équations aux co-ſinus en d'autres qui ſe rapportent aux lignes PB, PC, PD, &c: pour cet effet on tranſpoſera tous les termes des

équations aux co-ſinus du même côté du ſigne d'égalité, en ſorte qu'elles deviennent égales à 0; on ſuppoſera auſſi $1 - 2ax + xx = 0$, $1 - 2bx + xx = 0$, $1 + 2bx + xx = 0$, $1 + 2kx + xx = 0$, &c. Ce qui donne $a = \frac{1+xx}{2x}$, $b = \frac{1+xx}{2x}$, $-b = \frac{1+xx}{2x}$, $-k = \frac{1+xx}{2x}$, ou bien, parce que les co-ſinus, a, b, $-b$, $-k$, &c. expriment les différentes valeurs de la racine c, on aura généralement dans la préſente ſuppoſition $c = \frac{1+xx}{2x}$; ſi on ſubſtitue cette valeur de c dans toutes les équations, on trouve cette ſuite

$1 - 2cx + xx = 0.$ $\quad$ $1 - 2c^{v}x^{5} + x^{10} = 0.$

$1 - 2c^{II}x^{2} + x^{4} = 0.$ $\quad$ $1 - 2c^{vI}x^{6} + x^{12} = 0.$

$1 - 2c^{III}x^{3} + x^{6} = 0.$ $\quad$ $1 - 2c^{vII}x^{7} + x^{14} = 0.$

$1 - 2c^{IV}x^{4} + x^{8} = 0.$ $\quad$ &c.

Et puiſque c, c^{II}, c^{III}, &c. marquent le co-ſinus de l'arc AL que nous avons nommé t dans ce Lemme, on voit qu'on aura cette équation générale $1 - 2tx^{\lambda} + x^{2\lambda}$, lorſque AL eſt moindre que AR; & $1 + 2tx^{\lambda} + x^{2\lambda}$, lorſque AL eſt plus grand que AR, car dans ce cas les ſeconds termes de toutes ces équations ſont précédés du ſigne +: or les équations aux co-ſinus ſont compoſées (par l'art. 46.) du produit des racines $c - a = 0$, $c - b = 0$, $c + b = 0$, $c + k = 0$, &c. donc il s'enſuit que les nouvelles équations qu'on vient de former, ou en général que

les équations $1 - 2tx^{\lambda} + x^{2\lambda} = 0$, $1 + 2tx^{\lambda} + x^{2\lambda} = 0$, ſont compoſées du produit des racines $\frac{1+xx}{xx} - a = 0$, $\frac{1+xx}{2x} - b = 0$, $\frac{1+xx}{2x} + b = 0$, $\frac{1+xx}{2x} + k = 0$, &c. qui ſont les mêmes que les ſuivantes $1 - 2ax + xx = 0$, $1 - 2bx + xx = 0$, $1 + 2hx + xx = 0$, $1 + 2kx + xx = 0$, &c. par conſéquent $\overline{1 \mp 2tx^{\lambda} + x^{2\lambda}} = \overline{1 - 2ax + xx} \times \overline{1 - 2bx + xx} \times \overline{1 + 2hx + xx} \times \overline{1 + 2kx + xx} \times$ &c. ou, puiſque $\overline{1 \mp 2tx^{\lambda} + x^{2\lambda}} = \overline{AO}^{2\lambda} \mp 2t \times \overline{OP}^{\lambda} + \overline{OP}^{2\lambda}$, $\overline{PB}^{2} \times \overline{PC}^{2} \overline{PD}^{2} \times \overline{PE}^{2}$ &c. $= \overline{OA}^{2\lambda} \mp 2t \times \overline{OP}^{\lambda} + \overline{OP}^{2\lambda}$. *C. Q. F. D.*

COROLLAIRE.

49. Si on ſuppoſe $t = -1$, l'arc AL ſera égal à la demi-circonférence, on prendra donc ſur la circonférence ADFHA (*fig.* 22.) l'arc $AB = \frac{\frac{1}{2}C}{\lambda}$ ſelon ce que nous avons fait voir dans l'article 45, & du point B on diviſera la circonférence en un nombre de parties égales marqué par λ aux points D, F, H, &c. les co-ſinus des arcs AB, AD, AF, AH, &c. ſeront exprimés par les quantités, a, b, h, k, &c. On voit donc que dans ce cas on aura $1 - 2tx^{\lambda} + x^{2\lambda} = 1 + 2x^{\lambda} + x^{2\lambda}$, dont la racine quarrée eſt $1 + x^{\lambda}$, ce qui donne $1 + x^{\lambda} = \sqrt{\overline{1 - 2ax + xx} \times \overline{1 - 2bx + xx} \times \overline{1 + 2hx + xx} \times \overline{1 + 2kx + xx}}$ &c.

pour l'équation du Lemme, c'eſt-à-dire, $\overline{OA}^{\lambda} + \overline{OP}^{\lambda} = PB \times PD \times PF \times PH \times$ &c. Ainſi ſi on ſuppoſe par exemple $\lambda = 5$, la circonférence étant diviſée en cinq parties égales aux points B, D, F, H, K, on aura $\overline{OA}^{5} + \overline{OP}^{5} = PB \times PD \times PF \times PH \times PK = \overline{PB}^{2} \times \overline{PD}^{2} \times PF$, à cauſe que $PB = PK$, & $PH = PD$, donc $1 + x^{5} = \overline{1 - 2ax + xx} \times \overline{1 + 2bx + xx} \times \overline{1 + x}$. Pareillement ſi $\lambda = 6$, la circonférence (*fig.* 23.) étant diviſée en ſix parties égales aux points, B, D, F, H, K, M, l'équation ci-deſſus deviendra $\overline{OA}^{6} + \overline{OP}^{6} = PB \times PD \times PF \times PH \times PK \times PM = \overline{PB}^{2} \times \overline{PD}^{2} \times \overline{PF}^{2}$, ou $1 + x^{6} = \overline{1 - 2ax + xx} \times \overline{1 + xx} \times \overline{1 + 2bx + xx}$, $\overline{PD}^{2}$ étant $= 1 + xx$, parce que l'arc AB ou $\frac{\frac{1}{2}C}{6}$ eſt égal à la ſixiéme partie de la demi-circonférence, & par conſéquent l'arc AD eſt un quart de cercle dont le co-ſinus b eſt nul.

Si on ſuppoſe $t = 1$, l'arc AL ſera égal à la circonférence entiére, il faudra donc prendre (par l'art. 45.) l'arc $AC = \frac{C}{\lambda}$, & commençant au point C diviſer la circonférence (*fig.* 22 *&* 23.) en un nombre de parties égales déſigné par λ aux points, E, G, I, &c., A; le dernier point des diviſions ſera toujours le point A : ſi donc les co-ſinus des arcs AC, AE, AG, AI, &c. & de la circonfé-

rence ſont ſuppoſés égaux à, a, b, h, k, &c., 1; on aura dans ce cas $1 - 2tx^{\lambda} + x^{2\lambda} = 1 - 2x^{\lambda} + x^{2\lambda}$ dont la racine quarrée eſt $1 - x^{\lambda}$, ce qui donne $1 - x^{\lambda} = \sqrt{1 - 2ax + xx} \times \sqrt{1 - 2bx + xx} \times \sqrt{1 + 2h + xx} \times \sqrt{1 + 2kx + xx}$ &c. $\times \sqrt{1 - 2x + xx}$, c'eſt-à-dire, $\overline{OA}^{\lambda} - \overline{OP}^{\lambda} = PC \times PE \times PG \times PI$ &c. $\times PA$. Ainſi ſuppoſant par exemple $\lambda = 5$, & diviſant la circonférence (*fig.* 22.) en cinq parties égales aux points, A, C, E, G, I, l'équation ſera $\overline{OA}^{5} - \overline{OP}^{5} = PA \times PC \times PE \times PG \times PI = PA \times \overline{PC}^{2} \times \overline{PE}^{2}$, ou $1 - x^{5} = 1 - x \times 1 - 2ax + xx \times 1 + 2bx + xx$; de même ſi $\lambda = 6$, la circonférence (*fig.* 23.) étant diviſée en ſix parties égales aux points, A, C, E, G, I, L, on aura $\overline{OA}^{6} - \overline{OP}^{6} = PA \times PC \times PE \times PG \times PI \times PL = PA \times \overline{PC}^{2} \times \overline{PE}^{2} \times PG$, ou $1 - x^{6} = 1 - x \times 1 - 2ax + xx \times 1 + 2bx + xx \times 1 + x$.

Si donc l'on unit enſemble les deux cas qu'on vient d'examiner ſçavoir de $t = 1$, & $t = -1$, il ſuit évidemment que, puiſque l'arc AB (*fig.* 22. *&* 23.) eſt la moitié de AC, tous les arcs AB, BC, CD, DE, EF, &c. qui proviennent des diviſions faites dans les deux cas, ſeront égaux entr'eux, & que par conſéquent l'on peut établir le Théorême général ſuivant. *Si on diviſe une circonférence de Cercle* ADFHA (fig. 22. & 23.) *en arcs égaux* AB, BC, CD, DE, EF, *&c. dont le nombre eſt égal à* 2λ, *& que d'un point quelconque* P *pris dans le dia-*

métre AO *on tire à tous les points de diviſion les lignes* PA, PB, PC, PD, PE, *&c. on aura* $\overline{OA}^{\lambda} - \overline{OP}^{\lambda} = PA \times PC \times PE \times PG \times$ *&c. &* $\overline{OA}^{\lambda} + \overline{OP}^{\lambda} = PB \times PD \times PF \times PH \times$ *&c. en prenant ainſi ces lignes alternativement.* On trouve une autre démonſtration de ce Théorême dans les ouvrages de Jean Bernoulli Tome IV. N°. CLX.

REMARQUE.

50. QUOIQUE dans le Lemme précédent & ſon Corollaire nous ayons ſuppoſé le point P en dedans du cercle, on pourroit néanmoins en prolongeant le diamétre AO le prendre hors du cercle, & la démonſtration demeureroit la même, ſi ce n'eſt qu'on auroit dans ce cas $\overline{OP}^{\lambda} - \overline{OA}^{\lambda}$, au lieu de $\overline{OA}^{\lambda} - \overline{OP}^{\lambda}$, qu'on avoit auparavant.

LEMME III.

51. *TROUVER l'intégrale de la différentielle* $\frac{x^{\theta} dx}{1 \pm x}$, θ *étant égal à* 0, *ou à un nombre entier poſitif.*

SI on ſuppoſe $\theta = 0$, la propoſée eſt $\frac{dx}{1 \pm x}$, laquelle peut ſe rapporter à la formule générale $\frac{x^{n-1} dx}{e + fx^{n}}$, dont l'intégrale (par l'article 17.) eſt $\frac{1}{nf}$ $\left(\frac{e+fx^{n}}{e}\right)$: on aura donc par la comparaiſon de ces

termes $n = 1$, $e = 1$, $f = \pm 1$, & par conſéquent $\int \frac{dx}{1+x} = 1\left(\frac{1-x}{1}\right)$, & $\int \frac{dx}{1-x} = -1\left(\frac{1-x}{1}\right)$; qu'on tire une ligne AO = 1, (*fig.* 24.) & l'ayant prolongée en Q, de ſorte que OQ = AO, qu'on prenne la partie OP = x, & on aura $\int \frac{dx}{1+x} = AO\left(\frac{QP}{AO}\right)$, & $\int \frac{dx}{1-x} = -AO\left(\frac{AP}{AO}\right)$. Maintenant ſi θ eſt un nombre entier poſitif, on diviſera le numerateur $x^\theta dx$ par le dénominateur $1 \pm x$ en prenant $\pm x$ pour le premier terme du diviſeur, ce qui donnera $\frac{x^\theta dx}{1+x} = x^{\theta-1}dx - x^{\theta-2}dx + x^{\theta-3}dx - x^{\theta-4}dx$ + &c. $\pm \frac{dx}{1+x}$, & $\frac{x^\theta dx}{1-x} = -x^{\theta-1}dx - x^{\theta-2}dx - x^{\theta-3}dx - x^{\theta-4}dx$ — &c. $+ \frac{dx}{1-x}$; d'où l'on tire $\int \frac{x^\theta dx}{1+x} = \frac{x^\theta}{\theta} - \frac{x^{\theta-1}}{\theta-1} + \frac{x^{\theta-2}}{\theta-2} - \frac{x^{\theta-3}}{\theta-3}$ + &c. $\pm AO\left(\frac{QP}{AO}\right)$, & $\int \frac{x^\theta dx}{1-x} = -\frac{x^\theta}{\theta} - \frac{x^{\theta-1}}{\theta-1} - \frac{x^{\theta-2}}{\theta-2} - \frac{x^{\theta-3}}{\theta-3}$ — &c. $- AO\left(\frac{AP}{AO}\right)$; il faut continuer la ſuite des termes dans les deux intégrales juſqu'à ce que l'expoſant de x devienne égal à l'unité ; tous les termes de la premiére intégrale ont alternativement les ſignes + & —, & tous les

termes

termes de la seconde ont le signe —; par ce moyen on formera facilement les deux tables suivantes.

θ	$\frac{x^\theta dx}{1+x}$.
0	$AO\left\{\frac{QP}{AO}\right\}$.
1	$x - AO\left\{\frac{QP}{AO}\right\}$.
2	$\frac{x^2}{2} - x + AO\left\{\frac{QP}{AO}\right\}$.
3	$\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x - AO\left\{\frac{QP}{AO}\right\}$.
4	$\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - x + AO\left\{\frac{QP}{AO}\right\}$.
5	$\frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x - AO\left\{\frac{QP}{AO}\right\}$.
6	$\frac{x^6}{6} - \frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - x + AO\left\{\frac{QP}{AO}\right\}$.
&c.	

θ	$\frac{x^\theta dx}{1-x}$.
0	$-AO\left\{\frac{AP}{AO}\right\}$.
1	$-x-AO\left\{\frac{AP}{AO}\right\}$.
2	$-\frac{x^2}{2}-x-AO\left\{\frac{AP}{AO}\right\}$.
3	$-\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}-x-AO\left\{\frac{AP}{AO}\right\}$.
4	$-\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}-x-AO\left\{\frac{AP}{AO}\right\}$.
5	$-\frac{x^5}{5}-\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}-x-AO\left\{\frac{AP}{AO}\right\}$.
6	$-\frac{x^6}{6}-\frac{x^5}{5}-\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}-x-AO\left\{\frac{AP}{AO}\right\}$.
&c.	

On ſçait par la nature des Logarithmes que $-AO\left\{\frac{AP}{AO}\right\}=AO\left\{\frac{AO}{AP}\right\}$.

LEMME IV.

52. *TROUVER l'intégrale de la différentielle* $\frac{x^\theta dx}{1-2tx+xx}$, *$\theta$ étant égal à 0, ou à un nombre entier*

positif, & t étant une quantité moindre que l'unité.

PREMIEREMENT soit $\theta = 0$, & on supposera $x - t = v$, ce qui donnera $\frac{dx}{1 - 2tx + xx} = \frac{dv}{1 - tt + vv}$: or l'intégrale de $\frac{dv}{1 - tt + vv}$ (par l'art. 22.) est égale à $\frac{1}{1 - tt}$ multiplié par l'arc de cercle décrit du rayon $\sqrt{1 - tt}$, & dont la tangente est v ou $x - t$; c'est pourquoi qu'on décrive du centre O & du rayon OA = 1, (*fig.* 25. *&* 26.) une demi-circonférence de cercle ABQ, & qu'on prenne OP = x, & ON = t, & élevant jusqu'à la circonférence la perpendiculaire BN, & tirant BP & BO, on aura BN = $\sqrt{1 - tt}$ & $\overline{BP}^2 = 1 - 2tx + xx = 1 - tt + vv$; & si du centre B & du rayon BN on décrit l'arc de cercle CH qui rencontre BP en C & BO en H, l'intégrale de $\frac{dx}{1 - 2tx + xx}$ sera égale à $\frac{NC}{\overline{BN}^2} + Q$, (*fig.* 25.), si x est plus grand que t, (Q est la quantité qu'il faut ajoûter pour rendre cette intégrale complette); mais parce qu'en supposant $x = 0$, la tangente $x - t$ devient égale à $-t$, & que l'arc qui répond à cette tangente est NH, on aura $-\frac{NH}{\overline{BN}^2} + Q = 0$, & $Q = \frac{NH}{\overline{BN}^2}$, ce qui donne l'intégrale complette égale à $\frac{CH}{\overline{BN}^2}$, ou $\frac{1}{1 - tt}\sqrt{1 - tt}$ (PBO).

Si x eſt moindre que t, la tangente $x - t$ ou NP (*fig.* 26.) eſt négative, & par conſéquent auſſi l'arc NC, ainſi l'intégrale de $\frac{dx}{1 - 2tx + xx}$ dans ce cas ſera $- \frac{NC}{\overline{BN}^2} + Q$, mais lorſque $x = 0$, la tangente NP devient égale à NO, & l'arc NC égal à NH, on aura donc $- \frac{NH}{\overline{BN}^2} + Q = 0$, & $Q = \frac{NH}{\overline{BN}^2}$ ce qui donne l'intégrale complette égale à $\frac{CH}{\overline{BN}^2}$, ou $\frac{1}{1 - 2tt}\sqrt{1 - tt}\,(PBO)$: on a donc dans les deux cas $\frac{1}{1 - tt}\sqrt{1 - tt}\,(PBO)$ pour l'intégrale cherchée.

Maintenant ſi on ſuppoſe $\theta = 1$, puiſque $x = v + t$, on aura $\frac{x\,dx}{1 - 2tx + xx} = \frac{v\,dv}{1 - tt + vv} + \frac{t\,dv}{1 - tt + vv}$; or l'intégrale de $\frac{v\,dv}{1 - tt + vv}$ (par l'article 17.) eſt $\frac{1}{2}\left\{\frac{1 - tt + vv}{1}\right\} = \frac{1}{2}\left\{\frac{1 - 2tx + xx}{1}\right\} = \frac{1}{2}\left\{\frac{\overline{PB}^2}{\overline{BO}^2}\right\}$, mais (par l'art. 10.) $\frac{1}{2}\left\{\frac{\overline{PB}^2}{\overline{BO}^2}\right\} = 1\left\{\frac{PB}{BO}\right\} = BO\left\{\frac{PB}{BO}\right\}$; & l'intégrale de $\frac{t\,dv}{1 - tt + vv}$ eſt $\frac{t}{1 - tt}\sqrt{1 - tt}\,(PBO)$,

donc l'intégrale totale de $\frac{xdx}{1-2t+xx}$ est $BO\left\{\frac{PB}{BO}\right\}$ $+\frac{t}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,(PBO.)$

Par le moyen des intégrales des deux différentielles $\frac{dx}{1-2tx+xx}$, $\frac{xdx}{1-2tx+xx}$, on trouvera facilement celle de $\frac{x^2dx}{1-2tx+xx}$, car si on divise le numérateur par le dénominateur en prenant xx pour le premier terme du diviseur, on aura $\frac{x^2dx}{1-2tx+xx} = dx + \frac{2txdx-dx}{1-2tx+xx}$; & par le moyen des intégrales de $\frac{x^2dx}{1-2tx+xx}$, $\frac{xdx}{1-2tx+xx}$, on trouvera celle de $\frac{x^3dx}{1-2tx+xx}$, car la division donnera $\frac{x^3dx}{1-2tx+xx} = xdx + \frac{2tx^2dx-xdx}{1-2tx+xx}$, & ainsi des autres.

De cette façon on formera la table suivante

θ	$\frac{x^\theta dx}{1 - 2tx + xx}$
0	$\frac{1}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,(\mathrm{PBO})$.
1	$\mathrm{BO}\left\{\frac{\mathrm{PB}}{\mathrm{BO}}\right\} + \frac{t}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,(\mathrm{PBO})$.
2	$x + 2t\left\{\frac{\mathrm{PB}}{\mathrm{BO}}\right\} + \frac{2tt-1}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,(\mathrm{PBO})$.
3	$\frac{x^2}{2} + 2tx + \overline{4tt-1}\left\{\frac{\mathrm{PB}}{\mathrm{BO}}\right\} + \frac{4t^3-3t}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,[\mathrm{PBO}]$.
4	$\frac{x^3}{3} + \frac{2tx^2}{2} + \overline{4tt-1}\times x + \overline{8t^3-4t}\left\{\frac{\mathrm{PB}}{\mathrm{BO}}\right\} + \frac{8t^4-8tt+1}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,[\mathrm{PBO}]$.
5	$\frac{x^4}{4} + \frac{2tx^3}{3} + \frac{4tt-1}{2}x^2 + \overline{8t^3-4t}\times x + \overline{16t^4-12tt+1}\left\{\frac{\mathrm{PB}}{\mathrm{BO}}\right\} + \frac{16t^5-20t^3+5t}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,[\mathrm{PBO}]$.
6	$\frac{x^5}{5} + \frac{2tx^4}{4} + \frac{4tt-1}{3}x^3 + \frac{8t^3-4t}{4}x^2 + \overline{16t^4-12tt+1}\times x + \overline{32t^5-32t^3+6t}\left\{\frac{\mathrm{PB}}{\mathrm{BO}}\right\} + \frac{32t^6-48t^4+18tt-1}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,[\mathrm{PBO}]$.
7	$\frac{x^6}{6} + \frac{2tx^5}{5} + \frac{4tt-1}{4}x^4 + \frac{8t^3-4t}{3}x^3 + \frac{16t^4-12tt+1}{2}x^2 + \overline{32t^5-32t^3+6t}\times x + \overline{64t^6-80t^4+24tt-1}\left\{\frac{\mathrm{PB}}{\mathrm{BO}}\right\} + \frac{64t^7-112t^5+56t^3-7t}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,[\mathrm{PBO}]$.
&c.	

Qu'on ôte chacune de ces formules de ſa précédente après avoir multiplié par t celle qu'on ôte, & elles auront la forme ſuivante

θ	$\frac{x^{\theta}dx - tx^{\theta+1}dx}{1 - 2tx + xx}$.
0	$-t\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + \sqrt{1-tt}\,[PBO]$.
1	$-tx - \overline{2tt-1}\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + 2t\sqrt{1-tt}\,[PBO]$.
2	$-\frac{tx^2}{2} - \overline{2tt-1}\,xx - \overline{4t^3-3t}\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + \overline{4tt-1}\sqrt{1-tt}\,[PBO]$.
3	$-\frac{tx^3}{3} - \frac{2tt-1}{2}x^2 - \overline{4t^3-3t}\,x\,x - \overline{8t^4-8tt+1}\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + \overline{8t^3-4t}\sqrt{1-tt}\,[PBO]$.
4	$-\frac{tx^4}{4} - \frac{2tt-1}{3}x^3 - \frac{4t^3-3t}{2}x^2 - \overline{8t^4-8tt+1}\,x\,x - \overline{16t^5-20t^3+5t}\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + \overline{16t^4-12tt+1}\sqrt{1-tt}\,[PBO]$.
5	$-\frac{tx^5}{5} - \frac{2tt-1}{4}x^4 - \frac{4t^3-3t}{3}x^3 - \frac{8t^4-8tt+1}{2}x^2 - \overline{16t^5-20t^3+5t}\,x\,x - \overline{32t^6-48t^4+18tt+1}\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + \overline{32t^5-32t^3+6t}\sqrt{1-tt}\,[PBO]$.
6	$-\frac{tx^6}{6} - \frac{2tt-1}{5}x^5 - \frac{4t^3-3t}{4}x^4 - \frac{8t^4-8tt+1}{3}x^3 - \frac{16t^5-20t^3+5t}{2}x^2 - \overline{32t^6-48t^4+18tt-1}\,x\,x - \overline{64t^7-112t^5+56t^3-7t}\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + \overline{64t^6-80t^4+24tt-1}\sqrt{1-tt}\,[PBO]$.
&c.	

Maintenant on n'a qu'à comparer les termes de ces formules avec les équations aux ſinus & co-ſinus de

l'art. 42. & on verra clairement que tous les termes ici ſont multipliés par les valeurs des ſinus ou co-ſinus des arcs, double, triple, quadruple, &c. de celui dont le co-ſinus eſt t; de ſorte que t étant le co-ſinus de l'arc AB (*fig.* 25. & 26.) & ſuppoſant $s = \sqrt{1 - tt}$, ſi, comme dans l'art. 42. on nomme t'', t''', t^{iv}, &c. les coſinus, & s'', s''', s^{iv}, &c. les ſinus des arcs, double, triple, quadruple, &c. de AB, on abrégera les expreſſions des formules précédentes, & on les réduira en cette ſorte

θ	$\frac{x^{\theta}dx - tx^{\theta+1}dx}{1 - 2tx + xx}$
0	$-t\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + s\,[PBO]$.
1	$-tx - t''\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + s''\,[PBO]$.
2	$-\frac{tx^2}{2} - t''x - t'''\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + s'''\,[PBO]$.
3	$-\frac{tx^3}{3} - \frac{t''x^2}{2} - t'''x - t^{iv}\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + s^{iv}\,[PBO]$.
4	$-\frac{tx^4}{4} - \frac{t''x^3}{3} - \frac{t'''x^2}{2} - tx^{iv} - t^{v}\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + s^{v}\,[PBO]$.
5	$-\frac{tx^5}{5} - \frac{t''x^4}{4} - \frac{t'''x^3}{3} - \frac{t^{iv}x^2}{2} - t^{v}x - t^{vi}\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + s^{vi}\,[PBO]$.
6	$-\frac{tx^6}{6} - \frac{t''x^5}{5} - \frac{t'''x^4}{4} - \frac{t^{iv}x^3}{3} - \frac{t^{v}x^2}{2} - t^{vi}x - t^{vii}\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + s^{vii}\,[PBO]$.
&c.	

LEMME

LEMME V.

53. *TROUVER l'intégrale de la différentielle* $\frac{x^\theta dx}{1+2tx+xx}$, θ *étant égal à* 0, *ou à un nombre entier positif, &* t *étant une quantité moindre que l'unité.*

PREMIEREMENT ſoit $\theta = 0$, & on ſuppoſera $x + t = v$, ce qui donnera $1 + 2tx + xx = 1 - tt + vv$, & $\frac{dx}{1+2tx+xx} = \frac{dv}{1-tt+vv}$: or l'intégrale de $\frac{dv}{1-tt+vv}$ (par l'art. 32.) eſt égale à la quantité $\frac{1}{1-tt}$ multipliée par l'arc de cercle décrit du rayon $\sqrt{1-tt}$, & dont la tangente eſt v ou $x + t$: c'eſt pourquoi ſi on ſuppoſe comme dans le Lemme précédent OA $= 1$, (*fig.* 25. *&* 26.) OP $= x$, & ſi on prend OM $= t$ du côté oppoſé au point P, & qu'on éleve juſqu'à la circonférence la perpendiculaire MS, & qu'on tire SP & SO, on aura MS $= \sqrt{1-tt}$, & $\overline{PS}^2 = 1 + 2tx + xx = 1 - tt + vv$; & ſi du centre S & du rayon SM on décrit l'arc de cercle MR qui rencontre OS en L & PS en R, on aura $\int \frac{dx}{1+2tx+xx} = \frac{MR}{MS} + Q$, mais lorſque $x = 0$, la tangente MP devient égale à MO, & l'arc MR à ML, d'où l'on déduit $\frac{ML}{MS} + Q = 0$, & Q

$= -\frac{ML}{\overline{MS}^2}$, donc on aura $\int \frac{dx}{1+2tx+xx} = \frac{LR}{\overline{MS}^2} = \frac{1}{1-tt}\sqrt{1-tt}$ (PSO).

Maintenant si on suppose $\theta = 1$, puisque $x = v - t$, on aura $\frac{x\,dx}{1+2tx+xx} = \frac{v\,dv}{1-tt+vv} - \frac{t\,dv}{1-tt+vv}$: or l'intégrale de $\frac{v\,dv}{1-tt+vv}$ (par l'article 17.) est $\frac{1}{2}\left\{\frac{1-tt+vv}{1}\right\} = \frac{1}{2}\left\{\frac{1+2tx+xx}{1}\right\} = \frac{1}{2}\left\{\frac{\overline{PS}^2}{\overline{SO}^2}\right\} = SO\left\{\frac{PS}{SO}\right\}$; & $\int \frac{t\,dv}{1-tt+vv} = \frac{t}{1-tt}\sqrt{1-tt}$ (PSO), donc $\int \frac{x\,dx}{1+2tx+xx} = SO\left\{\frac{PS}{SO}\right\} - \frac{t}{1-tt}$ (PSO). Ayant les intégrales des différentielles $\frac{dx}{1+2tx+xx}$, $\frac{x\,dx}{1+2tx+xx}$, on trouvera celles de $\frac{x^2dx}{1+2tx+xx}$, $\frac{x^3dx}{1+2tx+xx}$, &c. de la même maniére que dans le Lemme précédent : d'où l'on conſtruira la table ſuivante

θ	$\int \frac{x^\theta dx}{1+2tx+xx}$
0	$\frac{1}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,(PSO)$.
1	$SO\left\{\frac{PS}{SO}\right\} - \frac{t}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,(PSO)$.
2	$x - 2t\left\{\frac{PS}{SO}\right\} + \frac{2tt-1}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,(PSO)$.
3	$\frac{x^2}{2} - 2tx + \overline{4tt-1}\left\{\frac{PS}{SO}\right\} - \frac{4t^3-3t}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,[PSO]$.
4	$\frac{x^3}{3} - \frac{2tx^2}{2} + \overline{4tt-1}\times x - \overline{8t^3-4t}\left\{\frac{PS}{SO}\right\} + \frac{8t^4-8tt+1}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,[PSO]$.
5	$\frac{x^4}{4} - \frac{2tx^3}{3} + \frac{4tt-1}{2}xx - \overline{8t^3-4t}\times x + \overline{16t^4-12tt+1}\left\{\frac{PS}{SO}\right\} - \frac{16t^5-20t^3+5t}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,[PSO]$.
6	$\frac{x^5}{5} - \frac{2tx^4}{4} + \frac{4tt-1}{3}x^3 + \frac{8t^3-4t}{2}xx + \overline{16t^4-12tt+1}\times x - \overline{32t^5-32t^3+6t}\left\{\frac{PS}{SO}\right\} + \frac{32t^6-48t^4+18tt-1}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,[PSO]$.
7	$\frac{x^6}{6} - \frac{2tx^5}{5} + \frac{4tt-1}{4}x^4 - \frac{8t^3-4t}{3}x^3 + \frac{16t^4-12tt+1}{2}xx - \overline{32t^5-32t^3+6t}\times x + \overline{64t^6-80t^4+24tt-1}\left\{\frac{PS}{SO}\right\} - \frac{64t^7-112t^5+56t^3-7t}{1-tt}\sqrt{1-tt}\,[PSO]$.
&c.	

Si on ajoûte enſemble ces formules deux à deux en multipliant toujours la ſeconde par t, on en for-

meroit d'autres dont les termes, comparés avec les équations aux ſinus & co-ſinus de l'art. 43. ſe trouvent multipliés par les valeurs des ſinus ou co-ſinus des arcs multiples de AS, comme on a trouvé à l'égard des formules du Lemme précédent : ſi donc l'on nomme s le ſinus de l'arc AS dont le co-ſinus eſt t, & s'', s''', s^{iv}, & t'', t''', t^{iv}, &c. les ſinus & co-ſinus des arcs, double, triple, quadruple, &c. de AS, on formera la table ſuivante ſemblable à la troiſiéme du Lemme précédent.

θ	$\frac{x^\theta dx - tx^{\theta+1} + dx}{1 + 2tx + xx}$
0	$-t\left\{\frac{PS}{SO}\right\} + s\,[PSO].$
1	$-tx - t''\left\{\frac{PS}{SO}\right\} + s''\,[PSO].$
2	$-\frac{tx^2}{2} - t''x - t'''\left\{\frac{PS}{SO}\right\} + s'''\,[PSO].$
3	$-\frac{tx^3}{3} - \frac{t''x^2}{2} - t'''x - t^{iv}\left\{\frac{PS}{SO}\right\} + s^{iv}\,[PSO].$
4	$-\frac{tx^4}{4} - \frac{t''x^3}{3} - \frac{t'''x^2}{2} - t^{iv}x - t^{v}\left\{\frac{PS}{SO}\right\} + s^{v}\,[PSO].$
5	$-\frac{tx^5}{5} - \frac{t''x^4}{4} - \frac{t'''x^3}{3} - \frac{t^{iv}x^2}{2} - t^{v}x - t^{vi}\left\{\frac{PS}{SO}\right\} + s^{vi}\,[PSO].$
6	$-\frac{tx^6}{6} - \frac{t''x^5}{5} - \frac{t'''x^4}{4} - \frac{t^{iv}x^3}{3} - \frac{t^{v}x^2}{2} - t^{vi}x - t^{vii}\left\{\frac{PS}{SO}\right\} + s^{vii}\,[PSO].$
&c.	

COROLLAIRE.

34. Si on ſuppoſe le co-ſinus $t = 0$, l'arc AB ou AS devient égal au quart de cercle AU, & l'angle PBO ou PSO égal à l'angle PUO; d'où il ſuit que les tables des formules des deux derniers Lemmes ſe réuniront toutes dans une ſeule qui eſt la ſuivante

θ	$\frac{x^\theta dx}{1+xx}$.
0	UO [PUO].
1	$UO\left\{\frac{PU}{UO}\right\}$.
2	$x - UO\,[PUO]$.
3	$\frac{x^2}{2} - UO\left\{\frac{PU}{UO}\right\}$.
4	$\frac{x^3}{3} - x + UO\,[PUO]$.
5	$\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + UO\left\{\frac{PU}{UO}\right\}$.
6	$\frac{x^5}{5} - \frac{x^3}{3} + x - UO\,[PUO]$.
7	$\frac{x^6}{6} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} - UO\left\{\frac{PU}{UO}\right\}$.
&c.	

Après tout ce qu'on a expoſé dans les Lemmes précédens, & les différentes formules qu'on y a con-

ſtruit, les calculs qu'il faudra faire pour trouver les intégrales des différentielles complexes, ſeront ſimples & faciles : on commencera par les différentielles dont les dénominateurs ſont des binomes.

Des différentielles binomes.

PROBLÊME I.

55. *TROUVER l'intégrale de la différentielle* $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}\,dz}{e+fz^n}$, $\frac{\delta}{\lambda}$ *étant une fraction poſitive pas plus grande que l'unité.*

ON ſuppoſera $\sqrt[\lambda]{\frac{fz^n}{e}} = x$, ce qui donnera $e + fz^n = e \times 1 + x^\lambda$, & $z^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}\,dz = \frac{1}{n}\sqrt[\lambda]{\frac{e^\delta}{f^\delta}} \times \lambda x^{\delta-1}\,dx$; d'où l'on aura $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}\,dz}{e+fz^n} = \frac{D\sqrt[\lambda]{\frac{e^\delta}{f^\delta}} \times \frac{\lambda x^{\delta-1}\,dx}{1+x^\lambda}}{n}$ ou $\frac{D\sqrt[\lambda]{\frac{f^{\lambda-\delta}}{e^{\lambda-\delta}}} \times \frac{\lambda x^{\delta-1}\,dx}{1+x^\lambda}}{nf}$: cela poſé, il peut arriver deux cas, car ou λ eſt un nombre pair ou impair.

PREMIER CAS.

Lorſque λ *eſt un nombre pair.*

DU centre O & du rayon OA = 1 ayant décrit une demi-circonférence de cercle ADG, (*fig.* 23.), on la diviſera en autant d'arcs égaux AB, BC, CD, &c. que le nombre λ contient d'unités, & on prendra

OP = x ; & du point P on tirera aux points des diviſions pris alternativement les lignes PB , PD, PF , &c ; & ſi on nomme , a , b , c , &c. les co-ſinus des arcs AB, AD, AF, &c. il eſt clair par l'art. 49. que

$$\frac{1}{1+x^\lambda} = \frac{1}{1-2ax+xx} \times \frac{1}{1-2bx+xx} \times \frac{1}{1-2cx+xx}$$

× &c. (dans ce produit les co-ſinus a, b, c, &c. ſont précédés du ſigne — ou +, ſelon qu'ils s'étendent du côté de P ou du côté oppoſé), ſi donc on multiplie cette équation par x^λ, ou ce qui revient au même, qu'on multiplie le premier membre par x^λ, & chaque produit du ſecond par xx , on aura

$$\frac{x^\lambda}{1+x^\lambda} = \frac{xx}{1-2ax+xx} \times \frac{xx}{1-2bx+xx} \times \frac{xx}{1-2cx+xx}$$

× &c. & prenant la différentielle logarithmique de cette équation (par l'art. 15.) on trouvera $\lambda x^{-1}dx - \frac{\lambda x^{\lambda-1}dx}{1+x^\lambda} = 2x^{-1}dx + \frac{2adx-2xdx}{1-2ax+xx} + 2x^{-1}dx + \frac{2bdx-2xdx}{1-2bx+xx} + 2x^{-1}dx + \frac{2cdx-2xdx}{1-2cx+xx}$ + &c. mais parceque $\lambda x^{-1}dx - \frac{\lambda x^{\lambda-1}dx}{1+x^\lambda} = \frac{\lambda x^{-1}dx}{1+x^\lambda}$, & pareillement $2x^{-1}dx + \frac{2adx-2xdx}{1-2ax+xx} = \frac{2x^{-1}dx-2adx}{1-2ax+xx}$, & $2x^{-1}dx + \frac{2bdx-2xdx}{1-2bx+xx} = \frac{2x^{-1}dx-2bdx}{1-2bx+xx}$, & ainſi des autres, l'on déduit $\frac{\lambda x^{-1}dx}{1+x^\lambda} = \frac{2x^{-1}dx-2adx}{1-2ax+xx} + \frac{2x^{-1}dx-2bdx}{1-2bx+xx} + \frac{2x^{-1}dx-2cdx}{1-2cx+xx}$ + &c. & multi-

θ	$\frac{x^\theta dx}{1 - 2tx + xx}$
0	$\frac{1}{1-tt}\sqrt{1-tt}$ (PBO).
1	$BO\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + \frac{t}{1-tt}\sqrt{1-tt}$ (PBO).
2	$x + 2t\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + \frac{2tt-1}{1-tt}\sqrt{1-tt}$ (PBO).
3	$\frac{x^2}{2} + 2tx + \overline{4tt-1}\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + \frac{4t^3-3t}{1-tt}\sqrt{1-tt}$ [PBO].
4	$\frac{x^3}{3} + \frac{2tx^2}{2} + \overline{4tt-1} \times x + \overline{8t^3-4t}\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + \frac{8t^4-8tt+1}{1-tt}\sqrt{1-tt}$ [PBO].
5	$\frac{x^4}{4} + \frac{2tx^3}{3} + \frac{4tt-1}{2}x^2 + \overline{8t^3-4t} \times x + \overline{16t^4-12tt+1}\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + \frac{16t^5-20t^3+5t}{1-tt}\sqrt{1-tt}$ [PBO].
6	$\frac{x^5}{5} + \frac{2tx^4}{4} + \frac{4tt-1}{3}x^3 + \frac{8t^3-4t}{4}x^2 + \overline{16t^4-12tt+1} \times x + \overline{32t^5-32t^3+6t}\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + \frac{32t^6-48t^4+18tt-1}{1-tt}\sqrt{1-tt}$ [PBO].
7	$\frac{x^6}{6} + \frac{2tx^5}{5} + \frac{4tt-1}{4}x^4 + \frac{8t^3-4t}{3}x^3 + \frac{16t^4-12tt+1}{2}x^2 + \overline{32t^5-32t^3+6t} \times x + 64t^6-80t^4+24tt-1\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + \frac{64t^7-112t^5+56t^3-7t}{1-tt}\sqrt{1-tt}$ [PBO].
&c.	

Qu'on ôte chacune de ces formules de ſa précédente après avoir multiplié par t celle qu'on ôte, & elles auront la forme ſuivante

PROBLÊME II.

56. *TROUVER l'intégrale de la différentielle* $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e-fz^n}$, $\frac{\delta}{\lambda}$ *étant une fraction positive pas plus grande que l'unité.*

On ſuppoſera comme dans le Problême précédent $\sqrt[\lambda]{\frac{fz^n}{e}}=x$, d'où l'on déduira $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e-fz^n}=\frac{D\sqrt[\lambda]{\frac{f^{\lambda-\delta}}{e^{\lambda-\delta}}}}{nf}\times\frac{\lambda x^{\delta-1}dx}{1-x^\lambda}$, & l'on voit que les deux cas du Problême précédent peuvent encore avoir lieu ici ; c'eſt pourquoi

PREMIER CAS.

Lorſque λ *eſt un nombre pair.*

Supposant ici encore la même conſtruction que dans le Problême précédent, on tirera aux points A, C, E, &c. les lignes PA, PC, PE, &c. & on déſignera maintenant les co-ſinus des arcs AC, AE, &c. par les lettres, a, b, &c. ce qui étant ſuppoſé, on aura (par l'art. 45. & 49.) $1-x^\lambda=\overline{1-x}\times\overline{1-2ax+xx}\times\overline{1-2bx+xx}\times\&c.\times\overline{1+x}$, ce qui donne $\frac{x^\lambda}{1-x^\lambda}=\frac{x}{1-x}\times\frac{xx}{1-2ax+xx}\times\frac{xx}{1-2bx+xx}\times\&c.\times\frac{x}{1+x}$, d'où par un calcul ſemblable à celui

du premier cas du Problême précédent, on tire $\frac{\lambda dx}{1-x^\lambda} = \frac{dx}{1-x} + \frac{2dx-2axdx}{1-2ax+xx} + \frac{2dx-2bxdx}{1-2bx+xx} +$ &c. $+ \frac{dx}{1-x}$ donc $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e-fz^n} = \frac{D\sqrt[\lambda]{\frac{f\lambda-\delta}{e^\lambda-\delta}}}{nf} \times \frac{\lambda x^{\delta-1}dx}{1+x^\lambda}$ $+ \frac{2x^{\delta-1}dx-2ax^\delta dx}{1-2ax+xx} + \frac{2x^{\delta-1}dx-2bx^\delta dx}{1-2bx+xx}$ + &c. $+ \frac{x^{\delta-1}dx}{1+x^\lambda}$ par conséquent on trouvera par les régles déja données l'intégrale cherchée.

SECOND CAS.

Lorsque λ est un nombre impair.

TOUTE la différence de ce cas au précédent est qu'on a ici $1-x^\lambda = \overline{1-x} \times \overline{1-2ax+xx} \times \overline{1-2bx+xx} \times$ &c. & par conséquent $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e-fz^n} = \frac{D\sqrt[\lambda]{\frac{f\lambda-\delta}{e^\lambda-\delta}}}{nf} \times \frac{x^{\delta-1}dx}{1-x^\lambda} + \frac{2x^{\delta-1}dx-2ax^\delta dx}{1-2ax+xx} +$ $\frac{2x^{\delta-1}dx-2bx^\delta dx}{1-2bx+xx}$ + &c. Donc &c. *C. Q. F. T.*

Pour ce qui est de la différentielle $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{-e+fz^n}$, comme elle est égale à cette autre $-\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e-fz^n}$, on en aura l'intégrale par le Problême précédent.

COROLLAIRE

57. PUISQUE dans les calculs précédens on a pris OA = 1, OP = $x = \sqrt[\lambda]{\frac{fz^n}{e}}$, il s'enſuit que, OP . OA :: $\sqrt[\lambda]{\frac{fz^n}{e}}$. 1 :: $\sqrt[\lambda]{\frac{z^n}{f}}$. $\sqrt[\lambda]{\frac{e}{f}}$, cette maniére d'exprimer le rapport de OP à OA ſuppoſe qu'on y prend les quantités, e, f, pour poſitives, ſoit qu'elles ſoient poſitives ou négatives dans la différentielle $\frac{Dz^{\frac{n}{\lambda}-1}dz}{e+fz^n}$; mais ſi on veut conſerver dans cette proportion les quantités avec les mêmes ſignes qu'elles ont dans la différentielle, il faut, lorſque l'une des deux quantités, e, f, eſt négative, exprimer la proportion en cette façon, OP . OA :: $\sqrt[\lambda]{z^n}$. $\sqrt[\lambda]{-\frac{e}{f}}$, pour que le rapport de OP à OA ſoit réel : c'eſt cette derniére maniére dont M. SMITH ſe ſert dans les tables.

AVERTISSEMENT.

POUR éclaircir davantage la théorie qu'on vient de donner, nous allons l'appliquer à quelques exemples, leſquels nous rapporterons aux tables afin d'en faire voir en même temps la conſtruction : mais pour entendre & comparer enſemble les exemples & les tables, il faut ſçavoir que le rayon com-

mun OA de tous les cercles dont on se sert est supposé égal à l'unité & que $OP = \sqrt[n]{\frac{fz^n}{e}}$, que les arcs égaux dans lesquels la circonférence est divisée sont AB, BC, CD, DE, &c. que β marque le double du co-sinus & ψ le double du sinus de l'arc AB ou des arcs qui ont le même sinus & co-sinus que AB, γ marque le double du co-sinus & χ le double du sinus de l'arc AC, c'est-à-dire de l'arc double de AB, δ marque le double du co-sinus & φ le double du sinus de l'arc triple de AB, & ainsi de suite.

PREMIER EXEMPLE.

Soit proposé de trouver l'intégrale de la différentielle $\frac{Dz^{n-1}dz}{e+fz^n}$; dans ce cas on peut supposer $\mu = 1$, & $\lambda = 1$, on divisera donc la demi-circonférence ANB (*fig.* 27.) en une seule partie (par le second cas de l'art. 55.), c'est-à-dire, on tirera le diamétre AB, & on aura par le même article $\frac{Dz^{n-1}dz}{e+fz^n} = \frac{D}{nf} \times \frac{dx}{1+x}$, dont l'intégrale par la première table de l'art. 51. est $\frac{D}{nf}\left(\frac{BP}{BO}\right)$: pareillement l'intégrale de $\frac{Dz^{n-1}dz}{e-fz^n}$ par la seconde table du même art. est $-\frac{D}{nf}\left(\frac{AP}{AO}\right)$ ou $\frac{D}{nf}\left(\frac{AP}{AO}\right)$ en prenant f pour une quantité négative.

SECOND EXEMPLE.

SOIT la proposée $\frac{Dz^{\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n}$: on aura $\Delta=1$, $\lambda=2$, & le premier cas de l'art. 55. fait voir qu'on aura $\frac{Dz^{\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n}=\frac{D}{nf}\sqrt{\frac{f}{e}}\times\frac{2dx}{1+xx}$, & qu'il faut diviser la demi-circonférence ABC (*fig.* 28.) également en deux au point B : son intégrale donc par la table de l'art. 54. est $\frac{D}{nf}\sqrt{\frac{f}{e}}\times 2BO\,(PBO)=\frac{D}{nf}\sqrt{\frac{f}{e}}\times\downarrow$ (PBO). Si la proposée étoit $\frac{Dz^{\frac{1}{2}n-1}dz}{e-fz^n}=\frac{D}{nf}\sqrt{\frac{f}{e}}\times\frac{dx}{1-x}+\frac{dx}{1+x}$ (par le premier cas de l'art. 56.) son intégrale par les tables de l'article 51. seroit $\frac{D}{nf}\sqrt{\frac{f}{e}}\times\overline{1\left(\frac{CP}{CO}\right)-1\left(\frac{AP}{AO}\right)}=\frac{D}{nf}\left(\frac{CP}{AP}\right)$.

TROISIEME EXEMPLE.

QU'IL faille trouver l'intégrale de cette différentielle $\frac{Dz^{\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n}$ dans ce cas $\Delta=1$, & $\lambda=3$; donc par le second cas de l'art. 55. $\frac{Dz^{\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n}=\frac{D}{nf}\sqrt[3]{\frac{ff}{ee}}\times\overline{\frac{2dx-2axdx}{1-2ax+xx}+\frac{dx}{1+x}}$, la demi-circonférence étant

ſuppoſée diviſée en trois arcs égaux AB, BC, CD, (*fig.* 29.) & *a* le co-ſinus de AB : or en comparant la différentielle $\frac{2dx - 2axdx}{1 - 2ax + xx}$ avec la formule de la troiſiéme table de l'art. 52, on trouve $\theta = 0$, & $t = a$, donc ſon intégrale eſt $- 2t\left(\frac{PB}{BO}\right) + 2s$ (PBO), mais $2t = \beta^{\circ}$, & $2s = \downarrow$, & $\int \frac{dx}{1+x} = 1\left\{\frac{DP}{DO}\right\}$ par l'art. 51 : donc $\int \frac{Dz^{\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n} = \frac{D}{nf}\sqrt[3]{\frac{ff}{ee}} \times - \beta\left\{\frac{BP}{BO}\right\} + 1\left\{\frac{DP}{DO}\right\} + \downarrow$ (PBO).

Et ſi la propoſée avoit cette forme $\frac{Dz^{\frac{1}{3}n-1}dz}{e-fz^n}$, elle eſt égale (par le ſecond cas de l'art. 56.) à cette autre $\frac{D}{nf}\sqrt[3]{\frac{ff}{ee}} \times \frac{dx}{1-x} + \frac{2dx + 2bxdx}{1 + 2bx + xx}$, *b* étant ſuppoſé le co-ſinus de l'arc AC ; donc par les tables des art. 51. & 53, on trouve que l'intégrale demandée eſt $\frac{D}{nf}\sqrt[3]{\frac{ff}{ee}} \times \beta\left\{\frac{CP}{CO}\right\} - 1\left\{\frac{AP}{AO}\right\} + \downarrow$ (PCO), puiſque l'arc AC a le même ſinus & co-ſinus que l'arc AB, ſi ce n'eſt qu'il faut prendre ſon co-ſinus négativement.

QUATRIEME EXEMPLE.

SOIT maintenant propoſée la différentielle $\frac{Dz^{\frac{3}{3}n-1}dz}{e+fz^n}$, où $\lambda = 3$, & $\lambda = 5$, ce qui fait voir

que la demi-circonférence étant divisée (*fig.* 31.) en cinq parties égales AB, BC, CD, DE, EF, & les co-sinus des arcs AB, AD étant marqués par, a, b, on aura $\frac{Dz^{\frac{3}{3}n-1}dz}{e+fz^n} = \frac{D}{nf}\sqrt[3]{\frac{ff}{ee}} \times \frac{2x^2dx - 2ax^3dx}{1-2ax+xx} + \frac{2x^2dx+2bx^3dx}{1+2bx+xx} + \frac{x^2dx}{1+x}$: or par la table de l'art. 52. on trouve $\int\frac{2x^2dx-2ax^3dx}{1-2ax+xx} = -ax^2 - 2a''x - 2a'''\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + 2s'''(PBO)$; & par la table de l'article 53. $\int\frac{2x^2dx+2bx^3dx}{1+2bx+xx} = -bx^2 - 2b''x - 2b'''\left\{\frac{PD}{DO}\right\} + 2s'''$ (PDO) ; & par la table de l'art. 51. $\int\frac{x^2dx}{1+x} = \frac{x^2}{2} - x + 1\left\{\frac{FP}{FO}\right\}$; donc l'intégrale totale sera

$$\begin{aligned}&-ax^2 - 2a''x - 2a'''\left\{\frac{PB}{BO}\right\} + 2s'''(PBO).\\ \frac{D}{nf}\sqrt[3]{\frac{ff}{ee}} \times &-bx^2 - 2b''x - 2b'''\left\{\frac{PD}{DO}\right\} + 2s'''(PDO).\\ &+\frac{x^2}{2} - x + 1\left\{\frac{FP}{FO}\right\}.\end{aligned}$$

Or observant la loi touchant les sinus & co-sinus positifs & négatifs donnée dans l'art. 42, on trouve $2a = \beta$, $2a'' = \gamma$, $2a''' = -\gamma$, $2s''' = \chi$, pareillement $2b = -\gamma$, $2b'' = -\beta$, $2b''' = \beta$, $2s''' = -\psi$, & par l'art. 47. on a $\beta - \gamma - 1 = 0$, donc on déduira $-ax^2 - bx^2 + \frac{1}{2} = -\frac{\beta x^2}{2} + \frac{\gamma x^2}{2} + \frac{x^2}{2} = 0$; & par la

même raiſon $-2a''x-2b''x-x=-\gamma x+\beta x-\lambda=0$; par conſéquent l'intégrale totale ſe réduit à $\frac{D}{nf}\sqrt[5]{\frac{ff}{ee}}\,x+\gamma\left\{\frac{PB}{BO}\right\}-\beta\left\{\frac{PD}{DO}\right\}+1\left\{\frac{PF}{FO}\right\}+\chi(PBO)-\psi(PDO)$.

On trouveroit d'une façon ſemblable l'intégrale de $\frac{Dz^{\frac{3}{1}n-1}dz}{e-fz^n}$.

CINQUIEME EXEMPLE.

SOIT propoſée en dernier lieu la différentielle $\frac{Dz^{\frac{5}{6}n-1}dz}{e+fz^n}$: dans ce cas on a $\mu=5$, $\lambda=6$; c'eſt pourquoi on diviſera la demi-circonférence de cercle en ſix parties égales aux points B, C, D, E, F, G, (*fig.* 52.) & nommant a le co-ſinus de l'arc AB, b celui de l'arc AF, on aura o pour le co-ſinus de l'arc AD, & le premier cas de l'art. 55. donnera $\frac{Dz^{\frac{5}{6}n-1}dz}{e+fz^n}=\frac{D\,6\sqrt{f}}{nf}\times\frac{2x^4dx-2ax^1dx}{1-2ax+xx}+\frac{2x^4dx}{1+xx}+\frac{2x^4dx+2bx^1dx}{1+2bx+xx}$ & faiſant uſage des tables données dans les articles 52, 53, 54, on trouvera que la ſomme des intégrales de ces trois différentielles eſt - - - - - - - - -

$\frac{D}{nf}$

$$-\frac{2ax^4}{4}-\frac{2a''x^3}{3}-\frac{2a'''x^2}{2}-2a^{iv}x-2a^{v}\left\{\frac{PB}{BO}\right\}+2s^{v}(PBO)$$

$$\frac{D}{nf}\sqrt[6]{\frac{f}{e}}\times \quad . \quad . \quad +\frac{2x^3}{3} \quad . \quad . \quad -2x \quad . \quad . \quad +2DO(PDO)$$

$$-\frac{2bx^4}{4}-\frac{2b''x^3}{3}-\frac{2b'''x^2}{2}-2b^{iv}x-2b^{v}\left\{\frac{PF}{FO}\right\}+2s^{v}(PFO).$$

Or en prenant des arcs, double, triple, quadruple, &c. des arcs AB & AF, on aura $2a=\beta$, $2a''=\gamma$, $2a'''=0$, $2a^{iv}=-\gamma$, $2a^{v}=-\beta$, $2s^{v}=\downarrow$, & $2b=-\beta$, $2b''=\gamma$, $2b'''=0$, $2b^{iv}=-\gamma$, $2b^{v}=\beta$, $2s^{v}=\downarrow$, d'où l'on déduit $-\frac{2ax^4}{4}-\frac{2bx^4}{4}=-\frac{\beta x^4}{4}+\frac{\beta x^4}{4}=0$, pareillement $-\frac{2a''x^3}{3}+\frac{2x^3}{3}-\frac{2b''x^3}{3}=-\frac{\gamma x^3}{3}+\frac{2x^3}{3}-\frac{\gamma x^3}{3}=0$ (par l'art. 47.) & $-\frac{2a'''x^2}{2}-\frac{2b'''x^2}{2}=0$, auſſi $-2a^{iv}x-2x-2b^{iv}x=+\gamma x-2x+\gamma x=0$; il ſuit donc que l'intégrale demandée eſt $\frac{D}{nf}\sqrt[6]{\frac{f}{e}}\times+\beta\left\{\frac{PB}{BO}\right\}-\beta\left\{\frac{PF}{FO}\right\}+\downarrow(PBO)+2DO(PDO)+\downarrow(PFO)$.

De cette maniére on pourroit ſe propoſer des différentielles en auſſi grand nombre qu'on jugeroit à propos, & par les mêmes régles on trouveroit leurs intégrales, leſquelles ne contiendroient que des logarithmes & des arcs de cercle, puiſque tous les autres termes étant multipliés par la ſomme des co-ſinus poſitifs & négatifs néceſſairement deviennent nuls (par l'art. 47.).

REMARQUE.

La méthode qu'on a donnée pour trouver les intégrales des différentielles composées paroît assez simple, & une conséquence naturelle des principes & fondemens de la théorie que nous traitons, elle semble lui être tellement appropriée, qu'elle devroit se présenter à l'esprit la première; on ne peut juger si c'est la même dont se servit M. CÔTES ou quelque autre, parce qu'on n'a jamais rendu autre chose publique de sa méthode, que le Théoréme de la division du cercle donné dans l'article 49: Mais quelques avantages que puisse avoir cette méthode, il y en a néanmoins encore une autre qui, quoiqu'on n'y parvienne que par un plus grand nombre de principes & des détours plus recherchés, cependant emporte sur la précédente en ce qu'elle est plus générale, & donne des solutions beaucoup plus simples & plus élégantes; c'est pourquoi nous ferons nos efforts d'en donner une explication la plus claire qu'il sera possible.

Autre méthode pour trouver les intégrales des différentielles binomes.

LEMME I.

58. *REDUIRE la fraction générale* $\frac{x^{\theta}}{L + Mx + Nx^{2} + Px^{3} \ldots\ldots + Ux^{\lambda}}$ *en plusieurs fractions simples, l'exposant* θ *étant supposé moindre que* λ, *&* L, M, N, *&c. des quantités données.*

Il faut trouver les diviſeurs du dénominateur $L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda$, ce que l'on peut faire en ſuppoſant $L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda = o$, & cherchant les racines de cette équation, puiſque les racines d'une équation en ſont toujours des diviſeurs : ſi donc on ſuppoſe que ces racines ſont $e + fx = o$, $g + hx = o$, $k + lx = o$, &c. on aura $L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda = \overline{e+fx} \times \overline{g+hx} \times \overline{k+lx} \times$ &c. on ſuppoſera en ſecond lieu $\frac{x^\theta}{\overline{e+fx} \times \overline{g+hx} \times \overline{k+lx} \times \&c.} = \frac{A}{e+fx} + \frac{B}{g+hx} + \frac{C}{k+lx} +$ &c. ce qui donnera $x^\theta = A \times \overline{g+hx} \times \overline{k+lx} \times$ &c. $+ B \times \overline{e+fx} \times \overline{k+lx} \times$ &c. $+ C \times \overline{e+fx} \times \overline{g+hx} \times$ &c. $+$ &c. Pour abréger les expreſſions, on ſuppoſera $\overline{g+hx} \times \overline{k+lx} \times$ &c. $= Q$, $\overline{e+fx} \times \overline{k+lx} \times$ &c. $= R$, $\overline{e+fx} \times \overline{g+hx} \times$ &c. $= S$, & $L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda = K$, on aura donc $x^\theta = AQ + BR + CS +$ &c. mais la ſuppoſition de $e + fx = o$, donne $x = -\frac{e}{f}$, $x^\theta = -\frac{e^\theta}{f^\theta}$, & $R = o$, & $S = o$, &c. d'où l'on tire dans ce cas $-\frac{e^\theta}{f^\theta} = AQ$, & $A = \frac{-\frac{e^\theta}{f^\theta}}{Q}$, mais $\overline{e+fx} \times Q = K$, & prenant la différence

$fdx \times Q + dQ \times \overline{e + fx} = dK$, ou plutôt puiſque $e + fx = o$, $fdx \times Q = dK$, & ainſi $Q = \frac{dK}{fdx}$ $= \frac{M - 2N \times \frac{e}{f} + 3P \times \frac{ee}{ff} \ldots\ldots - \lambda U \times \frac{e^{\lambda-1}}{f^{\lambda-1}}}{f}$, donc en mettant cette valeur dans l'équation $A = \frac{-\frac{e'}{f'}}{Q}$, on aura $A = \frac{-\frac{e'}{f'} \times f}{M - 2N \times \frac{e}{f} + 3P \times \frac{ee}{ff} \ldots\ldots - \lambda U \times \frac{e^{\lambda-1}}{f^{\lambda-1}}}$

Pareillement ſi on ſuppoſe $g + bx = o$, on aura $x = -\frac{g}{b}$, $x' = -\frac{g'}{b'}$, & $Q = o$, & $S = o$, par conſéquent $-\frac{g'}{b'} = BR$, & $B = \frac{-\frac{g'}{b'}}{R}$, mais puiſque $K = \overline{g + bx} \times R$ on aura $dK = bdx \times R + dR \times \overline{g + bx}$, & dans ce cas $dK = bdx \times R$, ce qui donne $R = \frac{dK}{bdx}$, d'où l'on tire $B = \frac{-\frac{g'}{b'} \times b}{dK} =$ $\frac{-\frac{g'}{b'} \times b}{M - 2N \times \frac{g}{b} + 3P \times \frac{gg}{bb} \ldots\ldots - \lambda U \times \frac{g^{\lambda-1}}{b^{\lambda-1}}}$

L'on trouveroit de la même maniére $C = \frac{-\frac{k'}{l'} \times l}{M - 2N \times \frac{k}{l} + 3P \times \frac{kk}{ll} \ldots\ldots - \lambda U \times \frac{k^{\lambda-1}}{l^{\lambda-1}}}$, & ainſi

des autres. En mettant donc ces valeurs de A, B, C, &c. on aura $\frac{x^\theta}{L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda} = \frac{A}{e+fx} + \frac{B}{g+bx} + \frac{C}{k+lx} + \&c.$ *C. Q. F. T.*

COROLLAIRE I.

59. Il eſt donc clair que, puiſque les valeurs de A, B, C, &c. ſont toutes ſemblables, on peut tirer une régle générale pour réſoudre une fraction compoſée $\frac{x^\theta}{L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda}$ en pluſieurs fractions ſimples telles que $\frac{A}{e+fx}, \frac{B}{g+bx}, \frac{C}{k+lx}$, &c ; car on voit que la valeur d'un terme quelconque, par exemple de B, eſt une fraction dont le numerateur eſt égal à $x^\theta \times b$, & le dénominateur égal à la différence du dénominateur de la fraction propoſée diviſée par dx, en mettant dans le numérateur & dénominateur la valeur de x tirée de l'équation reſpective $g + bx = 0$. On doit obſerver que les numérateurs des valeurs de A, B, C, &c. ont le ſigne +, lorſque θ eſt un nombre pair en y comprenant le 0 : on doit encore y ſubſtituer le ſigne + lorſque les valeurs reſpectives de x ſont poſitives, par exemple, ſi les diviſeurs du dénominateur de la fraction propoſée étoient $e - fx$, $g - bx$, $k - lx$, &c, car les valeurs de x dans ce cas ſeroient $+\frac{e'}{f'}$, $+\frac{g'}{b'}$, $+\frac{k'}{l'}$, &c : auſſi dans ce mê-

me cas le dénominateur de la propoſée auroit cette forme $L - Mx + Nx^2 - Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda$ puiſque toutes ſes racines ſont ſuppoſées poſitives, d'où il eſt évident que les termes des dénominateurs des fractions égales à A, B, C, &c. ont toujours alternativement les ſignes + & —.

Ce qu'on vient de dire s'éclaircira davantage par l'application qu'on en va faire à quelques exemples. Soit propoſé de décompoſer la fraction $\frac{1}{\overline{e+fx} \times \overline{g+hx}}$ en ces deux autres $\frac{A}{e+fx} + \frac{B}{g+hx}$, dans ce cas on a $x^\theta = 1$, donc $\theta = 0$, & ſuppoſant $e + fx = 0$, on tire $x = -\frac{e}{f}$ donc par la régle donnée ci-deſſus le numérateur de la fraction égale à A eſt $-\frac{e^\theta}{f^\theta} \times f = f$, & puiſque la différence de $\overline{e+fx} \times \overline{g+hx}$ eſt $fdx \times \overline{g+hx} + hdx \times \overline{e+fx} = fg - eh$ en diviſant par dx & mettant $-\frac{e}{f}$ au lieu de x, donc le dénominateur de la fraction égale à A eſt $fg - eh$; par conſéquent $A = \frac{f}{fg-eh}$; on trouve de la même maniére, en ſuppoſant $g + hx = 0$, $B = \frac{h}{eh-fg}$, donc $\frac{1}{\overline{e+fx} \times \overline{g+hx}} = \frac{f}{fg-eh} \times \frac{1}{e+fx} - \frac{h}{fg-eh} \times \frac{1}{g+hx}$.

Pareillement pour réduire la fraction $\frac{zz}{hz^3 - gz^2 + fz - e^3}$

on ſuppoſera que les diviſeurs du dénominateur $bz^3 - gz^2 + fz - e$ ſont $xz - k$, $\lambda z - l$, $\mu z - m$, & que $\frac{zz}{bz^3 - gz^2 + fz - e} = \frac{A}{xz - k} + \frac{B}{\lambda z - l} + \frac{C}{\mu z - m}$, on a donc ici $\theta = 2$, & la ſuppoſition de $xz - k = 0$ donne $z = \frac{k}{x}$, & la différence de $bz^3 - gz^2 + fz - e$ ou de $\overline{xz - k} \times \overline{\lambda z - l} \times \overline{\mu z - m}$ diviſée par dz en y ſubſtituant $\frac{k}{x}$ au lieu de z eſt égale à $\frac{kk\lambda\mu - kxl\mu - kx\lambda m + xxlm}{x} = \frac{\overline{k\lambda - xl} \times \overline{k\mu - xm}}{x}$, d'où l'on déduit $A = \frac{kk}{\overline{k\lambda - xl} \times \overline{k\mu - xm}}$; par un calcul ſemblable en ſuppoſant $\lambda z - l = 0$ on trouve $B = -\frac{ll}{\overline{k\lambda - xl} \times \overline{l\mu - \lambda m}}$; & en ſuppoſant $\mu z - m = 0$, $C = \frac{mm}{\overline{k\mu - xm} \times \overline{l\mu - \lambda m}}$: ſi on ſubſtitue ces valeurs dans les fractions ſimples ci-deſſus, la ſomme de ces fractions égalera la propoſée.

REMARQUE.

60. NOUS avons ſuppoſé dans le Lemme que l'expoſant θ de x dans le numérateur de la fraction propoſée eſt moindre que l'expoſant λ de x dans le dénominateur, ce qu'il eſt néceſſaire d'obſerver; & la raiſon en eſt que dans la ſomme des fractions ſimples auxquelles la propoſée eſt réduite, la va-

riable x ne peut avoir un exposant égal ou plus grand que celui qu'elle a au dénominateur : par exemple, qu'on suppose une fraction donnée réduite en ces trois $\frac{A}{e+fx} + \frac{B}{g+hx} + \frac{C}{i+lx}$, puisque les quantités A, B, C, sont données, il est clair qu'en prenant la somme de cette maniére $\frac{A \times \overline{g+hx} \times \overline{k+lx} + B \times \overline{e+fx} \times \overline{k+lx} + C \times \overline{e+fx} \times \overline{g+hx}}{\overline{e+fx} \times \overline{g+hx} \times \overline{k+lx}}$, x ne peut monter qu'au quarré dans le numérateur, au lieu que dans le dénominateur elle monte au cube. On voit que le même raisonnement a lieu dans toutes les autres fractions auxquelles on suppose qu'une fraction donnée est réduite. C'est pourquoi s'il arrive que dans la proposée $\frac{x^\theta}{L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda}$ l'exposant θ soit égal ou plus grand que λ, il faut préparer la fraction en divisant le numérateur par le dénominateur ensorte qu'on prenne Ux^λ pour le premier terme du diviseur, & continuant la division jusqu'à ce qu'on vienne à une fraction, dans le numérateur de laquelle l'exposant de x est moindre que λ, & cette derniére fraction se résoudra par la régle précédente.

COROLLAIRE II.

61. SI la fraction proposée avoit cette forme $\frac{a + bx + cx^2 + \delta x^3 + \&c.}{L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda}$, l'exposant de x dans le

le numérateur étant ſuppoſé moindre que λ, on la réſoudroit en pluſieurs fractions ſimples de cette nature $\frac{A}{e+fx} + \frac{B}{g+hx} + \frac{C}{k+lx}$ + &c. par la même méthode dont on s'eſt ſervi dans le Lemme : car ſuppoſant $L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda = \overline{e+fx} \times \overline{g+hx} \times \overline{k+lx} \times$ &c. $= K$, & donnant ici les mêmes valeurs à Q, R, S, qu'on leur a donné dans le Lemme, on aura $a + bx + cx^2 + \delta x^3 +$ &c. $=$ AQ + BR + CS + &c. & lorſque $e + fx = o$, ou $x = -\frac{e}{f}$, $a - b\frac{e}{f} + c\frac{ee}{ff} - \delta\frac{e^3}{f^3} +$ &c. $=$ AQ, & puiſque $Q = \frac{dK}{f dx} = \frac{M - 2N\frac{e}{f} + 3P\frac{ee}{ff} \ldots\ldots - \lambda U\frac{e^{\lambda-1}}{f^{\lambda-1}}}{f}$ on déduit $A = \frac{a - b\frac{e}{f} + c\frac{ee}{ff} - \delta\frac{e^3}{f^3} +$ &c. $\times f}{M - 2N\frac{e}{f} + 3P\frac{ee}{ff} \ldots\ldots - \lambda U\frac{e^{\lambda-1}}{f^{\lambda-1}}}$; de la même maniére en ſuppoſant $g + hx = o$, on trouve $B = \frac{a - b\frac{g}{h} + c\frac{gg}{hh} - \delta\frac{g^3}{h^3} +$ &c. $\times h}{M - 2N\frac{g}{h} + 3P\frac{gg}{hh} \ldots\ldots - \lambda U\frac{g^{\lambda-1}}{h^{\lambda-1}}}$ & ſuppoſant $k + lx = o$, $C = \frac{a - b\frac{k}{l} + c\frac{kk}{ll} - \delta\frac{k^3}{l^3} +$ &c. $\times l}{M - 2N\frac{k}{l} + 3P\frac{kk}{ll} \ldots\ldots - \lambda U\frac{k^{l-1}}{l^{l-1}}}$;

& ainſi des autres. L'on voit donc que les valeurs de A, B, C, &c. dans ce cas ſont ſemblables à celles qu'on a trouvées dans le cas du Lemme, & qu'il n'y a de différence que dans les numérateurs qui changent ſuivant les numérateurs des fractions propoſées.

LEMME II.

62. *SOIT propoſé de réduire la fraction* $\frac{x^\theta}{L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda}$ *en pluſieurs fractions dont les dénominateurs ſoient trinomes, comme* $\frac{A + Bx}{a + bx + cxx} + \frac{C + Dx}{e + fx + gxx} + \frac{E + Fx}{b + kx + lxx} + \&c.$ *on ſuppoſe encore que* θ *eſt un nombre moindre que* λ.

Il faut ſuppoſer $L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda = \overline{a + bx + cxx} \times \overline{e + fx + gxx} \times \overline{b + kx + lxx} \times$ &c. on ſuppoſera auſſi $\overline{e + fx + gxx} \times \overline{b + kx + lxx} \times$ &c. $= Q$, $\overline{a + bx + cxx} \times \overline{b + kx + lxx} \times$ &c. $= R$, $\overline{a + bx + cxx} \times \overline{e + fx + gxx} \times$ &c. $= S$; cela poſé, on aura $\frac{x^\theta}{L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda} = \frac{A + Bx}{a + bx + cxx} + \frac{C + Dx}{e + fx + gxx} + \frac{E + Fx}{b + kx + lxx} +$ &c. & $x^\theta = \overline{A + Bx} \times Q + \overline{C + Dx} \times R + \overline{E + Fx} \times S +$ &c. mais ſi on ſuppoſe $a + bx + cxx = o$, alors on a $R = o$, $S = o$, &c, & par conſéquent $x^\theta = \overline{A + Bx} \times Q$; & ſi les racines de l'équation $a + bx + cxx = o$ ſont $m + nx = o$, $p + qx = o$, on

aura $x = -\frac{m}{n}$, & $x = -\frac{p}{q}$; lorſque $x = -\frac{m}{n}$, on a $Q = e - f\frac{m}{n} + g\frac{m^2}{n^2} \times h - k\frac{m}{n} + l\frac{m^2}{n^2} \times$ &c. & lorſque $x = -\frac{p}{q}$, $Q = e - f\frac{p}{q} + g\frac{p^2}{q^2} \times h - k\frac{p}{q} + l\frac{p^2}{q^2} \times$ &c. pour diſtinguer cette derniére valeur de Q de la premiére, nous la marquerons par Q''; ainſi pour les deux différentes valeurs de x, l'équation $x^\theta = A + Bx \times Q$ ſe réſoudra en les deux ſuivantes $-\frac{m^\theta}{n^\theta} = A - B\frac{m}{n} \times Q$, $-\frac{p^\theta}{q^\theta} = A - B\frac{p}{q} \times Q''$, d'où l'on déduit $A = \frac{Q''\frac{m^\theta - 1}{n^\theta - 1} - Q\frac{p^\theta - 1}{q^\theta - 1}}{\frac{q}{p} - \frac{n}{m} \times QQ''}$ & $B = \frac{Q''\frac{qm^\theta - 1}{pn^\theta - 1} - Q\frac{np^\theta - 1}{mq^\theta - 1}}{\frac{q}{p} - \frac{n}{m} \times QQ''}$; ces valeurs ſuppoſent que θ eſt un nombre impair : mais lorſque θ eſt égal à o, ou à un nombre pair, alors on aura les valeurs ſuivantes $A = \frac{Q\frac{p^\theta - 1}{q^\theta - 1} - Q''\frac{m^\theta - 1}{n^\theta - 1}}{\frac{q}{p} - \frac{m}{n} \times QQ''}$ & $B = \frac{Q\frac{np^\theta - 1}{mq^\theta - 1} - Q''\frac{qm^\theta - 1}{pn^\theta - 1}}{\frac{q}{p} - \frac{n}{m} \times QQ''}$.

Pareillement en ſuppoſant $e + fx + gxx = o$, on a $Q = o$, $S = o$ &c. & $x^{\theta} = \overline{C + Dx} \times R$, & ſi $r + sx = o$, $t + vx = o$, ſont les racines de l'équation $e + fx + gxx = o$, on aura $x = -\frac{r}{s}$, & $x = -\frac{t}{v}$, d'où par un calcul ſemblable à celui qu'on vient de faire pour A & B, on trouvera $C = \frac{\pm R\frac{t^{\theta}-1}{v^{\theta}-1} \mp R''\frac{r^{\theta}-1}{s^{\theta}-1}}{\frac{v}{t}-\frac{s}{r} \times RR''}$, & $D = \frac{\pm R\frac{s t^{\theta}-1}{r v^{\theta}-1} \mp R''\frac{v r^{\theta}-1}{s s^{\theta}-1}}{\frac{v}{t}-\frac{s}{r} \times RR''}$; il faut ſe ſervir des ſignes + — lorſque θ eſt un nombre pair en y comprenant le o, & des ſignes — + lorſque c'eſt un nombre impair. Les valeurs de E, F, &c. ſont ſemblables. *C. Q. F. T.*

COROLLAIRE I.

63. DANS le premier Lemme on a réſolu une fraction compoſée en pluſieurs fractions dont les dénominateurs étoient des diviſeurs ſimples du dénominateur de la propoſée : mais quelquefois il arrive que ces diviſeurs ſimples deviennent impoſſibles, ou ce qui eſt la même choſe, que l'équation $L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^{\lambda} = o$ eſt compoſée de racines imaginaires ; or puiſque l'on ſçait que le produit de deux racines imaginaires correſpondantes donne une quantité réelle, & que ces racines ſont toujours un nombre pair dans une équation où il

n'y a point de quantités incommenſurables ; il ſuit que dans ce cas, où le premier Lemme ne peut avoir lieu, le ſecond donnera la réduction de la fraction propoſée.

COROLLAIRE II.

64. Si l'équation $L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda = 0$, a des racines imaginaires & d'autres réelles, on la réſoudra encore comme dans le dernier Lemme : car ſuppoſons $\frac{x^\theta}{L + Mx + Nx^2 + Px^3 \ldots\ldots + Ux^\lambda} = \frac{A + Bx}{a + bx + cxx} + \frac{C + Dx}{e + fx + gxx}$ &c. $+ \frac{H}{k + lx}$. Alors on aura $Q = \overline{e + fx + gxx} \times$ &c. $\times \overline{k + lx}$; $R = \overline{a + bx + cxx} \times$ &c. $\times \overline{k + lx}$, $S = \overline{a + bx + cxx} \times \overline{e + fx + gxx} \times$ &c. or ayant égard à ces valeurs on voit que les quantités A, B, C, D, &c. ſeront exprimées par les mêmes formules ; & la ſuppoſition de $k + lx = 0$ donne $Q = 0$, $R = 0$ &c. & $-\frac{k}{l} = x$, & $-\frac{k^\theta}{l^\theta} = H \times S$, & $H = -\frac{k^\theta}{l^\theta} \times \frac{1}{S}$, S étant $= \overline{a - b\frac{k}{l} + c\frac{kk}{ll}} \times \overline{e - f\frac{k}{l} + g\frac{kk}{ll}} \times$ &c. Ce cas a lieu auſſi, lorſque l'expoſant λ eſt un nombre impair.

Pour faciliter davantage la réduction des fractions compoſées, nous allons appliquer les formules précédentes à un ou deux exemples : mais afin d'obvier

à quelques difficultés qui pourroient ſe préſenter dans le calcul, on mettra ici trois remarques.

I.

QUOIQUE nous ayons obſervé que les racines $\frac{m}{n}$, $\frac{p}{q}$ &c. ſont quelquefois imaginaires, cependant il n'y a pas lieu de craindre que les valeurs de A, B, C, D, &c. ſoient embarraſſées de quantités impoſſibles, parce que les termes du numérateur, par exemple de la formule égale à A, ſe trouvent toujours diviſibles par le diviſeur $\frac{q}{p} - \frac{n}{m}$, & que le quotient auſſi bien que la valeur du produit QQ'' n'eſt compoſé que de la ſomme & du produit des racines $\frac{m}{n}$, $\frac{p}{q}$: or on ſçait que la ſomme & le produit de deux racines impoſſibles correſpondantes ſont des quantités réelles. La même choſe doit s'entendre des autres formules.

II.

UNE quantité telle que $a^n - b^n$ peut toujours être diviſée par $a - b$; pour avoir une formule générale qui en repréſente le quotient, on n'a qu'à faire la diviſion, & on trouve $\frac{a^n - b^n}{a - b} = a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + a^{n-4}b^3 + a^{n-5}b^4 +$ &c. le dernier terme du quotient eſt celui où l'expoſant de a eſt égal à 0, ainſi $\frac{a^3 - b^3}{a - b} = aa + ab + bb$: cette

formule fait voir que le quotient de $a^n - b^n$ diviſé par $a - b$ eſt toujours égal à $a + b$ élevé à la puiſſance marquée par $n - 1$ en ôtant les coëfficiens de tous les termes.

III.

QUAND on connoît la ſomme s & le produit r de deux quantités a & b, il eſt facile de trouver une valeur de $a^n + b^n$ qui ne contienne d'autres quantités que s & r: car puiſque $a + b = s$, & $ab = r$, on aura $aa + 2ab + bb = ss$, & $aa + bb = ss - 2r$, pareillement $a^3 + 3aab + 3abb + b^3 = s^3$, mais $3aab + 3abb = 3ab \times \overline{a + b} = 3rs$ par conſéquent $a^3 + b^3 = s^3 - 3rs$; de la même maniére on trouve $a^4 + b^4 = s^4 - 4rss + 2rr$, & ainſi on peut continuer ces valeurs autant qu'on juge à propos. Ces préparations étant ſuppoſées.

ETANT donnée l'équation $L + Mx + Nx^2 + Px^3 = \overline{e + fx + gxx} \times \overline{k + lx}$, ſoit propoſé de réduire la fraction $\frac{1}{L + Mx + Nx^2 + Px^3}$ en ces deux autres $\frac{A + Bx}{e + fx + gxx} + \frac{C}{k + lx}$: on ſuppoſera donc $e + fx + gxx = \overline{m + nx} \times \overline{p + qx} = mp + mqx + npx + nqxx$, ce qui donne $mp = e$, $mq + np = f$, $nq = g$, d'où l'on tire $\frac{m}{n} + \frac{p}{q} = \frac{f}{g}$. Maintenant pour ſe ſervir des formules données ci-deſſus, on

voit qu'on a dans cet exemple $\theta = 0$, & par conſéquent $A = \frac{Q\frac{p^{\theta}-1}{q^{\theta}-1} - Q''\frac{m^{\theta}-1}{n^{\theta}-1}}{\frac{q}{p} - \frac{n}{m} \times QQ''} = \frac{Q\frac{q}{p} - Q''\frac{n}{m}}{\frac{q}{p} - \frac{n}{m} \times QQ''}$;

mais l'exemple donne $Q = k - l\frac{m}{n}$, $Q'' = k - l\frac{p}{q}$, & $Q\frac{q}{p} - Q''\frac{n}{m} = k \times \frac{q}{p} - \frac{n}{m} - \frac{m^2q^2 - n^2p^2}{mp \times nq} l$, or cette quantité étant diviſée par $\frac{q}{p} - \frac{n}{m}$ ou $\frac{mq - np}{mp}$ donnera pour quotient $k - \frac{mq + np}{nq} l = k - l\frac{f}{g}$, & puiſque $QQ'' = kk - kl \times \frac{m}{n} + \frac{p}{q} + \frac{mp}{nq} ll = kk - \frac{fkl}{g} + \frac{ell}{g}$, on déduit $A = \frac{gk - fl}{gkk - fkl + ell}$: par un ſemblable calcul on trouveroit $B = \frac{Q\frac{np^{\theta}-1}{mq^{\theta}-1} - Q''\frac{qm^{\theta}-1}{pn^{\theta}-1}}{\frac{q}{p} - \frac{n}{m} \times QQ''}$

$\frac{-gl}{gkk - fkl + ell}$. Pour trouver la valeur de C il faut ſe ſervir de la formule $C = \frac{k^{\theta}}{l^{\theta}} \times \frac{1}{S}$ du Corol. 2. on a donc ici $\frac{k^{\theta}}{l^{\theta}} = 1$, & $S = e - f\frac{k}{l} + g\frac{kk}{ll}$, ce qui donne $C = \frac{ll}{gkk - fkl + ell}$, par conſéquent on aura

$L + Mx$

$$\frac{1}{L+Mx+Nx^2+Px^3} = \frac{gk-fl-glx}{gkk-fkl+ell \times e+fx+gxx} + \frac{ll}{gkk-fkl+ell \times k+lx}.$$

Si la fraction propoſée étoit celle-ci $\frac{x^3}{a+bx+cxx \times e+fx+gxx}$, pour la réſoudre on la ſuppoſera égale à la ſomme des deux ſuivantes $\frac{A+Bx}{a+bx+cxx} + \frac{C+Dx}{e+fx+gxx}$; & puiſque $\theta = 3$ qui eſt un nombre impair, on aura $A = \frac{Q''\frac{m^{\theta-1}}{n^{\theta-1}} - Q\frac{p^{\theta-1}}{q^{\theta-1}}}{\frac{q}{p} - \frac{n}{m} \times QQ''}$

$= \frac{Q\frac{m^2}{n^2} - Q''\frac{p^2}{q^2}}{\frac{q}{p} - \frac{n}{m} \times QQ''}$, & ſi on ſuppoſe $a+bx+cxx = \overline{m+nx} \times \overline{p+qx} = mp+mqx+npx+nqxx$, on aura $mp = a$, $mq+np = b$, $nq = c$, $\frac{m}{n} + \frac{p}{q} = \frac{b}{c}$, & (par la troiſiéme remarque) $\frac{m^2}{n^2} + \frac{p^2}{q^2} = \frac{bb}{cc} - \frac{2a}{c}$, on aura auſſi $Q = e - f\frac{m}{n} + g\frac{m^2}{n^2}$, $Q'' = e - f\frac{p}{q} + g\frac{pp}{qq}$, d'où l'on déduit $Q''\frac{m^2}{n^2} - Q\frac{p^2}{q^2}$

$= \frac{\frac{m^2}{n^2}e - \frac{m^2p}{n^2q}f + \frac{m^2p^2}{n^2p^2}g}{-\frac{p^2}{q^2}e + \frac{mp^2}{nq^2}f - \frac{m^2p^2}{n^2q^2}g} = \frac{m^2q^2-n^2p^2}{n^2q^2}e - \frac{m^2pq-mnp^2}{n^2q^2}f$,

& si on divise cette derniére quantité par $\frac{q}{p} - \frac{n}{m}$ $= \frac{mq - np}{mp}$, le quotient est $\frac{mp \times mq + np}{n^2 q^2} e - \frac{m^2 p^2}{n^2 q^2} f =$ $\frac{ab}{cc} e - \frac{aa}{cc} f$: en cherchant de la même maniére la valeur de QQ'', on trouve $A = \frac{abe - aaf}{ccee - bcef + bbeg - 2aceg + acff - abfg + aagg} =$ $\frac{abe - aaf}{ec - ag^2 + bg - cf \times be - af}$. Pareillement en substituant ces valeurs dans la formule $B = \frac{Q^{\frac{nqm^0 - 1}{pn^0 - 1}} - Q^{\frac{np^0 - 1}{mq^0 - 1}}}{\frac{q}{p} - \frac{n}{m} \times QQ''}$ on trouve $B = \frac{bbe - ace - abf + aag}{ec - ag^2 + bg - cf \times be - af}$.

Pour trouver les valeurs de C & D, il n'est pas nécessaire de faire un calcul comme celui qu'on vient de faire pour A & B, car en comparant ensemble les formules il est facile de voir que la formule qui donne la valeur de C est semblable à celle de A, & la formule de D à celle de B, & que tout le changement qu'il y a à faire consiste à substituer respectivement, a, b, c, à la place de, e, f, g; par conséquent on aura $C = \frac{aef - bee}{ec - ag^2 + bg - cf \times be - af}$, & $D = \frac{aff - bef - aeg + eee}{ec - ag^2 + bg - cf \times be - af}$; on a donc toutes les valeurs des indéterminées, ce qui donne la réduction requise.

COROLLAIRE III.

65. Si la fraction proposée étoit de cette nature $\frac{x^\theta}{1+x^\lambda}$, ensorte que $L+Mx+Nx^2+Px^3\ldots\ldots+Ux^\lambda = 1+x^\lambda$, on auroit $L=1$, $M=0$, $N=0$, $P=0$, &c. $U=1$, & si on suppose $1+x^\lambda = \overline{1-2ax+xx}\times\overline{1-2bx+xx}\times\overline{1-2cx+xx}\times$ &c. on auroit $\frac{x^\theta}{1+x^\lambda} = \frac{A+Bx}{1-2ax+xx} + \frac{C+Dx}{1-2bx+xx} + \frac{E+Fx}{1-2cx+xx}$ + &c. Dans ce cas on peut abréger les formules de A, B, C, D, &c. de la maniére suivante: Qu'on suppose $1-2ax+xx=0$, & on déduira $x = a+\sqrt{aa-1}$, & $x = a-\sqrt{aa-1}$, soit $a+\sqrt{aa-1} = l$, & $a-\sqrt{aa-1} = m$, & on aura $l+m=2a$, $lm=1$; maintenant par ce qu'on a fait voir dans le Lemme on aura $l^\theta = \overline{A+lB}\times Q$, & $m^\theta = \overline{A+mB}\times Q''$, ce qui donne $A = \frac{l^{\theta-1}}{Q\times\overline{m-l}} - \frac{m^{\theta-1}}{Q''\times\overline{m-l}}$, & $B = \frac{l^\theta}{Q\times\overline{l-m}} - \frac{m^\theta}{Q''\times\overline{l-m}}$: mais puisque $1+x^\lambda = Q\times\overline{1-2ax+xx}$, on aura $\lambda x^{\lambda-1}dx = dQ\times\overline{1-2ax+xx} + Q\times\overline{2xdx-2adx}$, & dans la supposition de $1-2ax+xx=0$ & $x=l$, $\lambda l^{\lambda-1} = Q\times\overline{2l-2a}$; & lorsque $x=m$, $\lambda m^{\lambda-1} = Q''\times\overline{2m-2a}$; or de ce que $l+m=2a$,

on a $2l - 2a = l - m$, & $2m - 2a = m - l$, d'où l'on tire $\lambda l^{\lambda-1} = Q \times \overline{l-m}$, & $\lambda m^{\lambda-1} = Q'' \times \overline{m-l}$: de plus puiſque la ſuppoſition de $1 - 2ax + xx = 0$, donne auſſi $1 + x^\lambda = 0$, on aura $x^\lambda = -1$, où $l^\lambda = -1$ & $m^\lambda = -1$, & par conſéquent $Q \times \overline{l-m} = \lambda l^{\lambda-1} = -\frac{\lambda}{l}$, & $Q'' \times \overline{m-l} = \lambda m^{\lambda-1} = -\frac{\lambda}{m}$; qu'on mette ces valeurs dans les formules de A, & B, & l'on trouvera $A = \frac{l^\theta + m^\theta}{\lambda}$, $B = -\frac{l^{\theta+1} + m^{\theta+1}}{\lambda}$. Par un calcul ſemblable en ſuppoſant que p & q ſont les racines de l'équation $1 - 2bx + xx = 0$ on auroit $C = \frac{p^\theta + q^\theta}{\lambda}$, $D = -\frac{p^{\theta+1} + q^{\theta+1}}{\lambda}$: les valeurs des autres termes E, F, &c. ſont ſemblables.

Si l'expoſant λ eſt un nombre impair, on a $\frac{x^\theta}{1+x^\lambda} = \frac{A + Bx}{1 - 2ax + xx} + \frac{C + Dx}{1 - 2bx + xx}$ &c. $+ \frac{H}{1+x}$; & les valeurs de A, B, C, &c. étant déterminées telles qu'on vient de le voir, on trouvera de la même façon la valeur de H; car ſuivant la méthode donnée dans le Lemme on aura ici $x^\theta = H \times S$, & ſuppoſant $1 + x = 0$ ou $x = -1$, $1 = H \times S$ lorſque θ eſt égal à 0 ou à un nombre pair, & $-1 = H \times S$ lorſque θ eſt un nombre impair; mais puiſque $1 + x^\lambda = S \times \overline{1+x}$, on a $\lambda x^{\lambda-1} dx = dS \times \overline{1+x} + S dx$, ce qui donne $S = \lambda$ lorſque

$1 + x = 0$, d'où l'on déduit $H = \frac{1}{\lambda}$ lorsque θ est un nombre pair, & $H = -\frac{1}{\lambda}$ lorsque θ est un nombre impair.

Si le dénominateur de la fraction proposée étoit $1 - x^\lambda$, on auroit $\frac{x^\theta}{1-x^\lambda} = \frac{A+Bx}{1-2ax+xx} + \frac{C+Dx}{1-2bx+xx}$ &c. $+ \frac{G}{1-x} + \frac{H}{1+x}$, lorsque λ est un nombre pair; & $\frac{x^\theta}{1-x^\lambda} = \frac{A+Bx}{1-2ax+xx} + \frac{C+Dx}{1-2bx+xx}$ &c. $+ \frac{G}{1-x}$, lorsque λ est un nombre impair; & faisant le calcul comme dans le cas précédent on trouve encore $A = \frac{l^\theta + m^\theta}{\lambda}$, $B = -\frac{l^{\theta+1} + m^{\theta+1}}{\lambda}$, $C = \frac{p^\theta + q^\theta}{\lambda}$, $D = -\frac{p^{\theta+1} + q^{\theta+1}}{\lambda}$, &c; aussi $G = \frac{1}{\lambda}$, θ & λ étant des nombres pairs ou impairs; & $H = \frac{1}{\lambda}$ lorsque θ est un nombre pair, & $H = -\frac{1}{\lambda}$ lorsque θ est un nombre impair.

Si on avoit eû $\frac{A+Bx}{1+2ax+xx}$, $\frac{C+Dx}{1+2bx+xx}$, &c. dans ce Corollaire, en supposant encore $x = l$, $x = m$, $x = p$, $x = q$, &c. on auroit trouvé les mêmes valeurs de A, B, C, D, &c.

COROLLAIRE IV.

66. Si la fraction proposée avoit cette forme $\frac{x^\theta}{1-2tx^\lambda+x^{2\lambda}}$, & qu'on suppose $1-2tx^\lambda+x^{2\lambda} = \overline{1-2ax+xx} \times \overline{1-2bx+xx} \times \overline{1-2cx+xx} \times$ &c. on auroit $\frac{x^\theta}{1-2tx^\lambda+x^{2\lambda}} = \frac{A+Bx}{1-2ax+xx} + \frac{C+Dx}{1-2bx+xx} + \frac{E+Fx}{1-2cx+xx} +$ &c. Maintenant on voit qu'on auroit ici comme dans le Corollaire précédent $A = \frac{l^\theta-1}{Q \times \overline{m-l}} - \frac{m^\theta-1}{Q'' \times \overline{m-l}}$, $B = \frac{l^\theta}{Q \times \overline{l-m}} - \frac{m^\theta}{Q'' \times \overline{l-m}}$, mais parce que $1-2tx^\lambda+x^{2\lambda} = Q \times \overline{1-2ax+xx}$, on aura $-2t\lambda x^{\lambda-1}dx + 2\lambda x^{2\lambda-1}dx = dQ \times \overline{1-2ax+xx} + Q \times \overline{2xdx-2adx}$, cette équation, lorsque $1-2ax+xx = 0$ & $x = l$, se change en $\lambda l^{\lambda-1} \times -\overline{2t-2l^\lambda} = Q \times \overline{2l-2a} = Q \times \overline{l-m}$; & lorsque $x = m$, $\lambda m^{\lambda-1} - \overline{2t-2m^\lambda} = Q'' \times \overline{2m-2a} = Q'' \times \overline{m-l}$; mais puisque la supposition de $1-2ax+xx = 0$ donne aussi $1-2tx^\lambda+x^{2\lambda} = 0$, on en tire $2t = x^\lambda + \frac{1}{x^\lambda} = l^\lambda + \frac{1}{l^\lambda} = l^\lambda + m^\lambda$, & $2t = x^\lambda + \frac{1}{x^\lambda} = m^\lambda + \frac{1}{m^\lambda} = m^\lambda + l^\lambda$, parce que $lm = 1$ & par conséquent

$l^\lambda = \frac{1}{m^\lambda}$ & $m^\lambda = \frac{1}{l^\lambda}$: qu'on ſubſtitue cette valeur de $2t$ dans les deux équations ci-deſſus, & l'on trouve $\lambda l^{\lambda-1} \times \overline{l^\lambda - m^\lambda} = Q \times \overline{l - m}$, & $\lambda m^{\lambda-1} \times \overline{m^\lambda - l^\lambda} = Q'' \times \overline{m - l}$, ce qui donne $A = \frac{1}{\lambda m^{\lambda-\theta} \times \overline{l^\lambda - m^\lambda}} - \frac{1}{\lambda l^{\lambda-\theta} \times \overline{l^\lambda - m^\lambda}} = \frac{l^{\lambda-\theta} - m^{\lambda-\theta}}{\lambda \times \overline{l^\lambda - m^\lambda}}$, & $B = -\frac{l^{\lambda-\theta-1} - m^{\lambda-\theta-1}}{\lambda \times \overline{l^\lambda - m^\lambda}}$. On voit que le calcul pour C, D, E, &c. eſt tout-à-fait ſemblable, & par conſéquent on aura $C = \frac{p^{\lambda-\theta} - q^{\lambda-\theta}}{\lambda \times \overline{p^\lambda - q^\lambda}}$, $D = -\frac{p^{\lambda-\theta-1} - m^{\lambda-\theta-1}}{\lambda \times \overline{p^\lambda - q^\lambda}}$; &c.

On trouveroit encore les mêmes valeurs pour A, B, C, &c, ſi au lieu de $\frac{x^\theta}{1 - 2tx^\lambda + x^{2\lambda}}$ la fraction étoit $\frac{x^\theta}{1 + 2tx^\lambda + x^{2\lambda}}$.

Les régles qu'on a données juſqu'ici pour la réduction des fractions compoſées ſuppoſent que le dénominateur de la fraction propoſée eſt compoſé du produit de quantités inégales, mais dans les cas où il s'en trouve d'égales, il faut ſe ſervir de la méthode ſuivante.

LEMME III.

67. *REDUIRE la fraction* $\frac{x^{\theta}}{e+fx^{\delta} \times g+hx^{\lambda} \times k+lx^{\mu} \times \&c.}$ *en pluſieurs fractions ſimples, l'expoſant* θ *étant ſuppoſé moindre que la ſomme des quantités* $\delta+\lambda+\mu+$ *&c.*

On ſuppoſera la propoſée égale à cette ſomme $\frac{A+Bx+Cx^2....+Fx^{\delta-1}}{e+fx^{\delta}} + \frac{G+Hx+Ix^2.....+Mx^{\lambda-1}}{g+hx^{\lambda}} +$ $\frac{N+Px+Qx^2.....+Tx^{\mu-1}}{k+lx^{\mu}}$ + &c; ce qui donnera $x^{\theta} =$ $A+Bx+Cx^2..... +Fx^{\delta-1} \times g+hx^{\lambda} \times k+lx^{\mu}$ &c. $+G+Hx+Ix^2.....+Mx^{\lambda-1} \times e+fx^{\delta} \times k+lx^{\mu}$ &c. $+N+Px+Qx^2..... +Tx^{\mu-1} \times e+fx^{\delta} \times g+hx^{\lambda}$ &c ; Pour trouver les valeurs des indéterterminées A, B, C, &c. on voit que la nature de cette derniére équation demande qu'on égale à zéro la ſomme de tous les termes qui ſont multipliés par la grandeur x élevée à une autre puiſſance que θ, & qu'on égale à x^{θ} la ſomme des autres termes qui ſont multipliés par x^{θ} ; par cette méthode on aura autant d'équations qu'il y a de quantités indéterminées A, B, C, &c. & par le moyen de ces équations on trouvera les valeurs cherchées, ce qui donnera la ſolution du Problême.

Par exemple ſoit propoſée la fraction $\frac{xx}{e+fx^2 \times g+hx^2}$ à réſoudre;

à réſoudre ; en ſuppoſant $\frac{xx}{(e+fx)^2 \times (g+hx)^2} = \frac{A+Bx}{(e+fx)^2} + \frac{C+Dx}{(g+hx)^2}$, on aura

$$\begin{aligned} xx = {} & Agg + 2Aghx + Ahhxx \\ & + Bggx + 2Bghxx + Bhhx^3 \\ & Cee + 2Cefx + Cffxx \\ & + Deex + 2Defxx + Dffx^3. \end{aligned}$$

maintenant il faut ſuppoſer ſelon ce qu'on vient de dire,

$$\begin{aligned} Agg + Cee &= 0. \\ 2Aghx + Bggx + 2Cefx + Deex &= 0. \\ Ahhxx + 2Bghxx + Cfxx + 2Defxx &= xx. \\ Bhhx^3 + Dffx^3 &= 0. \end{aligned}$$

& par la réſolution de ces quatre équations on trouvera les valeurs de A, B, C, D.

Il faut ſe ſervir de la même méthode pour réſoudre les fractions de cette ſorte $\frac{x^4}{(e+fx+gxx)^\delta \times (h+kx+lxx)^\lambda \times \&c.}$

COROLLAIRE.

68. IL y a de certains cas où on peut abréger la méthode donnée dans ce Lemme, par exemple lorſque la fraction donnée a cette forme $\frac{x^4}{(e+fx)^2 \times (g+hx)^\lambda}$; car en ſuppoſant $\frac{x^4}{(e+fx)^2 \times (g+hx)^\lambda} = \frac{A}{(e+fx)^2} +$

$\frac{B + Cx + Dx^2 \ldots\ldots + Gx^{\lambda-1}}{\overline{g+hx}^{\lambda}}$, on aura $x^{\theta} = A \times \overline{g+hx}^{\lambda} + \overline{B + Cx + Dx^2 \ldots\ldots + Gx^{\lambda-1}} \times \overline{e+fx}$; mais la ſuppoſition de $e + fx = o$, donne $x = -\frac{e}{f}$ & $\pm\frac{e^{\theta}}{f^{\theta}} = A \times \overline{g - \frac{eh}{f}}^{\lambda}$, & $A = \frac{\pm\frac{e^{\theta}}{f^{\theta}} \times f^{\lambda}}{\overline{fg-eh}^{\lambda}}$, en prenant le ſigne + lorſque θ eſt égal à o ou à un nombre pair, & le ſigne — lorſque θ eſt un nombre impair : La valeur de A étant ainſi trouvée, on aura facilement les valeurs de B, C, D, &c. par la méthode du dernier Lemme ; car comme nous y avons vû, on aura $Ag^{\lambda} + Be = o$, lorſque θ eſt un nombre entier poſitif, donc $B = -\frac{g^{\lambda}}{e} A = \mp\frac{g^{\lambda} e^{\theta-1} f^{\lambda-\theta}}{\overline{fg-he}^{\lambda}}$; de même puiſque $\lambda g^{\lambda-1} bx$ eſt le ſecond terme de la quantité $g + hx$ élevée à la puiſſance λ, on aura $\lambda g^{\lambda-1} bA + Bf + Ce = o$, lorſque θ eſt plus grand que l'unité, ou $\lambda g^{\lambda-1} bA + Bf + Ce = 1$, lorſque $\theta = 1$, on trouvera donc l'indéterminée C, & ainſi de ſuite les autres.

La fraction $\frac{a + bx + cx^2 + \&c.}{\overline{e+fx} \times \overline{g+hx}^{\lambda}}$ ſe réſoudra par la même méthode, en la ſuppoſant égale à $\frac{A}{e+fx} + \frac{B + Cx + Dx^2 + \ldots\ldots + Gx^{\lambda-1}}{\overline{g+hx}^{\lambda}}$, ainſi on trouve A =

$\frac{af^{\lambda} - bef^{\lambda-1} + cef^{\lambda-2} - \&c.}{\overline{fg-eh}^{\lambda}}$; enſuite on aura $Ag^{\lambda} + Be = a$, d'où l'on déterminera B, & enſuite C, D, &c.

Cette méthode peut auſſi s'appliquer à la fraction $\frac{x^{\theta}}{\overline{e+fx+gxx} \times \overline{b+kx+lxx}^{\lambda}}$ en la ſuppoſant égale à $\frac{A+Bx}{e+fx+gxx} + \frac{C+Dx+Ex^2 \ldots Hx^{\lambda-1}}{\overline{b+kx+lxx}^{\lambda}}$: il eſt facile après tout ce que nous avons dit d'appliquer le calcul à cet exemple, ſans qu'il ſoit néceſſaire de le mettre ici.

LEMME IV.

69. TROUVER une expreſſion générale des ſinus & co-ſinus des arcs de cercle multiples d'un arc donné.

Du centre O & du rayon OA = 1 qu'on décrive une demi-circonférence de cercle ABQ, (*fig.* 35.) d'un point B ſoit menée ſur le diamétre la perpendiculaire BD, & *mq* infiniment proche de BD, & ſur *mq* la perpendiculaire B*p*, & ſi on tire le rayon BO, & qu'on nomme *c* le co-ſinus OD qu'on regarde comme variable, les triangles ſemblables ODB, B*pm* donneront $BD(\sqrt{1-cc}) . BO(1) :: Bp(-dc) . Bm = \frac{-dc}{\sqrt{1-cc}}$ différence de l'arc AB : maintenant qu'on prenne l'arc AL qui ſoit à AB

comme λ à 1, & en nommant ſon co-ſinus t ſa différence ſera $\frac{-dt}{\sqrt{1-tt}}$; donc puiſque ces arcs ſont en raiſon donnée, leurs différences ſeront en même raiſon, ce qui donne $\frac{-dc}{\sqrt{1-cc}} \cdot \frac{-dt}{\sqrt{1-tt}} :: 1 \cdot \lambda$; qu'on ſuppoſe ſelon ce qui a été remarqué dans l'art. 36, $z = c + \sqrt{cc-1}$, ou $c = \frac{1+xx}{2x}$, & on aura $-dc = \frac{1-xx \times dz}{2xx}$, $\sqrt{1-cc} = \frac{\sqrt{-1+2xx-x^4}}{2x}$ $= \frac{1-xx\sqrt{-1}}{2x}$, ce qui donne $\frac{-dc}{\sqrt{1-cc}} = \frac{dx}{x\sqrt{-1}}$; pareillement en ſuppoſant $t = \frac{1+yy}{2y}$, on aura $\frac{-dt}{\sqrt{1-tt}} = \frac{dy}{y\sqrt{-1}}$ & par conſéquent $\frac{dx}{x\sqrt{-1}} \cdot \frac{dy}{y\sqrt{-1}} :: 1 \cdot \lambda$, donc $\frac{\lambda dx}{x} = \frac{dy}{y}$: or puiſque les arcs AB, AL s'évanouiſſent lorſque $c = 1$, & par conſéquent lorſque $x = 1$ & $y = 1$, en prenant l'intégrale de l'équation $\frac{\lambda dx}{x} = \frac{dy}{y}$, on aura (par l'art. 17.) log. x^λ = log. y, & par conſéquent $x^\lambda = y$: delà on tire $t = \frac{1+x^{2\lambda}}{2x^\lambda}$, mais parce que $z = c + \sqrt{cc-1}$, & $z = c - \sqrt{cc-1}$, on aura $t = \frac{\overline{c+\sqrt{cc-1}}^\lambda}{2} + \frac{\overline{\frac{1}{c+\sqrt{cc-1}}}^\lambda}{2} = \frac{\overline{c+\sqrt{cc-1}}^\lambda + \overline{c-\sqrt{cc-1}}^\lambda}{2}$ à cauſe que $\overline{c+\sqrt{cc-1}}$

$\times c - \sqrt{cc-1} = 1$ & ainſi $c - \sqrt{cc-1} = \frac{1}{c+\sqrt{cc-1}}$;

qu'on ſuppoſe $\sqrt{cc-1} = u$, & on aura $\overline{c+\sqrt{cc=1}}^{\lambda}$

$= c^{\lambda} + \lambda c^{\lambda-1}u + \lambda \times \frac{\lambda-1}{2} \times c^{\lambda-2}u^2 + \lambda \times \frac{\lambda-1}{2}$

$\times \frac{\lambda-2}{3} \times c^{\lambda-3}u^3 + \lambda \times \frac{\lambda-1}{2} \times \frac{\lambda-2}{3} \times \frac{\lambda-3}{4} \times$

$c^{\lambda-4}u^4 +$ &c. $\overline{c-\sqrt{cc-1}}^{\lambda} = c^{\lambda} - \lambda c^{\lambda-1}u + \lambda \times$

$\frac{\lambda-1}{2} \times c^{\lambda-2}u^2 + \lambda \times \frac{\lambda-1}{2} \times \frac{\lambda-2}{3} \times c^{\lambda-3}u^3 +$

$\lambda \times \frac{\lambda-1}{2} \times \frac{\lambda-2}{3} \times \frac{\lambda-3}{4} \times c^{\lambda-4}u^4 -$ &c. d'où l'on

tire $t = c^{\lambda} + \lambda \times \frac{\lambda-1}{2} \times c^{\lambda-2}u^2 + \lambda \times \frac{\lambda-1}{2} \times \frac{\lambda-2}{3}$

$\times \frac{\lambda-3}{4} \times c^{\lambda-4}u^4 +$ &c.

Si on nomme s le ſinus de l'arc AL, on aura

$$s = \sqrt{1-tt} = \frac{\overline{c+\sqrt{cc-1}}^{\lambda} - \overline{c-\sqrt{cc-1}}^{\lambda}}{2}\sqrt{-1};$$

cette valeur étant réduite en ſerie & mettant u pour $\sqrt{cc-1}$, & $\sqrt{1-cc}$ pour $\sqrt{cc-1} \times \sqrt{-1}$, on trouve $s =$

$\sqrt{1-cc} \times + \lambda c^{\lambda-1} + \lambda \times \frac{\lambda-1}{2} \times \frac{\lambda-2}{3} \times c^{\lambda-3}u^2 +$

$\lambda \times \frac{\lambda-1}{2} \times \frac{\lambda-2}{3} \times \frac{\lambda-3}{4} \times \frac{\lambda-4}{5} \times c^{\lambda-5}u^4 +$ &c.

C. Q. F. T.

COROLLAIRE I.

70. SI au contraire on avoit nommé c & t les ſinus des arcs AB, AL, & s le co-ſinus du dernier, il eſt facile de voir qu'on auroit trouvé les mêmes valeurs de t & s, car dans ce cas on auroit $BD(c) . BO(1) :: Bp \left\{ \frac{-cdc}{\sqrt{1-cc}} \right\} . Bm = \frac{-dc}{\sqrt{1-cc}}$ comme dans le Lemme, & de même la différence de l'arc AL ſeroit $\frac{-dt}{\sqrt{1-tt}}$; d'où il eſt clair que le reſte du calcul ſeroit le même que dans le Lemme, & par conſéquent le ſinus d'un arc étant donné on trouvera par les formules ci-deſſus les ſinus & co-ſinus des arcs multiples.

REMARQUE.

71. ON peut ſe ſervir des mêmes formules pour trouver les ſinus & co-ſinus, ou plûtôt les ordonnées & les abſciſſes qui répondent aux ſecteurs hyperboliques : car qu'on décrive du centre O (*fig.* 36.) & du demi-axe OA une hyperbole équilatére AB, & qu'on prenne un ſecteur quelconque OAB & un autre ſecteur OAL qui ſoit à OAB comme λ à 1, & ayant tiré ſur l'axe les perpendiculaires BD, LN, ſi on nomme OA, 1; OD, c; ON, t; LN, s; la différence du ſecteur OAB (par l'art. 27.) ſera $\frac{dc}{2\sqrt{cc-1}}$, & la différence du ſecteur OAL ſera

$\frac{dt}{2\sqrt{tt-1}}$, & si on suppose $c = \frac{1+xx}{2x}$, $t = \frac{1+yy}{2y}$, on déduira $\frac{dc}{2\sqrt{cc-1}} = \frac{dx}{2x}$, & $\frac{dt}{2\sqrt{tt-1}} = \frac{dy}{2y}$, ce qui donne $\frac{dx}{2x} \cdot \frac{dy}{2y} :: 1 . \lambda$, & $\frac{\lambda dx}{x} = \frac{dy}{y}$, donc $x^\lambda = y$: on voit de-là que tout le reste du calcul seroit ici le même que dans le Lemme, excepté que dans la valeur de s, il faut substituer $\sqrt{cc-1}$ au lieu de $\sqrt{1-cc}$, parce qu'ici on a $s = \sqrt{tt-1}$.

On doit encore observer que ce qu'on n'a trouvé que par induction dans l'art. 41, est résolu dans ce dernier Lemme d'une maniére générale, mais peut-être moins propre au cercle, puisque dans cette derniére solution on a été obligé d'introduire l'hyperbole afin d'avoir l'intégrale de l'équation $\frac{\lambda dx}{x} = \frac{dy}{y}$; néanmoins ceci fait encore voir le merveilleux rapport qui est entre le cercle & l'hyperbole, & la similitude des calculs qu'il faut faire pour découvrir leurs propriétés.

COROLLAIRE II.

72. Nous avions dans le Lemme $c = \frac{1+xx}{xx}$, ou $1 - 2cx + xx = 0$, & $t = \frac{1+x^{2\lambda}}{2x^\lambda}$ ou $1 - 2tx^\lambda + x^{2\lambda} = 0$; & puisque $x = c + \sqrt{cc-1}$, & $x = c -$

$\sqrt{cc-1}$, si on suppose $c+\sqrt{cc-1}=l$, $c-\sqrt{cc-1}$ $=m$, on aura $\frac{l+m}{2}=c$, & $lm=1$, & $t=$ $\frac{\sqrt{c+\sqrt{cc-1}}^{\lambda}+\sqrt{c-\sqrt{cc-1}}^{\lambda}}{2}=\frac{l^{\lambda}+m^{\lambda}}{2}$, $s=$ $\frac{\sqrt{c+\sqrt{cc-1}}^{\lambda}-\sqrt{c-\sqrt{cc-1}}^{\lambda}}{2}\sqrt{-1}=\frac{l^{\lambda}-m^{\lambda}}{2}\sqrt{-1}$;

d'où il est clair que si $\frac{l+m}{2}$ marque le co-sinus d'un arc quelconque AB, $\frac{l^{\lambda}+m^{\lambda}}{2}$ marquera le co-sinus d'un arc AL qui est à AB comme λ à 1, & $\frac{l^{\lambda}-m^{\lambda}}{2}\sqrt{-1}$ en marquera le sinus. Outre cela nous avons démontré (art. 48.) qu'une quantité telle que $1\mp 2tx^{\lambda}+x^{2\lambda}$ est composée du produit des quantités $1-2ax+xx$, $1-2bx+xx$, $1-2cx+xx$, &c; nous avons aussi enseigné dans l'art. 66. la maniére de réduire la fraction $\frac{x^{\theta}}{1\mp 2tx^{\lambda}+x^{2\lambda}}$ à toutes ses fractions composantes $\frac{A+Bx}{1-2ax+xx}+\frac{C+Dx}{1-2bx+xx}+$ $\frac{E+Fx}{1-2cx+xx}+$ &c, mais les valeurs que nous y avons trouvé de A, B, C, D, &c. s'éclairciſſent parfaitement par ce Corollaire; car on voit que la valeur de A qui est $\frac{l^{\lambda-\theta}-m^{\lambda-\theta}}{\lambda\times l^{\lambda}-m^{\lambda}}$ ou $\frac{l^{\lambda-\theta}-m^{\lambda-\theta}\sqrt{-1}}{\lambda\times l^{\lambda}-m^{\lambda}\sqrt{-1}}$ est

eſt égale au ſinus d'un arc, qui eſt à celui dont a ou $\frac{l+m}{2}$ eſt le co-ſinus comme $\lambda - \theta$ à 1, diviſé par le ſinus d'un arc qui eſt à celui dont a eſt le co-ſinus comme λ à 1, le tout diviſé par λ; de ſorte que ſi l'on prend un arc AB (*fig.* 35.) dont le co-ſinus OD eſt égal à a, & enſuite un arc AC qui ſoit à AB comme $\lambda - \theta$ à 1, & un arc AL qui ſoit au même arc AB comme λ à 1, & qu'on tire les ſinus de ces arcs CG, LN, on aura $A = \frac{l^{\lambda-\theta} - m^{\lambda-\theta}}{\lambda \times \overline{l^{\lambda} - m^{\lambda}}} = \frac{CG}{\lambda \times LN}$: pareillement ſi on prend l'arc AE qui ſoit à AB comme $\lambda - \theta - 1$ à 1, & qu'on tire le ſinus EF, on aura $B = -\frac{l^{\lambda-\theta-1} - m^{\lambda-\theta-1}}{\lambda \times \overline{l^{\lambda} - m^{\lambda}}} = -\frac{EF}{\lambda \times LN}$: on fera la même choſe pour les autres indéterminées C, D, E, F, &c. c'eſt-à-dire, qu'il n'y a qu'à prendre des arcs dont les co-ſinus ſont égaux à b, c, &c. & prendre d'autres qui ſoient en même raiſon à ces arcs, que les arcs AC, AE, ſont à AB, & tirant les ſinus on aura les valeurs de, C, D, E, F, &c. qui, comme on voit, ſeront tout-à-fait ſemblables à celles de A & B.

COROLLAIRE III.

73. EN reprenant les deux équations qu'on avoit au commencement du Corol. précédent, $1 - 2cx + xx = 0$, $1 - 2tx^{\lambda} + x^{2\lambda} = 0$, & ſuppoſant $t = \pm 1$, c'eſt-à-dire,

ſuppoſant que l'arc AL devient égal à la demi-circonférence ou à la circonférence entiére, on aura $1 + 2x^{\lambda} + x^{2\lambda} = 0$, & $1 - x^{\lambda} = 0$, ou $1 + x^{\lambda} = 0$; & puiſque $\frac{x^{l}}{1 + x^{\lambda}} = \frac{A + Bx}{1 - 2ax + xx} + \frac{C + Dx}{1 - 2bx + xx} + \frac{E + Fx}{1 - 2cx + xx}$ + &c. où l'on a (par l'art. 65.) $A = \frac{l^{l} + m^{l}}{\lambda}$, $B = -\frac{l^{l+1} + m^{l+1}}{\lambda}$; or $l^{l} + m^{l}$, par ce qui eſt démontré dans le Corollaire précédent, eſt égal au double du co-ſinus d'un arc qui eſt à l'arc, dont a ou $\frac{l + m}{2}$ eſt le co-ſinus, comme θ à 1, & de même $l^{l+1} + m^{l+1}$ eſt le double du co-ſinus d'un arc qui eſt à l'arc, dont a eſt le co-ſinus, comme $\theta + 1$ à 1; ainſi ſuppoſant que l'arc AE eſt à AB comme θ à 1, & l'arc AC à AB comme $\theta + 1$ à 1, & tirant EK & CH paralléles à AO, & qui rencontrent la circonférence aux points K, H, ces lignes ſeront les doubles des co-ſinus des arcs AE, AC, & par conſéquent on aura $A = \frac{EK}{\lambda}$, $B = -\frac{CH}{\lambda}$. On trouvera par la même méthode les valeurs de C, D, en prenant un arc dont le co-ſinus eſt b, & les valeurs de E, F, en prenant un arc dont le co-ſinus eſt c, & enſuite d'autres arcs qui ſoient à ceux-ci dans la raiſon de θ à 1, & de $\theta + 1$ à 1, & leurs co-ſinus donneront les valeurs cherchées qui ſeront, comme il eſt évident, tout-à-fait ſemblables à celles

de A & B : on fera la même choſe pour tous les autres termes.

Ces choſes ſuppoſées il ſera très-facile de trouver les intégrales des différentielles binomes, comme on verra dans le Problême ſuivant.

PROBLÊME II.

74. *TROUVER l'intégrale de la différentielle* $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n}$, $\frac{\delta}{\lambda}$ *étant une fraction poſitive moindre que l'unité.*

En ſuppoſant $\sqrt[\lambda]{\frac{fz^n}{e}} = x$, on a vû (art. 55.) que la propoſée ſe change en cette autre $\frac{D\sqrt[\lambda]{\frac{f^{\lambda-\delta}}{e^{\lambda-\delta}}}}{nf} \times \frac{\lambda x^{\delta-1}dx}{1+x^\lambda}$ lorſque f eſt une quantité poſitive, & en celle-ci $\frac{D\sqrt[\lambda]{\frac{f^{\lambda-\delta}}{e^{\lambda-\delta}}}}{nf} \times \frac{\lambda x^{\delta-1}dx}{1-x^\lambda}$ (par l'art. 56.) lorſque f eſt négative : encore par ce qu'on a fait voir dans les articles précédens & l'art 49., on a $\frac{D\sqrt[\lambda]{\frac{f^{\lambda-\delta}}{e^{\lambda-\delta}}}}{nf} \times \frac{\lambda x^{\delta-1}dx}{1\pm x^\lambda} = \frac{D\sqrt[\lambda]{\frac{f^{\lambda-\delta}}{e^{\lambda-\delta}}}}{nf} \times + \frac{\lambda A dx + \lambda B x dx}{1-2ax+xx} + \frac{\lambda C dx + \lambda D x dx}{1-2bx+xx} +$ &c. & ſi on ſuppoſe que l & m ſont les racines de l'équation $1-2ax+xx=0$, on aura (par l'art. 65.) $A = \frac{l^{\delta-1}+m^{\delta-1}}{\lambda}$, $B =$

$\frac{l^2+m^2}{\lambda}$, & ayant diviſé la circonférence du cercle & fait le reſte de la conſtruction comme dans l'art. 55, l'intégrale de $\frac{dx}{1-2ax+xx}$ (par l'art. 52.) eſt égale à $\frac{1}{\sqrt{1-aa}}$ (PBO) *fig.* 23. ou (par l'art. 72.) $\frac{2}{l-m\sqrt{-1}}$ (PBO), & par la même raiſon on aura $\int\frac{xdx}{1-2ax+xx}=1\left\{\frac{BP}{BO}\right\}+\frac{l+m}{l-m\sqrt{-1}}$ (PBO); d'où l'on déduit $\int\frac{\lambda A dx+\lambda Bxdx}{1-2ax+xx}=-\sqrt{l^2+m^2}\left\{\frac{BP}{BO}\right\}+\frac{l^{s-1}+m^{s-1}-l^{s+1}-m^{s+1}}{l-m\sqrt{-1}}$ (PBO); mais $\frac{l^{s-1}+m^{s-1}-l^{s+1}-m^{s+1}}{l-m\sqrt{-1}}=\sqrt{l^2-m^2}\sqrt{-1}$, par conſéquent $\int\frac{\lambda A dx+\lambda Bxdx}{1-2ax+xx}=-\sqrt{l^2+m^2}\left\{\frac{PB}{BO}\right\}+\sqrt{l^2-m^2}\sqrt{-1}$ (PBO). Cette maniére d'exprimer l'intégrale eſt très-claire, puiſque par les art. 72, 73, l^2+m^2 dénote le double du co-ſinus d'un arc qui eſt à l'arc AB, dont on ſuppoſe que a ou $\frac{l+m}{2}$ eſt le co-ſinus, comme s à 1; & $\sqrt{l^2-m^2}\sqrt{-1}$ en marque le double du ſinus.

Pareillement ſi p & q ſont les racines de l'équation $1-2bx+xx=0$, b étant le co-ſinus

de l'arc AD, on aura $\frac{p+q}{2} = b$, $pq = 1$, & $\int \frac{\lambda C dx + \lambda D x dx}{1 - 2bx + xx} = -\overline{p^{\lambda} + q^{\lambda}} \left\{\frac{DP}{DO}\right\} + \overline{p^{\lambda} - q^{\lambda}}\sqrt{-1}$ (PDO), ou $p^{\lambda} + q^{\lambda}$ marque le double du co-ſinus, & $\overline{p^{\lambda} - q^{\lambda}}\sqrt{-1}$ le double du ſinus d'un arc qui eſt à l'arc AD comme λ à 1. Les intégrales des autres termes s'il y en avoit ſeroient ſemblables.

On auroit encore les mêmes expreſſions des intégrales, ſi quelques-uns des co-ſinus, a, b, c, &c. étoient négatifs, c'eſt-à-dire, ſi les arcs dont ils ſont les co-ſinus, étoient plus grands qu'un quart de cercle.

Il faut obſerver de joindre ici les diviſeurs ſimples $1 + x$, $1 - x$, toutes les fois que les dénominateurs $1 + x^{\lambda}$, $1 - x^{\lambda}$, contiennent ces diviſeurs. *C. Q. F. D.*

Pour faire voir davantage la ſimplicité de cette méthode nous allons l'appliquer à quelques exemples, nous y ſuppoſerons toujours que la demi-circonférence de cercle eſt diviſée en autant de parties égales que λ contient d'unités, & le reſte de la conſtruction expoſée dans l'Avertiſſement qui ſuit l'art. 57.

PREMIER EXEMPLE.

SOIT donnée la différentielle $\frac{Dz^{\frac{1}{\lambda}n-1}\,dz}{e + fz^{n}}$ dont on demande l'intégrale : on aura $\lambda = 1$, & $\lambda = 2$, &

la proposée se changera en cette autre $\frac{D}{nf}\sqrt[n]{\frac{f}{e}} \times \frac{2Adx + 2Bxdx}{1 - 2ax + xx}$, dont l'intégrale selon le Problême est $\frac{D}{nf}\sqrt[n]{\frac{f}{e}} \times -\overline{l + m}\left\{\frac{BP}{BO}\right\} + \overline{l - m}\sqrt{-1}$ (PBO) (*fig.* 28.) mais puisque l'arc AB est un quart de cercle, son co-sinus est nul, par conséquent on aura $l + m = 0$, & $\overline{l - m}\sqrt{-1} = \downarrow$, l'intégrale demandée est donc $\frac{D}{nf}\sqrt[n]{\frac{f}{e}} \times \downarrow$ (PBO).

SECOND EXEMPLE.

SOIT demandée l'intégrale de $\frac{Dz^{\frac{3}{7}n-1}dz}{e + fz^n}$: dans cet exemple on a $\delta = 3$, $\lambda = 7$, & la proposée sera égale à $\frac{D}{nf}\sqrt[7]{\frac{f^4}{e^4}} \times + \frac{7Adx + 7Bxdx}{1 - 2ax + xx} + \frac{7Cdx + 7Dxdx}{1 - 2bx + xx} + \frac{7Edx + 7Fxdx}{1 + 2cx + xx} + \frac{7Gdx}{1 + x}$, a, b, c, étant les co-sinus des arcs AB, AD, AF, (*fig.* 33.) (par l'art. 49.) : or par ce dernier Problême on a $\int \frac{7Adx + 7Bxdx}{1 - 2ax + xx} = -\overline{l^3 + m^3}\left(\frac{BP}{BO}\right) + \overline{l^3 - m^3}\sqrt{-1}$ (PBO) ; mais $l^3 + m^3$ & $\overline{l^3 - m^3}\sqrt{-1}$ étant les doubles du co-sinus & sinus d'un arc triple de AB, c'est-à-dire de l'arc AD, on a $l^3 + m^3 = \delta$, & $\overline{l^3 - m^3}\sqrt{-1} = \varphi$, donc $\int \frac{7Adx + 7Bxdx}{1 - 2ax + xx} = -\delta\left(\frac{BP}{BO}\right) + \varphi$ (PBO). pareille-

ment on aura $\int \frac{\gamma C dx + \gamma D x dx}{1 - 2bx + xx} = -\overline{p^3 + q^3}\left\{\frac{DP}{DO}\right\} + \overline{p^3 - q^3}\sqrt{-1}\,(PDO) = +\gamma\left\{\frac{DP}{DO}\right\} + \chi(PDO)$, puisque l'arc triple de AD a $-\gamma$ pour le double de son co-sinus, & $-\chi$ (par l'art. 42.) pour le double de son sinus : de même $\int \frac{\gamma E dx + \gamma F x dx}{1 + 2cx + xx} = -\beta\left\{\frac{PF}{FO}\right\} + \psi$ (PFO) : enfin la différentielle $\frac{\gamma G dx}{1+x}$ (par l'art. 65.) est égale à $\frac{dx}{1+x}$ dont l'intégrale (par l'art. 51.) est $1\left\{\frac{HP}{HO}\right\}$ donc l'intégrale totale de $\frac{Dz^{\frac{3}{\gamma}n-1}dz}{e+fz^n}$ est $\frac{D\gamma\sqrt{f^4}}{nf\sqrt{e^4}}x - \alpha\left\{\frac{BP}{BO}\right\} + \gamma\left\{\frac{DP}{DO}\right\} - \beta\left\{\frac{FP}{FO}\right\} + 1\left\{\frac{HP}{HO}\right\} + \varphi(PBO) - \chi(PDO) + \psi(PFO)$.

Et si la proposée étoit $\frac{Dz^{\frac{3}{\gamma}n-1}dz}{e-fz^n}$, on trouveroit son intégrale de la même maniére, car dans ce cas on aura $\frac{Dz^{\frac{3}{\gamma}n-1}dz}{e-fz^n} = \frac{D\gamma\sqrt{f^4}}{nf\sqrt{e^4}} \times + \frac{\gamma A dx}{1-x} + \frac{\gamma B dx + \gamma C x dx}{1-2ax+xx} + \frac{\gamma D dx + \gamma E x dx}{1+2bx+xx} + \frac{\gamma F dx + \gamma G x dx}{1+2cx+xx}$ (par l'art. 49.), a, b, c, étant les co-sinus des arcs AC, AE, AG, & puisque par les art. 65. & 51, $\int \frac{A\gamma dx}{1-x} = -1\left\{\frac{AP}{AO}\right\}$, & puisque le double du co-sinus de l'arc triple de AC est $-\beta$, & ψ le double du sinus,

on aura $\int \frac{7Bdx + 7Cxdx}{1 - 2ax + xx} = -\overline{l^7 + m^7}\left\{\frac{CP}{CQ}\right\} + \overline{l^7 - m^7}\sqrt{-1}\,(PCO) = \beta\left\{\frac{CP}{CQ}\right\} + \psi(PCO)$. Pareillement on trouve que γ eſt le co-ſinus d'un arc triple de AE, & $-\chi$ le double du ſinus, donc $\int \frac{7Ddx + 7Exdx}{1 + 2ax + xx} = -\gamma\left\{\frac{EP}{EO}\right\} - \chi(PEO)$; & ainſi en cherchant le double du ſinus & co-ſinus de l'arc triple de l'arc AG, on aura l'intégrale de $\frac{7Fdx + 7Gxdx}{1 + 2cx + xx}$, & la ſomme de toutes ces intégrales multipliées par $\frac{D}{nf}\sqrt[7]{\frac{f^4}{e^4}}$ donnera l'intégrale demandée.

TROISIEME EXEMPLE.

SOIT enfin propoſée la différentielle $\frac{Dz^{\frac{7}{8}n-1}dz}{e + fz^n}$ dont il faut trouver l'intégrale. Puiſque l'on a ici $\lambda = 7$, & $\lambda = 8$, on aura $\frac{Dz^{\frac{7}{8}n-1}dz}{e + fz^n} = \frac{D}{nf}\sqrt[8]{\frac{f}{e}} \times + \frac{8Adx + 8Bxdx}{1 - 2ax + xx} + \frac{8Cdx + 8Dxdx}{1 - 2bx + xx} + \frac{8Edx + 8Fxdx}{1 + 2cx + xx} + \frac{8Gdx + 8Hxdx}{1 + 2bx + xx}$ (par les art. 49. & 65.), a, b, c, b, étant ſuppoſées égales aux co-ſinus des arcs AB, AD, AF, AH: mais l'intégrale de $\frac{8Adx + 8Bxdx}{1 - 2ax + xx}$ eſt $-\overline{l^7 + m^7}\left\{\frac{BP}{BQ}\right\} + \overline{l^7 - m^7}\sqrt{-1}\,(PBO) = \beta$

(BP)

$\left\{\frac{BP}{BO}\right\} + \downarrow (PBO)$, puiſque $-\beta$ eſt le double du co-ſinus de l'arc AH c'eſt-à-dire de l'arc ſept fois plus grand que l'arc AB, & $\downarrow$ en eſt le double du ſinus. On trouve auſſi que $-\delta$ eſt le double du co-ſinus de l'arc ſept fois plus grand que AD, & φ le double du ſinus, donc $\int \frac{8Cdx + 8Dxdx}{1 - 2bx + xx} = \delta \left\{\frac{DP}{DO}\right\} + \varphi (PDO)$: pareillement en comptant un arc ſept fois plus grand que AF, on trouve que le double de ſon co-ſinus & ſinus eſt δ & φ, ce qui donne $\int \frac{8Edx + 8Fxdx}{1 + 2cx + xx} = -\delta \left\{\frac{FP}{FO}\right\} + \varphi (PFO)$; & faiſant la même choſe pour l'arc AH, on aura l'intégrale totale.

Si la propoſée avoit cette forme $\frac{Dz^{\frac{7}{8}n-1}dz}{e - fz^n}$, elle ſe changeroit (par l'art. 49.) en celle-ci $\frac{D}{nf}\sqrt[8]{\frac{f}{e}} \times$ $+ \frac{8Adx}{1-x} + \frac{8Bdx + 8Cxdx}{1 - 2ax + xx} + \frac{8Ddx}{1+xx} + \frac{8Edx + 8Fxdx}{1 + 2bx + xx}$ $+ \frac{8Gdx}{1+x}$; or par l'art. 65. on aura $A = \frac{1}{8}$; & $G = \frac{1}{8}$, à cauſe que $\delta - 1 = 6$ eſt un nombre pair, ce qui donne $\int \frac{8Adx}{1-x} = \int \frac{dx}{1-x} = -1 \left(\frac{AP}{AO}\right)$; & $\int \frac{8Gdx}{1+x}$ $= \int \frac{dx}{1+x} = 1 \left(\frac{IP}{IO}\right)$. On trouvera l'intégrale de $\frac{8Ddx}{1+xx}$ comme dans le premier exemple, ainſi puiſque le co-ſinus d'un arc ſept fois plus grand que AE

eſt nul ; & que le ſinus eſt le rayon même dont le double eſt marqué dans les tables par v, qui étant ici négatif donnera $\int \frac{8Ddx}{1+xx} = -v$ (PEO) : on trouvera les intégrales des deux autres différentielles de la même maniére que dans le premier cas, en prenant garde que, a, b, marquent ici les co-ſinus des arcs AC, AG.

Ces exemples ſuffiſent pour faire concevoir la grande étendue du dernier Problême, qui eſt telle qu'on pourroit très-facilement pouſſer la recherche de ces ſortes d'intégrales même juſqu'à l'infini.

REMARQUE I.

75. PUISQU'IL eſt clair par la théorie précédente que les différentes intégrales que peut avoir la différentielle générale $\frac{Dz^{n-1}dz}{e+fz^n}$ ne contiennent que des logarithmes & des meſures d'angles dont les modules ne ſont que des ſinus ou co-ſinus d'arcs de cercle connus, il ſuit que ſi on peut déterminer la grandeur des modules, & des lignes dont il faut prendre les logarithmes, & des angles qu'il faut meſurer, on pourra par les régles données dans la premiére & ſeconde parties évaluer les intégrales trouvées.

Or la diviſion du cercle faiſant connoître les angles AOB, AOC, AOD, &c. on connoîtra les modules par les tables des ſinus : on trouvera auſſi par

la trigonométrie les lignes BP, CP, &c. & les angles PBO, PCO, &c : car tirant le ſinus BN (*fig.* 25. *&* 26.) puiſque OP ou $\sqrt[\lambda]{\frac{fz^{n}}{e}}$ & ON ſont connues, on connoîtra PN, & puiſque l'angle AOB eſt connu, on connoîtra auſſi ſon complement NBO, & par le moyen du triangle NBP, on trouvera le côté BP & l'angle NBP, d'où l'on aura l'angle PBO.

REMARQUE II.

76. IL eſt facile de voir qu'on peut en quelques occaſions abréger les expreſſions des intégrales que donnent les tables, en réduiſant à un ſeul (par l'art. 10.) les termes qui ont le même module : par exemple au lieu $-1\left(\frac{AP}{AO}\right)+1\left(\frac{CP}{CO}\right)$, on peut écrire $1\left(\frac{CP}{AP}\right)$; de même dans le premier cas des formes cinquiéme & ſixiéme on aura $-\beta\left(\frac{BP}{BO}\right)+\beta\left(\frac{DP}{DO}\right)=\beta\left(\frac{DP}{BP}\right)$, & $\beta\left(\frac{BP}{BO}\right)-\beta\left(\frac{DP}{DO}\right)=\beta\left(\frac{BP}{DP}\right)=-\beta\left(\frac{DP}{BP}\right)$, & ainſi pour d'autres exemples. De plus puiſque dans ces intégrales on trouve que la ſomme des termes qui marquent des logarithmes eſt toujours multipliée par la ſomme des co-ſinus poſitifs & négatifs laquelle (par l'art. 47.) eſt égale à 0, cela donne encore lieu d'abréger les expreſſions ; par

exemple l'intégrale de la différentielle $\frac{Dz^{\frac{1}{\tau}n-1}dz}{e+fz^n}$: contient entr'autres ces termes $-\beta\left\{\frac{BP}{BO}\right\}+\gamma\left\{\frac{DP}{DO}\right\}+1\left\{\frac{FP}{FO}\right\}$: or ſi on ſuppoſe que $\frac{DP}{BP}=Q$ ou $DP=Q\times BP$, & $\frac{FP}{BP}=R$ ou $FP=R\times BP$, on aura $-\beta\left\{\frac{BP}{BO}\right\}+\gamma\left\{\frac{DP}{DO}\right\}+1\left\{\frac{FP}{FO}\right\}=-\beta\left\{\frac{BP}{BO}\right\}+\gamma\left\{\frac{BP}{BO}\right\}+\gamma(Q)+1\left\{\frac{BP}{BO}\right\}+1(R)$ mais l'article 47 donne $-\beta+\gamma+1=0$, donc $-\beta\left\{\frac{BP}{BO}\right\}+\gamma\left\{\frac{BP}{BO}\right\}+1\left\{\frac{BP}{BO}\right\}=0$, & par conſéquent on aura $-\beta\left\{\frac{BP}{BO}\right\}+\gamma\left\{\frac{DP}{DO}\right\}+1\left\{\frac{FP}{FO}\right\}=\gamma(Q)+1(R)$. On appliquera le même raiſonnement aux autres formes. Il faut encore obſerver que de même qu'on a rendu les intégrales plus conciſes en réuniſſant à un ſeul tous les termes qui expriment des logarithmes & qui ont le même module, on peut auſſi trouver moyen de réunir enſemble les angles dont les modules ſont les mêmes, & ainſi de diminuer le nombre d'arcs de cercle qui entrent dans les intégrales ; pour cela on va mettre les deux Lemmes ſuivans.

LEMME V.

77. *ETANT donnés les ſinus & co-ſinus de deux arcs, trouver le ſinus & co-ſinus de la différence de ces arcs.*

AVANT décrit du centre O (*fig.* 37.) & du rayon OA une portion de circonférence de cercle ADE, on prendra deux arcs AD, AE, & on tirera les ſinus DB, EF, dont EF rencontre le rayon DO en H, on tirera auſſi le ſinus EG de l'arc DE; cela poſé, puiſque les ſinus DB, EF, & les co-ſinus OB, OF, ſont donnés, on nommera le rayon OA, r; OB, t; OF, s; DB, p; EF, q; il s'agit de trouver le co-ſinus OG & le ſinus EG de l'arc DE différence des deux arcs AE, AD: or les triangles ſemblables OBD, OFH, EGH donneront OB (t). DB (p) :: OF (s). FH $= \frac{ps}{t}$, & OB (t). OD (r) :: OF (s). OH $= \frac{rs}{t}$, & OD (r). DB (p) :: EH $\left(q - \frac{ps}{t}\right)$. HG $= \frac{pq}{r} - \frac{pps}{rt}$; d'où l'on tire OG $=$ OH + HG $= \frac{rrs + pqt - pps}{rt} = \frac{pq + st}{r}$ à cauſe que $rr - pp = tt$; on a auſſi OD (r). OB (t) :: EH $\left(q - \frac{ps}{t}\right)$. EG $= \frac{qt - ps}{r}$. *C. Q. F. T.*

COROLLAIRE.

78. DE ce que EG $= \frac{qt - ps}{r} = \frac{\text{OB} \times \text{EF}}{\text{OD}} -$

$\frac{OF \times DB}{OD}$, on déduit $OF = \frac{OB \times EF}{DB} - \frac{EG \times OD}{DB}$, ce qu'on a auſſi trouvé par induction en transformant la premiére table des formules de l'art. 52. en la ſeconde, on aura donc $OF = \frac{OB \times OG}{OD} - \frac{DB \times EG}{OD}$.

Auſſi de ce que $OG = \frac{pq + st}{r} = \frac{DB \times EF}{OD} + \frac{OB \times OF}{OD}$, on tire $EF = \frac{OG \times OD}{DB} - \frac{OB \times OF}{DB}$, ce qu'on a encore trouvé dans la même transformation, & d'une façon toute différente dans l'art. 74 ; on aura donc $EF = \frac{DB \times OG}{OD} + \frac{OB \times EG}{OD}$.

LEMME VI.

79. *ETANT données les tangentes de deux arcs, trouver la tangente de la différence de ces arcs.*

SOIENT AL, AM, (*fig.* 38.) les deux arcs dont on connoît les tangentes AP, AQ, terminées par les rayons OL, OM prolongés : qu'on tire LN tangente de l'arc LM différence des deux arcs AM, AL, & QR paralléle à LN qui rencontre OL prolongée en R, & nommant le rayon OA, r ; AP, s ; AQ, t ; les triangles ſemblables AOP, PQR, & OLN, ORQ, donneront $OP\ (\sqrt{rr + ss}) . AO\ (r) :: PQ\ (t - s) . QR = \frac{r \times t - s}{\sqrt{rr + ss}}$, & $OP\ (\sqrt{rr + ss})$

$: AP(s) :: PQ(t-s) . RP = \frac{st-ss}{\sqrt{rr+ss}}$; & enſuite

$OR \text{ ou } OP + PR\left\{\frac{rr+ts}{\sqrt{rr+ss}}\right\} . QR\left\{\frac{\overline{r \times t-s}}{\sqrt{rr+ss}}\right\} :: OL(r) . LN = \frac{\overline{rr \times t-s}}{rr+ts}$. *C. Q. F. T.*

COROLLAIRE.

80. ON peut ſe ſervir de l'un ou l'autre de ces deux Lemmes pour réduire en une ſomme les angles qui ont le même module ; nous allons faire uſage du dernier. Il ſuit donc que ſi s marque la tangente d'un arc de cercle dont r eſt le rayon, & t la tangente d'un arc plus grand, m la tangente de la différence de ces deux arcs ; on aura les deux formules ſuivantes $m = \frac{\overline{rr \times t-s}}{rr+st}$, $t = \frac{\overline{rr \times m+s}}{rr-ms}$; cela poſé, qu'on ſuppoſe l'arc AB (*fig.* 25. *&* 26.) égal à l'arc QS, & pour trouver à la fois la ſomme des deux angles PBO, PSO, qui ont un module commun, on nommera OA, 1 ; OP, x ; ON ou OM, a ; & on réduira premiérement en une ſomme les deux angles NBO, PBN, (*fig.* 25.) par la ſeconde formule, on aura donc $rr = 1 - aa$, $m = a$, $s = x - a$; ce qui donnera $t = \frac{\overline{1-aa \times x}}{1-ax}$ égale à la tangente de l'angle PBO ; ſi OP eſt moindre que ON (*fig.* 26.) on trouvera la tangente de l'angle PBO différence des angles NBO, PBN, par la premiére

formule, dans laquelle on aura $t = a$, $s = a - x$, d'où l'on tire $m = \frac{\sqrt{1 - aaxx}}{1 - ax}$ égale à la tangente de l'angle PBO. On trouvera auſſi par la premiére formule la tangente de l'angle PSO, ainſi on aura dans ce cas $t = a + x$, $s = a$, & $\frac{\sqrt{1 - aaxx}}{1 + ax}$ pour la valeur de cette tangente. Ayant donc les tangentes des angles PBO, PSO, on trouvera encore par la ſeconde formule la tangente de la ſomme de ces deux angles ; ainſi on aura ici $m = \frac{\sqrt{1 - aaxx}}{1 - ax}$, $s = \frac{\sqrt{1 - aaxx}}{1 + ax}$, & la tangente de cette ſomme ſera $\frac{\sqrt{1 - aaxx}}{1 - xx} \times 2x$. De cette maniére au lieu de chercher chaque angle ſéparément, on s'épargnera du travail en cherchant par une ſeule opération la ſomme des angles qui ont le même module, laquelle étant trouvée on déterminera par le moyen du module la grandeur de l'arc qui convient à cette ſomme. On trouvera donc facilement par les tables des ſinus & tangentes ce qu'on cherche ; car ſoit L le logarithme de $\frac{\sqrt{1 - aaxx}}{1 - xx} \times 2x$, & L + 10000000 marquera dans les tables le logarithme de la tangente de la ſomme des angles PBO, PSO ; par conſéquent cette ſomme ſera connue.

PROBLEME

PROBLÈME III.

81. *ETANT donnée l'intégrale de la différentielle* $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n}$, *trouver l'ingrale de* $\frac{Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n}$, *θ étant un nombre entier positif ou négatif.*

PREMIER CAS.

Lorsque θ est un nombre entier positif.

LL faut diviser le numérateur $Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz$ de la proposée par le dénominateur $e+fz^n$, en prenant fz^n pour premier terme du diviseur, & l'on trouvera $\frac{Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n} = \frac{Dz^{\overline{\theta-1}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{f}$ $-\frac{Dez^{\overline{\theta-2}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{ff}+\frac{Deez^{\overline{\theta-3}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{f^3}$ $-\frac{De^3z^{\overline{\theta-4}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{f^4}$ &c. $\mp\frac{De^\theta z^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{f^\theta\times e+fz^n}$: il faut continuer les termes de cette suite, jusqu'à ce qu'on trouve que l'exposant de la variable z qui va toujours en diminuant, devient égal à $\frac{\delta}{\lambda}n-1$, c'est-à dire qu'il faut autant de termes qu'il y a d'unités dans le nombre θ outre le terme $\frac{De^\theta z^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{f^\theta\times e+fz^n}$ qui,

comme on voit par la nature de la diviſion, ſera toujours le dernier ; il faut obſerver que tous les termes ont alternativement les ſignes + & —. Maintenant ſi Q déſigne l'intégrale de $\frac{z^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n}$, l'intégrale totale ſera $\frac{Dz^{\overline{\theta-1}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n}}{\overline{\theta-1}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n\times f} - \frac{Dez^{\overline{\theta-2}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n}}{\overline{\theta-2}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n\times ff}$ $+ \frac{De^2z^{\overline{\theta-3}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n}}{\overline{\theta-3}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n\times f^3} - \frac{De^3z^{\overline{\theta-4}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n}}{\overline{\theta-4}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n\times f^4}$ &c. $\mp \frac{De^\theta}{f^\theta}Q$. Soit donc propoſé de trouver l'intégrale de la différentielle $\frac{Dz^{4n+\frac{4}{5}n-1}dz}{e+fz^n}$; l'on aura dans cet exemple $\theta=4$, $\delta=4$, $\lambda=5$, & mettant ces valeurs dans la formule donnée, l'intégrale demandée qui ne doit avoir en tout que cinq termes ſera $\frac{5Dz^{\frac{19}{5}n}}{19nf} - \frac{5Dez^{\frac{14}{5}n}}{14nff} + \frac{5De^2z^{\frac{9}{5}n}}{9nf^3} - \frac{5De^3z^{\frac{4}{5}n}}{4nf^4} \mp \frac{De^4}{f^4}Q$.

Si on avoit $\frac{\delta}{\lambda}=0$, c'eſt-à-dire, ſi on cherchoit l'intégrale de la différentielle $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n}$, étant donnée celle de $\frac{Dz^{n-1}dz}{e+fz^n}$; alors on voit que, puiſque

les deux derniers termes de la diviſion qu'on a fait ci-deſſus doivent avoir z^{n-1} au numérateur, il y aura un terme de moins dans la ſuite de la diviſion, & par conſéquent l'intégrale dans ce cas aura cette forme $\frac{Dz^{\theta-1\times n}}{\theta-1\times n\times f} - \frac{Dez^{\theta-2\times n}}{\theta-2\times n\times ff} + \frac{De^2z^{\theta-3\times n}}{\theta-3\times n\times f^3} - \frac{De^3z^{\theta-4\times n}}{\theta-4\times n\times f^4}$ &c. $\pm \frac{De^{\theta-1}}{f^{\theta-1}}Q$; Q marque ici l'intégrale de $\frac{z^{n-1}dz}{e+fz^n}$. Ainſi ſi on demande l'intégrale de $\frac{Dz^{4n-1}dz}{e+fz^n}$, on aura $\theta = 4$, & cette intégrale qui ne doit avoir en tout que quatre termes ſera $\frac{Dz^{3n}}{3nf} - \frac{Dez^{2n}}{2nff} + \frac{De^2z^n}{nf^3} - \frac{De^3}{f^3}Q$.

SECOND CAS.

Lorſque θ eſt un nombre entier négatif.

IL faut encore dans ce cas diviſer le numérateur $Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz$ par le dénominatur $e+fz^n$, mais en prenant e pour premier terme du diviſeur, & l'on trouvera $\frac{Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n} = \frac{Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e} - \frac{Dfz^{\theta+1\times n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{ee} + \frac{Df^2z^{\theta+2\times n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e^3}$

$$-\frac{Df^{1}z^{\overline{\theta+3}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e^{4}}\ \&c.\ \pm\frac{Df^{\theta}z^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e^{\theta}\times e+fz^{n}},$$

dont l'intégrale ſera $\frac{Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n}}{\overline{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n}\times e}-\frac{Df^{1}z^{\overline{\theta+1}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n}}{\overline{\overline{\theta+1}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n}\times ee}$

$$+\frac{Df^{2}z^{\overline{\theta+2}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n}}{\overline{\overline{\theta+2}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n}\times e^{2}}-\frac{Df^{3}z^{\overline{\theta+3}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n}}{\overline{\overline{\theta+3}\times n+\frac{\delta}{\lambda}n}\times e^{4}}\ \&c.\ \pm\frac{Df^{\theta}}{e^{\theta}}Q.$$

On voit que dans ce cas-ci comme dans le précédent l'intégrale aura autant de termes que θ contient d'unités outre le terme $\frac{Df^{\theta}}{e^{\theta}}Q$, & que tous les termes auroient par la diviſion alternativement les ſignes + & —; mais parce que la fraction $\frac{\delta}{\lambda}$ eſt ſuppoſée moindre que l'unité, il eſt évident que l'expoſant de z eſt toujours négatif, & que comme chaque terme eſt diviſé par cet expoſant, le ſigne en ſera changé, & ainſi tous les termes auront alternativement les ſignes — & +, excepté le dernier $\frac{Df^{\theta}}{e^{\theta}}Q$, qui n'étant point diviſé par une quantité négative, ne changera point de ſigne, c'eſt-à-dire, qu'il aura dans ce cas le même ſigne que le terme qui le précéde. Ainſi ſi on demandoit l'intégrale de la différentielle $\frac{Dz^{-3n+\frac{5}{7}n-1}dz}{e+fz^{n}}$, on auroit

$\theta = -3$, $\frac{\delta}{\lambda} = \frac{5}{7}$, & ſubſtituant ces valeurs dans la formule, on trouve que l'intégrale cherchée qui doit conſiſter en quatre termes eſt $-\frac{7D}{16nez^{\frac{16}{7}n}} + \frac{7Df}{9nez^{\frac{9}{7}n}} - \frac{7Dff}{2ne^2z^{\frac{2}{7}n}} - \frac{Df^3}{e^3}Q$.

Si on avoit encore ici $\frac{\delta}{\lambda} = 0$, il eſt clair que la même formule donneroit l'intégrale demandée pourvû que Q exprimât l'intégrale de la différentielle $\frac{z^{-1}dz}{e+fz^n}$: en rejettant dans ce cas toutes les quantités qui ſont nulles, la formule s'exprimera de cette façon $\frac{Dz^{\theta n}}{\theta ne} - \frac{Dz^{\overline{\theta+1}\times n}}{\overline{\theta+1}\times nee} + \frac{Dz^{\overline{\theta+2}\times n}}{\overline{\theta+2}\times ne^2} - \frac{Dz^{\overline{\theta+3}\times n}}{\overline{\theta+3}\times ne^4}$ &c. $\pm\frac{Df^\theta}{e^\theta}Q$.

Si on demande l'intégrale de $\frac{Dz^{-3n-1}dz}{e+fz^n}$, en ſubſtituant dans la formule -3 au lieu de θ, on trouve $-\frac{D}{3nez^{3n}} + \frac{Df}{2ne^2z^{2n}} - \frac{Dff}{ez^n} - \frac{Df^3}{e^3}Q$.

PROBLÊME IV.

82. *ETANT donnée l'intégrale de la différentielle*

$\frac{Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n}$ *trouver l'intégrale de cette autre* $\frac{Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{\overline{e+fz^n}\times\overline{g+hz^n}}$.

ON ſuppoſera $z^n=x$, ce qui donne $z^{n-1}dx=\frac{dx}{n}$, $z^{\theta n-1}dz=\frac{x^{\theta-1}dx}{n}$, & $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\overline{e+fz^n}\times\overline{g+hz^n}}=\frac{D}{n}\times\frac{x^{\theta-1}dx}{\overline{e+fx}\times\overline{g+hx}}$; & ſi on ſuppoſe $\theta=1$, on trouve (par l'art. 59.) $\frac{Dz^{n-1}dz}{\overline{e+fz^n}\times\overline{g+hx^n}}=\frac{D}{n}\times\frac{dx}{\overline{e+fx}\times\overline{g+hx}}=\frac{f}{fg-eh}\times\frac{Ddx}{n\times\overline{e+fx}}-\frac{h}{fg-eh}\times\frac{Ddx}{n\times\overline{g+hx}}$: pareillement ſi $\theta=2$, on aura par le même article $\frac{Dz^{2n-1}dz}{\overline{e+fz^n}\times\overline{g+hz^n}}=\frac{D}{n}\times\frac{xdx}{\overline{e+fx}\times\overline{g+hx}}=-\frac{e}{fg-eh}\times\frac{Ddx}{n\times\overline{e+fx}}+\frac{g}{fg-eh}\times\frac{Ddx}{n\times\overline{g+hx}}$; & en remettant dans ces différentielles z^n au lieu de x, & $z^{n-1}dz$ au lieu de $\frac{dx}{n}$, & les multipliant par $z^{\frac{\delta}{\lambda}n}$, on trouve $\frac{Dz^{n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{\overline{e+fz^n}\times\overline{g+hz^n}}=\frac{f}{fg-eh}\times\frac{Dz^{n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n}-\frac{h}{fg-eh}\times\frac{Dz^{n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{g+hz^n}$, & $\frac{Dz^{2n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{\overline{e+fz^n}\times\overline{g+hz^n}}$

$= -\frac{e}{fg-eh} \times \frac{Dz^{n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n} + \frac{g}{fg-eh} \times \frac{Dz^{n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{g+hz^n}$; si θ est égal à 3, 4, 5, &c. on multipliera cette derniére équation par z^n, z^{2n}, z^{3n}, &c. & l'on trouvera toujours que la proposée est égale à la somme de deux différentielles dont on trouvera les intégrales de la maniére qu'on a enseigné dans le Problême précédent.

On aura surtout ces intégrales très-facilement en se servant des tables construites par le Problême précédent telles que sont les premiéres que nous donne M. SMITH. Ainsi qu'il faille trouver l'intégrale de $\frac{Dz^{3n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n \times g+hz^n}$, on aura $\theta = 3$, $\frac{\delta}{\lambda} = \frac{1}{4}$, & la proposée sera égale à ces deux autres $-\frac{e}{fg-eh} \times \frac{Dz^{2n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n} + \frac{g}{fg-eh} \times \frac{Dz^{2n+\frac{1}{4}n+1}dz}{g+hz^n}$ qui se rapportent à la formé cinquiéme, par laquelle on trouve $\int -\frac{e}{fg-eh} \times \frac{Dz^{2n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n} = -\frac{4Dez^{\frac{5}{4}n}}{5nf \times fg-eh} + \frac{4Deez^{\frac{1}{4}n}}{nff \times fg-eh} - \frac{4De^3}{nf^3 \times fg-eh}$ (1); & par la même en substituant partout, g, h, au lieu

de, e, f, on trouve $\int \frac{g}{fg-eh} \times \frac{Dz^{2n+\frac{1}{4}n-1}dz}{g+hz^n} =$

$\frac{4Dgz^{\frac{5}{4}n}}{5nh \times fg-eh} - \frac{4Dzgz^{\frac{1}{4}n}}{nhh \times fg-eh} + \frac{4Dg^3}{nh^3 \times fg-eh}$ ②.

D'où en prenant la ſomme on déduit $\frac{4Dz^{\frac{5}{4}n}}{5nfh} -$

$\frac{4D \times \overline{fg+eh} \times z^{\frac{1}{4}n}}{nffhh} - \frac{4De^3}{nf^3 \times fg-eh}$ ① $+ \frac{4Dg^3}{nh^3 \times fg-eh}$ ②

pour l'intégrale totale de la propoſée.

LEMME VII.

83. *ETANT donnée l'intégrale* A *de la différentielle* $z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu}$, *trouver l'intégrale de cette autre* $z^{\vartheta n+\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu}$, ϑ *repréſentant un nombre entier poſitif ou négatif, &* δ *&* μ *des nombres quelconques.*

ON cherchera premiérement l'intégrale de $z^{n+\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu}$, ou $\vartheta = 1$, pour cela on prendra la différence de cette quantité $Mz^{\delta} \times \overline{e+fz^n}^{\mu+1}$ (M eſt une quantité indéterminée) de laquelle on ôtera la différentielle $z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu}$, ce que donne $\overline{M\delta e-1} \times z^{\delta-1}dz + Mf \times \overline{\delta+n+n\mu} \times z^{n+\delta-1}dz \} \times \overline{e+fz^n}^{\mu}$. dont l'intégrale eſt $Mz^{\delta} \times \overline{e+fz^n}^{\mu+1} - A$: enſuite on ſuppoſera le premier terme $M\delta e - 1 = 0$, d'où

d'où l'on tirera $M = \frac{1}{\delta e}$, & mettant cette valeur de M dans le ſecond terme & dans l'intégrale on aura $\int \frac{f}{\delta e} \times \overline{\delta + n + n\mu} \times z^{n+\delta-1} dz \times \overline{e + fz^n}^{\mu} = \frac{\overline{z^{\delta} \times e + fz^n}^{\mu+1}}{\delta e} - A$, & par conſéquent $\int z^{n+\delta-1} dz \times \overline{e + fz^n}^{\mu} = \frac{z^{\delta} \times \overline{e + fz^n}^{\mu+1}}{f \times \overline{\delta + n + n\mu}} - \frac{\delta e}{f \times \overline{\delta + n + n\mu}} A.$

Maintenant ſi on nomme B cette intégrale qu'on vient de trouver, & qu'on prenne la différentielle de $Mz^{\delta+n} \times \overline{e + fz^n}^{\mu+1}$, en faiſant le calcul comme ci-devant, on trouve $M = \frac{1}{e \times \overline{\delta + n}}$, & $\int z^{2n+\delta-1} dz \times \overline{e + fz^n}^{\mu} = \frac{z^{\delta+n} \times \overline{e + fz^n}^{\mu+1}}{f \times \overline{\delta + 2n + n\mu}} - \frac{e \times \overline{\delta + n}}{f \times \overline{\delta + 2n + n\mu}} B = C.$

De la même maniére par le moyen de l'intégrale C, & de $Mz^{\delta+2n} \times \overline{e + fz^n}^{\mu+1}$, on trouveroit celle de $z^{3n+\delta-1} dz \times \overline{e + fz^n}^{\mu}$, & ainſi de ſuite. Même on voit facilement que les intégrales A, B, C, &c. ſont entiérement ſemblables en y ſubſtituant les quantités δ, $\delta + n$, $\delta + 2n$, $\delta + 3n$, &c. lorſqu'elles ſont les expoſans de z dans la quantité $Mz^{\delta+n} \times \overline{e + fz^n}^{\mu+1}$.

Pour trouver l'intégrale de $z^{-n+\delta-1} dz \times \overline{e + fz^n}^{\mu}$, on prendra la différence de la quantité $Mz^{-n+\delta}$

$\times \overline{e+fz^n}^{\mu+1}$, & on en ôtera la différentielle donnée $z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu}$, ce qui donnera - - -

$$Me \times \overline{\delta-n} \times z^{-n+\delta-1}dz + Mf \times \overline{\delta+n\mu-1} \times z^{\delta-1}dz \} \times \overline{e+fz^n}^{\mu}$$

dont l'intégrale eſt $Mz^{-n+\delta} \times \overline{e+fz}^{\mu+1} - A$; enſuite on ſuppoſera $Mf \times \overline{\delta+n\mu-1} = 0$, d'où l'on tire $M = \frac{1}{f \times \overline{\delta+n\mu}}$, & mettant cette valeur de M dans la différentielle & l'intégrale ci-deſſus on trouve

$$\int z^{-n+\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu} = \frac{z^{-n+\delta} \times \overline{e+fz^n}^{\mu+1}}{e \times \overline{\delta-n}} - \frac{f \times \overline{\delta+n\mu}}{e \times \overline{\delta-n}} A.$$

Si on nomme B cette intégrale, & qu'en ſe ſervant de la quantité $Mz^{-n+\delta} \times \overline{e+fz^n}^{\mu+1}$ on fait un calcul ſemblable à celui qu'on vient de faire, on trouve dans ce cas $M = \frac{1}{\delta-n+n\mu}$, & $\int z^{-2n+\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu} = \frac{z^{-2n+\delta} \times \overline{e+fz^n}^{\mu+1}}{e \times \overline{\delta-2n}} - \frac{f \times \overline{\delta-n+n\mu}}{e \times \overline{\delta-2n}} B$, & de cette façon chaque intégrale fait découvrir la ſuivante : de ſorte que ſi, pour abréger on ſuppoſe $e+fz^n = R$, $\delta+n+n\mu = p$, $\delta+2n+n\mu = p+n = q$, $\delta+3n+n\mu = q+n = r$, $\delta+4n+n\mu = r+n = s$; & $\delta+n\mu = h$, $\delta-n+n\mu = h-n = k$, $\delta-2n+n\mu = k-n = l$, $\delta-3n+n\mu = l-n = m$, & qu'au lieu de B, C, &c. on remet leurs valeurs, on formera la table ſuivante qui ſera d'uſage dans la ſuite.

9 $z^{\delta n+\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu}$.

&c.

4 $\frac{z^{\delta+3n}R^{\mu+1}}{fs} - \frac{e \times \overline{\delta+3n} \times z^{\delta+2n}R^{\mu+1}}{ffrs} + \frac{ee \times \overline{\delta+2n} \times \overline{\delta+3n} \times z^{\delta+n}R^{\mu+1}}{f^3qrs} - \frac{e^3 \times \overline{\delta+n} \times \overline{\delta+2n} \times \overline{\delta+3n} \times z^{\delta}R^{\mu+1}}{f^4pqrs} + \frac{\delta e^4 \times \overline{\delta+n} \times \overline{\delta+2n} \times \overline{\delta+3n}}{f^4pqrs}$ A.

3 $\frac{z^{\delta+2n}R^{\mu+1}}{fr} - \frac{e \times \overline{\delta+2n} \times z^{\delta+n}R^{\mu+1}}{ffqr} + \frac{ee \times \overline{\delta+n} \times \overline{\delta+2n} \times z^{\delta}R^{\mu+1}}{f^3pqr} - \frac{\delta e^3 \times \overline{\delta+n} \times \overline{\delta+2n}}{f^3pqr}$ A.

2 $\frac{z^{\delta+n}R^{\mu+1}}{fq} - \frac{e \times \overline{\delta+n} \times z^{\delta}R^{\mu+1}}{ffpq} + \frac{\delta ee \times \overline{\delta+n}}{ffpq}$ A.

1 $\frac{z^{\delta}R^{\mu+1}}{fp} - \frac{\delta e}{fp}$ A.

0 A.

−1 $\frac{z^{\delta-n}R^{\mu+1}}{e \times \overline{\delta-n}} - \frac{fh}{e \times \overline{\delta-n}}$ A.

−2 $\frac{z^{\delta-2n}R^{\mu+1}}{e \times \overline{\delta-2n}} - \frac{fkz^{\delta-n}R^{\mu+1}}{ee \times \overline{\delta-n} \times \overline{\delta-2n}} + \frac{ffhk}{ee \times \overline{\delta-n} \times \overline{\delta-2n}}$ A.

−3 $\frac{z^{\delta-3n}R^{\mu+1}}{e \times \overline{\delta-3n}} - \frac{flz^{\delta-2n}R^{\mu+1}}{ee \times \overline{\delta-2n} \times \overline{\delta-3n}} + \frac{ffklz^{\delta-n}R^{\mu+1}}{e^3 \times \overline{\delta-n} \times \overline{\delta-2n} \times \overline{\delta-3n}} - \frac{f^3hkl}{e^3 \times \overline{\delta-n} \times \overline{\delta-2n} \times \overline{\delta-3n}}$ A.

&c.

LEMME VIII.

84. *ETANT données les intégrales* A, B, *des différentielles* $z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^{n}+gz^{2n}}^{\mu}$, $z^{n+\delta-1}dz \times \overline{e+fz^{n}+gz^{n}}^{\mu}$, *trouver l'intégrale de la différentielle générale* $z^{\vartheta n+\delta-1}dz \times \overline{e+fz^{n}+gz^{2n}}^{\mu}$, ϑ *étant un nombre entier positif ou négatif.*

ON commencera par chercher l'intégrale de $z^{2n+\delta-1}dz \times R^{\mu}$; (on suppose $e+fz^{n}+gz^{2n}=R$) pour cela on multipliera chacune des deux différentielles données par une quantité indéterminée H & K, & on aura $Hz^{\delta-1}dz \times R^{\mu}$, $Kz^{n+\delta-1}dz \times R^{\mu}$, dont les intégrales sont $H \times A$, & $K \times B$, ensuite on ôtera ces différentielles de la différentielle de cette quantité $Mz^{\delta} \times R^{\mu+1}$, ce qui donnera

$$\left.\begin{array}{l} M\delta e + Mf \times \overline{\delta+n+n\mu} \times z^{n} + Mg \times \overline{\delta+2n+n\mu} \times z^{2n} \\ -H-K \times z^{n} \end{array}\right\} \times R^{\mu} z^{\delta-1}dz$$

& en supposant les deux premiers termes égaux à zero, on tire $M=\frac{H}{\delta e}$, $K=\frac{Hf \times \overline{\delta+n+n\mu}}{\delta e}$; d'où l'on déduira en substituant ces valeurs dans cette derniére différentielle & son intégrale $Mz^{\delta} \times R^{\mu+1} - K \times B - H \times A$, $\int z^{2n+\delta-1}dz \times R^{\mu} =$

$$\frac{z^{\delta}R^{\mu+1}}{g \times \overline{\delta+2n+2n\mu}} - \frac{f \times \overline{\delta+n+n\mu}}{g \times \overline{\delta+2n+2n\mu}} B - \frac{\delta e}{g \times \overline{\delta+2n+2n\mu}} A;$$

il est indifférent, comme on voit, quelle valeur on donne à H.

Par le moyen de cette intégrale, de l'intégrale B, &

de $Mz^{n+\delta} \times R^{\mu+1}$, on trouvera par un calcul tout-à-fait ſemblable à celui qu'on vient de faire, l'intégrale de $z^{3n+\delta-1}dz \times R^{\mu}$, & ainſi on peut continuer ces intégrales auſſi loin qu'on juge à propos, comme dans le Lemme précédent.

Maintenant ſi δ eſt un nombre négatif, on commencera par chercher l'intégrale de $z^{-n+\delta-1}dz \times R^{\mu}$, pour cela on prendra la différence de $Mz^{-n+\delta}R^{\mu+1}$, & on en ôtera les deux différentielles $Hz^{\delta-1}dz \times R^{\mu}$, $Kz^{n+\delta-1}dz \times R^{\mu}$, ce qui donnera

$$\left.\begin{matrix} Me \times \overline{\delta-n} \times z^{-n} + Mf \times \overline{\delta+n\mu} + Mg \times \overline{\delta+n+2n\mu} \times z^{n} \\ -H \qquad\qquad -K \times z^{n} \end{matrix}\right\} \times R^{\mu} z^{\delta-1} dz$$

dont l'intégrale eſt $Mz^{-n+\delta} \times R^{\mu+1} - KB - HA$: on ſuppoſera les deux derniers termes, chacun égal à zero, d'où l'on tirera $M = \frac{H}{f \times \overline{\delta+n\mu}}$, $K = \frac{Hg \times \overline{\delta+n+2n\mu}}{f \times \overline{\delta+n\mu}}$, & ſubſtituant ces valeurs dans la différentielle & l'intégrale, on trouve $\int z^{-n+\delta-1}dz \times R^{\mu}$

$$= \frac{z^{-n+\delta}R^{\mu+1}}{e \times \overline{\delta-n}} - \frac{g \times \overline{\delta+n+2n\mu}}{e \times \overline{\delta-n}} B - \frac{f \times \overline{\delta+n\mu}}{e \times \overline{\delta-n}} A.$$

Par le moyen de cette intégrale, & de l'intégrale A, & de la quantité $Mz^{-2n+\delta}R^{\mu+1}$, on trouvera celle de $z^{-2n+\delta-1}dz \times R^{\mu}$; & de cette façon on continuera la recherche de ces intégrales, mais pour abréger on ſuppoſera $\delta+n+2n\mu = b$, $b-n = k$, $k-n = l$, $b+n = s$, $s+n = t$, $t+n = \tau$; & $\delta+n+n\mu = p$, $p+n = q$, $q+n = r$, $p-n = x$, $x-n = \lambda$, $\lambda-n = \varpi$; d'où l'on conſtruira la table ſuivante.

9	$z^{\delta n+\delta-1}dz \times \overline{e+fz^{n}+gz^{2n}}^{\mu}$
&c.	
4	$\frac{z^{2n+\delta}R^{\mu+1}}{g\tau} - \frac{fz^{n+\delta}R^{\mu+1}}{gg^{2}\tau} + \frac{ffgr-egt\times\overline{\delta+2n}\times z^{\delta}R^{\mu+1}}{g^{3}st\tau}$
	$-\frac{f^{3}pqr-efgrs\times\overline{\delta+n}-efgpt\times\overline{\delta+2n}}{g^{3}st\tau}$ B +
	$\frac{\delta eegt\times\overline{\delta+2n}-\delta effqr}{g^{3}st\tau}$ A.
3.	$\frac{z^{n+\delta}R^{\mu+1}}{g^{2}} - \frac{fgz^{\delta}R^{\mu+1}}{gg^{st}} + \frac{ffpq-egs\times\overline{\delta+n}}{gg^{st}}$ B + $\frac{\delta efq}{gg^{st}}$ A.
2.	$\frac{z^{\delta}R^{\mu+1}}{g^{s}} - \frac{fp}{g^{s}}$ B $- \frac{\delta e}{g^{s}}$ A.
1.	B.
0.	A.
−1.	$\frac{z^{-n+\delta}R^{\mu+1}}{e\times\overline{\delta-n}} - \frac{gh}{e\times\overline{\delta-n}}$ B $- \frac{fz}{e\times\overline{\delta-n}}$ A.
−2.	$\frac{z^{-2n+\delta}R^{\mu+1}}{e\times\overline{\delta-2n}} - \frac{f\lambda z^{-n+\delta}R^{\mu+1}}{ee\times\overline{\delta-n}\times\overline{\delta-2n}} + \frac{fgh\lambda}{ee\times\overline{\delta-n}\times\overline{\delta-2n}}$ B +
	$\frac{ffz\lambda-egk\times\overline{\delta-n}}{ee\times\overline{\delta-n}\times\overline{\delta-2n}}$ A.
−3.	$\frac{z^{-3n+\delta}R^{\mu+1}}{e\times\overline{\delta-3n}} - \frac{f\varpi z^{-2n+\delta}R^{\mu+1}}{ee\times\overline{\delta-2n}\times\overline{\delta-3n}} +$
	$\frac{ff\lambda\varpi-egl\times\overline{\delta-2n}}{e^{3}\times\overline{\delta-n}\times\overline{\delta-2n}\times\overline{\delta-3n}} z^{-n+\delta}R^{\mu+1} - \frac{ffgh\lambda\varpi-egghl\times\overline{\delta-2n}}{e^{3}\times\overline{\delta-n}\times\overline{\delta-2n}\times\overline{\delta-3n}}$ B
	$-\frac{f^{3}z\lambda\varpi-efgk\times\overline{\delta-n}-efglz\times\overline{\delta-2n}}{e^{3}\times\overline{\delta-n}\times\overline{\delta-2n}\times\overline{\delta-3n}}$ A.
&c.	

REMARQUE.

85. On doit observer que lorsqu'on a $\mathfrak{n}+\mathfrak{s}=0$, la table ne donne pas d'abord l'intégrale, à cause que les termes en deviennent infinis; dans ce cas il ne faut que changer la différentielle donnée en une autre en supposant $z^{\mathfrak{n}}=x^{-\mathfrak{n}}$, par exemple si on demande l'intégrale de $\frac{z^{-\mathfrak{n}-1}dz}{e+fz^{\mathfrak{n}}+gz^{2\mathfrak{n}}}$, $\mathfrak{s}$ étant $=\mathfrak{n}$, la supposition de $z^{\mathfrak{n}}=x^{-\mathfrak{n}}$, donnera $\frac{z^{-\mathfrak{n}-1}dz}{e+fz^{\mathfrak{n}}+gz^{2\mathfrak{n}}}=-\frac{x^{3\mathfrak{n}-1}dx}{g+fx^{\mathfrak{n}}+ex^{2\mathfrak{n}}}$; or cette dernière différentielle se rapporte à la table, & on en trouvera l'intégrale, pourvû que les intégrales de $\frac{x^{\mathfrak{n}-1}dz}{g+fx^{\mathfrak{n}}+ex^{2\mathfrak{n}}}$, $\frac{x^{2\mathfrak{n}-1}dx}{g+fx^{\mathfrak{n}}+ex^{2\mathfrak{n}}}$ soient données. Ou bien on multipliera la donnée $\frac{z^{-\mathfrak{n}-1}dz}{e+fz^{\mathfrak{n}}+gz^{2\mathfrak{n}}}$, & on la divisera par $z^{-2\mathfrak{n}}$, ce qui donnera $\frac{z^{-3\mathfrak{n}-1}dz}{g+fz^{-\mathfrak{n}}+ez^{-2\mathfrak{n}}}$ qui se rapporte à la table, en prenant $\mathfrak{n}$ pour un exposant négatif, & $\mathfrak{s}=-\mathfrak{n}$, & on en trouvera l'intégrale cherchée, pourvû que les intégrales de $\frac{z^{-\mathfrak{n}-1}dz}{g+fz^{-\mathfrak{n}}+ez^{-2\mathfrak{n}}}$, $\frac{z^{-2\mathfrak{n}-1}dz}{g+fz^{-\mathfrak{n}}+ez^{-2\mathfrak{n}}}$ soient données. On doit aussi faire

la même remarque à l'égard de la table donnée dans le Lemme précédent.

LEMME IX.

86. *ETANT donnée l'intégrale* A *de la différentielle* $z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu}$, *trouver l'intégrale de la différentielle* $z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu+\tau}$, δ *&* μ *représentans des nombres quelconques &* τ *un nombre entier positif ou négatif.*

Soit nommée B l'intégrale de $z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu+1}$ laquelle on cherchera en premier lieu : on réduira premiérement cette différentielle sous une autre forme telle que $\overline{ez^{\delta-1}dz+fz^{\delta+n-1}dz} \times \overline{e+fz^n}^{\mu}$, ensuite on l'ajoutera à la différence de la quantité $Mz^{\delta} \times \overline{e+fz^n}^{\mu+1}$, ce qui donnera

$$\left.\begin{array}{l} M\delta ez^{\delta-1}dz+M\times\overline{\delta f+\overline{\mu+1}}\times nf\times z^{\delta+n-1}dz \\ +ez^{\delta-1}dz+fz^{\delta+n-1}dz \end{array}\right\}\times\overline{e+fz^n}^{\mu}$$

dont l'intégrale est $B+Mz^{\delta}\times\overline{e+fz^n}^{\mu+1}$; & pour faire évanouir le terme qui est multiplié par $z^{\delta+n-1}dz$, on supposera $f+M\times\overline{\delta f+\overline{\mu+1}}\times nf \overset{c}{=} o$, d'où l'on tire $M=-\frac{1}{\delta+n+n\mu}$, & en substituant cette valeur de M dans la différentielle

&

& ſon intégrale, l'on trouve $\int \frac{ne+n\mu e}{\delta+n+n\mu} z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu} = B - \frac{z^{\delta} \times \overline{e+fz^n}^{\mu+1}}{\delta+n+n\mu}$; mais puiſque $\int z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu} = A$, on déduira $B = \frac{ne+n\mu e}{\delta+n+n\mu} A + \frac{z^{\delta} \times \overline{e+fz^n}^{\mu+1}}{\delta+n+n\mu} = \frac{ne+n\mu e}{\delta+n+n\mu} A + \frac{ez^{\delta}+fz^{\delta+n}}{\delta+n+n\mu} \times \overline{e+fz^n}^{\mu}$.

On voit que le calcul eſt ſemblable pour les autres cas, où $\tau = 2$, $\tau = 3$, $\tau = 4$, &c. & que par conſéquent en ſubſtituant ſucceſſivement les quantités $\mu+2, \mu+3, \mu+4$, &c. on aura $\int z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu+2} = \frac{ne \times \mu+2}{\delta+n \times \mu+2} B + \frac{z^{\delta} \times \overline{e+fz^n}^{\mu+2}}{\delta+n \times \mu+2}$, &c.

Maintenant pour trouver l'intégrale de $z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu+\tau}$ lorque τ eſt un nombre entier négatif, on nommera B l'intégrale de $z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu-1}$, & on transformera la différentielle $z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu}$ en cette autre $\overline{ez^{\delta-1}dz + fz^{\delta+n-1}dz} \times \overline{e+fz^n}^{\mu-1}$ laquelle on ajoutera à la différence de $Mz^{\delta} \times \overline{e+fz^n}^{\mu}$ ce qui donnera

$$\left.\begin{array}{l} M\delta ez^{\delta-1}dz + Mf \times \overline{\delta+n\mu} \times z^{\delta+n-1}dz \\ + ez^{\delta-1}dz + fz^{\delta+n-1}dz \end{array}\right\} \times \overline{e+fz^n}^{\mu-1},$$

dont l'intégrale eſt $A + Mz^{\delta} \times \overline{e + fz^{n}}^{\mu}$, enſuite faiſant $f + Mf \times \overline{\delta + n\mu} = 0$, on tire $M = -\frac{1}{\delta + n\mu}$, & ſubſtituant cette valeur on trouve $\int z^{\delta-1} dz \times \overline{e + fz^{n}}^{\mu-1} = B = -\frac{z^{\delta} \times \overline{e + fz^{n}}^{\mu}}{en\mu} + \frac{\delta + n\mu}{en\mu} A$. On trouvera les intégrales des autres différentielles lorſque $\tau = -2$, $\tau = -3$, &c. en faiſant les ſubſtitutions néceſſaires, de ſorte que ſi on ſuppoſe $\mu + 1 = p$, $\mu + 2 = q$, $\mu + 3 = r$, $\mu + 4 = s$ & $\mu - 1 = b$, $\mu - 2 = k$, $\mu - 3 = m$, on pourra conſtruire la table ſuivante

τ $\quad z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\mu+\tau}$.

&c. $\quad \dfrac{z^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu+4}}{\delta+ns} + \dfrac{ens z^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu+3}}{\delta+nr \times \delta+ns} +$

$\dfrac{e^2n^2rsz^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu+2}}{\delta+nq \times \delta+nr \times \delta+ns} + \dfrac{e^3n^3qrsz^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu+1}}{\delta+np \times \delta+nq \times \delta+nr \times \delta+ns} +$

$\dfrac{e^4n^4pqrs}{\delta+np \times \delta+nq \times \delta+nr \times \delta+ns}$ A.

3. $\quad \dfrac{z^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu+3}}{\delta+nr} + \dfrac{enrz^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu+2}}{\delta+nq \times \delta+nr} +$

$\dfrac{e^2n^2qrz^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu+1}}{\delta+np \times \delta+nq \times \delta+nr} + \dfrac{e^3n^3pqr}{\delta+np \times \delta+nq \times \delta+nr}$ A.

2. $\quad \dfrac{z^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu+2}}{\delta+nq} + \dfrac{enqz^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu+1}}{\delta+np \times \delta+nq} +$

$\dfrac{e^2n^2pq}{\delta+np \times \delta+nq}$ A.

1. $\quad \dfrac{z^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu+1}}{\delta+np} + \dfrac{enp}{\delta+np}$ A.

0. $\quad$ A.

$-1.$ $\quad -\dfrac{z^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu}}{en\mu} + \dfrac{\delta+n\mu}{en\mu}$ A.

$-2.$ $\quad -\dfrac{z^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu-1}}{enb} - \dfrac{\delta+nb \times z^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu}}{e^2n^2b\mu} +$

$\dfrac{\delta+n\mu \times \delta+nb}{e^2n^2b\mu}$ A.

$-3.$ $\quad -\dfrac{z^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu-2}}{enk} - \dfrac{\delta+nk \times z^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu-1}}{e^2n^2bk} -$

&c. $\quad \dfrac{\delta+nb \times \delta+nk \times z^\delta \times \overline{e+fz^n}^{\mu}}{e^3n^3bk\mu} + \dfrac{\delta+n\mu \times \delta+nb \times \delta+nk}{e^3n^3bk\mu}$ A.

LEMME X.

87. *ETANT données les intégrales des deux différentielles* $z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^{n}+gz^{2n}}^{\mu}$, $z^{\delta+n-1}dz \times \overline{e+fz^{n}+gz^{2n}}^{\mu}$, *trouver l'intégrale de la différentielle* $z^{\delta-1}dz \times \overline{e+fz^{n}+gz^{2n}}^{\mu+\tau}$, τ *marquant un nombre entier positif ou négatif, ou de cette autre* $z^{\delta+n-1}dz \times \overline{e+fz^{n}+gz^{2n}}^{\mu+\tau}$.

PREMIER CAS.

Lorsque τ *est un nombre entier négatif.*

POUR abréger mettant R au lieu de $e+fz^{n}+gz^{2n}$, on multipliera chacune des différentielles données $z^{\delta-1}dz \times R^{\mu}$, $z^{\delta+n-1}dz \times R^{\mu}$, par une quantité indéterminée H & K, & on les réduira à cette forme $\overline{eHz^{\delta-1}dz+fHz^{\delta+n-1}dz+gHz^{\delta+2n-1}dz} \times R^{\mu-1}$, & $\overline{eKz^{\delta+n-1}dz+fKz^{\delta+2n-1}dz+gKz^{\delta+3n-1}dz} \times R^{\mu-1}$; leurs intégrales seront supposées égales à $H \times A$, & $K \times B$, ensuite on prendra les différences des quantités $Mz^{\delta} \times R^{\mu}$, $Nz^{\delta+n} \times R^{\mu}$, lesquelles on ajoûtera aux différentielles précédentes, & la somme sera

$$\left.\begin{array}{l} eH + fH\,z^{n} + gH\,z^{2n} \\ \quad + eK\,z^{n} + fK\,z^{2n} + gK\,z^{3n} \\ \delta eM + \delta fM\,z^{n} + \delta gM\,z^{2n} \\ \quad + n\mu fM\,z^{n} + 2n\mu gM\,z^{2n} \\ \quad + \delta eN\,z^{n} + \delta fN\,z^{2n} + \delta gN\,z^{3n} \\ \quad + enN\,z^{n} + nfN\,z^{2n} + ngN\,z^{3n} \\ \quad + n\mu fN\,z^{2n} + 2n\mu gN\,z^{3n} \end{array}\right\} \times R^{\mu+1} z^{\delta-1} dz$$

& l'intégrale de cette ſomme eſt $H \times A + K \times B + Mz^{\delta} R^{\mu} + Nz^{\delta+n} R^{\mu}$, maintenant pour trouver l'intégrale de $z^{\delta-1} dz \times R^{\mu-1}$, on égalera à zero tous les termes de la ſomme ci-deſſus excepté le premier, ce qui donnera les trois équations ſuivantes:

1. $fH + eK + \delta fM + n\mu fM + \delta eN + enN = 0.$
2. $gH + fK + \delta gM + 2n\mu gM + \delta fN + nfN + n\mu fN = 0.$
3. $gK + \delta gN + ngN + 2n\mu gN = 0.$

De la troiſiéme équation on tire $N = \frac{-K}{\delta + n + 2n\mu}$, de la ſeconde en y mettant la valeur de N, on trouve $H = -\frac{n\mu fK}{g \times \delta + n + 2n\mu} - \delta M - 2n\mu M$, de la premiére en y ſubſtituant les valeurs de N, H, on déduit $M = \frac{2eg - ff \times K}{fg \times \delta + n + 2n\mu}$, qu'on mette cette valeur de M dans celle de H, & on aura $H = \frac{\delta ff - 2\delta eg - 4egn\mu + n\mu ff \times K}{fg \times \delta + n + 2n\mu}$; delà on tire la valeur du premier terme qu'on cherche, ſçavoir, $eH + \delta eM = \frac{en\mu ff - 4ee n\mu g \times K}{fg \times \delta + n + 2n\mu}$, on peut ſuppoſer K

égale à l'unité ou à telle autre grandeur qu'on voudra : donc si on met toutes ces valeurs dans l'intégrale ci-dessus, on aura l'intégrale cherchée, nous y laisserons les lettres pour abréger l'expression, ainsi $\int z^{\delta-1} \times R^{\mu-1} = \frac{H \times A + K \times B + M z^{\delta} R^{n} + N z^{\delta+n} R^{n}}{eH + \delta eM} = C.$

Pour avoir l'intégrale de $z^{\delta+n-1} dz \times R^{\mu-1}$, il faut égaler à zero le premier terme, le troisiéme & quatriéme, & on aura

1. $eH + \delta eM = 0.$
2. $gH + fK + \delta gM + 2n\mu gM + \delta fN + nfN + n\mu fN = 0.$
3. $gK + \delta gN + ngN + 2n\mu gN = 0.$

De la troisiéme on tire encore $N = \frac{-K}{\delta + n + 2n\mu}$, & des deux autres $M = \frac{-fK}{2g \times \delta + n + 2n\mu}$, $H = \frac{\delta fK}{2g \times \delta + n + 2n\mu}$, d'où l'on déduira la valeur du second terme, qui sera $fH + eK + \delta fM + n\mu fM + \delta eN + enN = \frac{4egn\mu - n\mu ff \times K}{2g \times \delta + n + 2n\mu}$ que nous nommerons L, on déterminera l'indéterminée K comme on jugera à propos, on aura donc par le moyen de ces valeurs $\int z^{\delta+n-1} dz \times R^{\mu-1} = \frac{H \times A + K \times B + M z^{\delta} R^{n} + N z^{\delta+n} R^{n}}{L} = D.$

Par le moyen des deux intégrales C & D, on trouvera celles des deux différentielles $z^{\delta-1} dz \times R^{\mu-2}$, $z^{\delta+n-1} dz \times R^{\mu-2}$, le calcul ne différeroit de ce-

lui qu'on vient de faire qu'en ce qu'il faudroit ici se servir des quantités $Mz^{\delta} R^{\mu-1}$, $Nz^{\delta+n} R^{\mu-1}$, & substituer partout $\mu - 1$ au lieu de μ, & C, D, au lieu de A, B, pareillement si on nommoit E & F les intégrales de $z^{\delta-1} dz \times R^{\mu-1}$, & $z^{\delta+n-1} dz \times R^{\mu-1}$, & qu'on voulût avoir celles de $z^{\delta-1} dz \times R^{\mu-2}$, $z^{\delta+n-1} dz \times R^{\mu-2}$, il faudroit se servir des quantités $Mz^{\delta} R^{\mu-2}$, $Nz^{\delta+n} R^{\mu-2}$, & substituer dans le calcul ci-dessus E, F, au lieu de A, B, & $\mu - 2$ au lieu de μ; & ainsi on pourra continuer les intégrales tant qu'on juge à propos.

On voit que par le moyen de la somme des différentielles données ci-dessus, on trouveroit aussi les intégrales de $z^{\delta+2n-1} dz \times R^{\mu-1}$, $z^{\delta+3n-1} dz \times R^{\mu-1}$, & ensuite de $z^{\delta+2n-1} dz \times R^{\mu-2}$, $z^{\delta+3n-1} dz \times R^{\mu-2}$, &c. par un calcul semblable à celui qu'on vient d'exposer.

SECOND CAS.

Lorsque τ *est un nombre entier positif.*

POUR trouver les intégrales de $z^{\delta-1} dz \times R^{\mu+1}$, $z^{\delta+n-1} dz \times R^{\mu+1}$, on multipliera les deux différentielles $z^{\delta-1} dz \times R^{\mu}$, $z^{\delta+n-1} dz \times R^{\mu}$, par RR, ou $e + fz^{n} + gz^{2n} \times R$, & chacune par une quantité indéterminée H & K, & on les ajoutera aux différences des quantités $Mz^{\delta} \times R^{\mu+2}$, $Nz^{\delta+n} \times R^{\mu+1}$, ce qui donnera, en supposant $\mu + 2 = \lambda$

$$\left.\begin{array}{l} eH + fH\,z'' + gH\,z'' \\ \quad + eK\,z'' + fK\,z'' + gK z'' \\ \delta eM + \delta fM\,z'' + \delta gM\,z'' \\ \quad + \lambda n fM\,z'' + 2n\lambda gM\,z'' \\ \quad + \delta eN\,z'' + \delta fN\,z'' + \delta gN\,z'' \\ \quad + enN\,z'' + nfN\,z'' + ngN\,z'' \\ \quad\quad + n\lambda fN + 2n\lambda gN \end{array}\right\} \times R^{\mu+1} z^{\delta-1} dz$$

& en ajoutant enſemble les intégrales, la ſomme ſera $H \times A \times RR + K \times B \times RR + Mz^{\delta} \times R^{\mu+2} + Nz^{\delta+n} \times R^{\mu+2}$.

Mais puiſque cette ſomme de différentielles ſe trouve la même que celle qu'on avoit dans le premier cas, excepté qu'il y a ici $\mu + 2$ ou le premier cas avoit μ, il n'y aura d'autre changement à faire dans les valeurs de H, M, N, que de mettre $\mu + 2$ à la place de μ, ce qui étant ſuppoſé on aura

$$\int z^{\delta-1} dz \times R^{\mu+1} = \frac{H \times A \times RR + K \times B \times RR + Mz^{\delta} \times R^{\mu+2} + Nz^{\delta+n} \times R^{\mu+2}}{eH + \delta eM}$$

$$\int z^{\delta+n-1} dz \times R^{\mu+1} = \frac{H \times A \times RR + K \times B \times RR + Mz^{\delta} \times R^{\mu+2} + Nz^{\delta+n} \times R^{\mu+2}}{L}$$

De la même maniére qu'on a trouvé ces deux intégrales, on trouvera auſſi par leur moyen celles de $z^{\delta-1} dz \times R^{\mu+2}$, $z^{\delta+n-1} dz \times R^{\mu+2}$, & ainſi de ſuite. Nous ne mettrons point une table de ces ſortes d'intégrales, comme on a fait dans les trois Lemmes précédens, parce que les formules en ſeroient trop compliquées.

PROBLEME

PROBLÈME V.

88. *TROUVER l'intégrale de la différentielle* $z^{\theta n-1} dz \times \overline{e + fz^n}^{\frac{1}{\pi}}$: *on ſuppoſe que* θ *eſt un nombre entier poſitif ou négatif, &* π *un nombre quelconque entier ou rompu, poſitif ou négatif.*

Il faut ſuppoſer $e + fz^n = x^n$, & l'on déduira $\overline{e + fz^n}^{\frac{1}{\pi}} = x^{\frac{1}{\pi}n}$, $z^n = \frac{x^n - e}{f}$, $z^{\theta n} = \overline{\frac{x^n - e}{f}}^{\theta}$, $z^{\theta n-1} dz = \frac{x^{n-1} dx}{f^\theta} \times \overline{x^n - e}^{\theta-1}$, ce qui donne $z^{\theta n-1} dz \times \overline{e+fz^n}^{\frac{1}{\pi}} = \frac{x^{n+\frac{1}{\pi}n-1} dx}{f^\theta} \times \overline{x^n - e}^{\theta-1}$: d'où il eſt clair que ſi θ eſt égal à un des nombres de cette ſuite 1, 2, 3, 4, &c. on trouvera exactement l'intégrale demandée ; mais ſi θ marque un des nombres de cette autre ſuite, 0, — 1, — 2, — 3, — 4, alors l'intégrale dépendra des ſections coniques, & on la trouvera par les régles déja données : car ſi $\theta = 0$, la propoſée eſt égale à celle-ci $\frac{x^{n+\frac{1}{\pi}n-1} dx}{x^n - e}$, dont l'intégrale ſe trouve par l'art. 81 ; & ſi θ eſt égal à — 1, — 2, &c. la propoſée ſera égale à $\frac{fx^{n+\frac{1}{\pi}n-1} dx}{x^n - e^2}$, ou $\frac{ffx^{n+\frac{1}{\pi}n-1} dx}{\overline{x^n - e}^3}$, ou &c. dont les intégrales ſe

trouvent par l'art. 81, & les formules de l'art. 86. On trouvera plus promptement ces intégrales par les tables qu'on auroit conſtruit par l'art. 81, telles que celles de M. SMITH. Pour faciliter davantage les régles d'où dépendent la recherche de ces intégrales, on apportera ici deux ou trois exemples.

I. Soit propoſé de trouver l'intégrale de cette différentielle $Dz^{2n-1}dz\sqrt{e+fz^n}$: dans ce cas on a $\theta = 2$, & $\pi = 2$, $\sqrt{e+fz^n} = x^{\frac{n}{2}}$, & la propoſée égale à celle-ci $\frac{Dx^{\frac{3}{2}n-1}dx}{ff} \times \sqrt{x^n - e}$, ou $\frac{Dx^{\frac{3}{2}n-1}dx}{ff} - \frac{Dex^{\frac{3}{2}n-1}dx}{ff}$, on en aura donc une intégrale exacte qui eſt $\frac{2Dx^{\frac{1}{2}n}}{5nff} - \frac{2Dx^{\frac{1}{2}n}}{3nff} = \frac{6Dx^{2n} - 10Dx^n}{15nff} x^{\frac{n}{2}}$, laquelle, ſi on y ſubſtitue les valeurs de $x^{\frac{n}{2}}$, x^n, x^{2n}, ſe change en $\frac{-4ee + 2efz^n + 6ffz^{2n}}{15nff} D\sqrt{e+fz^n}$.

II. Si on demandoit l'intégrale de $\frac{Dz^{-1}dz}{\sqrt[3]{e+fz^n}}$, l'on auroit $\theta = 0$, $\pi = -3$, $\sqrt[3]{e+fz^n} = x^{\frac{1}{3}n}$, & $\frac{Dz^{-1}dz}{\sqrt[3]{e+fz^n}} = \frac{Dx^{\frac{2}{3}n-1}dz}{x^n - e}$; pour en trouver l'intégrale, on aura recours à la quatriéme forme des tables, dans laquelle on ſubſtituera $-e$ à la place de e, & 1 à la

place de f, & prenant le second cas à cause de $x^n - e$, on trouve $OP . OA :: \sqrt[3]{e + fz^n} . \sqrt[3]{e}$, & l'intégrale demandée $- \frac{D}{n}\sqrt[3]{\frac{1}{e}} \times - 1 \left\{\frac{AP}{AO}\right\} + \beta\left\{\frac{CP}{CO}\right\} + \psi(PCO)$.

III. Soit maintenant proposée la différentielle $\frac{Dz^{-3n-1}dz}{\sqrt[3]{e + fz^n}}$, qui par ce Problême est égale à cette autre $\frac{Df^3 x^{\frac{2}{3}n-1}dx}{\sqrt{x^n - e^4}}$; pour en avoir l'intégrale on la rapportera à la table de l'art. 86, dans laquelle on voit qu'on aura $A = \int \frac{x^{\frac{2}{3}n-1}dx}{x^n - e}$ qui est connue par l'exemple précédent, & $\mu = -1$, $\tau = -3$, $\delta = \frac{2}{3}n$, $f = 1$, $e = -e$, $b = -2$, $k = -3$, & prenant l'intégrale par la formule qui répond à $\tau = -3$, on la trouve égale à $- \frac{Df^3 x^{\frac{2}{3}n}}{3ne \times \sqrt{x^n - e^3}} + \frac{7Df^3 x^{\frac{2}{3}n}}{18ne^2 \times \sqrt{x^n - e^2}} - \frac{14Df^3 x^{\frac{2}{3}n}}{27ne^3 \times \sqrt{x^n - e}} - \frac{14Df^3}{81e^3} A$; mais puisque $e + fz^n = x^n$, $\sqrt{e + fz^n}^{\frac{2}{3}} = x^{\frac{2n}{3}}$ $x^n - e = fz^n$, en remettant ces valeurs, l'intégrale cherchée est $\frac{-18ee + 21efz^n - 28ffz^{2n}}{54ne^3 z^{3n}} \times D \times \sqrt{e + fz^n}^{\frac{1}{3}} - \frac{14Df^3}{81e^3} A$.

Delà on voit qu'on pourroit construire des tables

fort étendues de ces ſortes de différentielles & de leurs intégrales.

COROLLAIRE.

89. SI la différentielle propoſée dans le Problême étoit multipliée ou diviſée par une autre quantité telle que $g + bz^n$, on en trouveroit encore l'intégrale : pour la multiplication il n'y peut avoir aucune difficulté, car $z^{\theta n - 1} dz \times \overline{g + bz^n} \times \overline{e + fx^n}^{\frac{1}{\pi}} = \overline{gz^{\theta n - 1} dz + bz^{\theta n + n - 1} dz} \times \overline{e + fz^n}^{\frac{1}{\pi}}$, or cette différentielle a la même forme que celle du Problême, donc on trouvera l'intégrale de la maniére qu'on y a enſeigné. Si la propoſée étoit $\frac{z^{\theta n - 1} dz \times \overline{e + fz^n}^{\frac{1}{\pi}}}{g + bz^n}$, puiſque par la ſuppoſition du Problême on a $z^n = \frac{x^n - e}{f}$, on aura $g + bz^n = \frac{fg - eb + bx^n}{f} = \frac{p + bx^n}{f}$ en mettant p pour $fg - eb$, ce qui donne $\frac{z^{\theta n - 1} dz \times e + fz^n \overline{\frac{1}{\pi}}}{g + bz^n} = \frac{x^{n + \frac{1}{\pi} n - 1} dx}{f^{\theta - 1} \times \overline{p + bx^n}^{\theta - 1} \times x^n - e}$: ainſi ſi on ſe propoſe de chercher l'intégrale de la différentielle $\frac{Dz^{-n-1} dz}{g + bz^n \sqrt[3]{e + fz^n}}$, on la changera en cette autre $\frac{Dffx^{\frac{2}{3}n - 1} dx}{p + bx^n \times \overline{x^n - e}^{\frac{2}{3}}}$: or par l'art.

ticle 68. on a $\frac{1}{p+hx^n \times \overline{x^n-e}^2} = \frac{hh}{ffgg \times p+hx^n} + \frac{fg+eh-hx^n}{ffgg \times \overline{x^n-e}^2}$, donc $\frac{Dffx^{\frac{2}{3}n-1}dx}{p+hx^n \times \overline{x^n-e}^2} = \frac{Dhhx^{\frac{2}{3}n-1}dx}{gg \times p+hx^n}$ $+ \frac{\overline{fg+eh} \times Dx^{\frac{2}{3}n-1}dx}{gg \times \overline{x^n-e}^2} - \frac{Dhx^{\frac{5}{3}n-1}dx}{gg \times \overline{x^n-e}^2}$, & ſi on ſe ſert des premiéres tables de M. SMITH, on trouvera par la quatriéme forme $\int \frac{Dhhx^{\frac{2}{3}n-1}dx}{gg \times p+hx^n} = \frac{Dh\sqrt{-h}}{ngg\sqrt{p}} \times -\beta\left\{\frac{BP}{BO}\right\} - 1\left\{\frac{DP}{DO}\right\} + \downarrow (PBO)$; & ſi on nomme A l'intégrale de $\frac{x^{\frac{2}{3}n-1}dx}{x^n-e}$ qu'on trouve par le ſecond cas de la même forme, on aura par l'art. 86. $\int \frac{\overline{fg+eh} \times Dx^{\frac{2}{3}n-1}dx}{gg \times \overline{x^n-e}^2} = -\frac{\overline{fg+eh} \times Dx^{\frac{2}{3}n}}{negg \times \overline{x^n-e}} - \frac{\overline{fg+eh} \times D}{3egg}A$: pareillement puiſque par la table de l'article 83, ou par la quatriéme forme on trouve $\int \frac{x^{\frac{5}{3}n-1}dx}{x^n-e} = \frac{3x^{\frac{2}{3}n}}{2n} + e \times A$, on aura $-\int \frac{Dhx^{\frac{5}{3}n-1}dx}{gg \times \overline{x^n-e}^2}$ $= \frac{Dhx^{\frac{5}{3}n}}{negg \times \overline{x^n-e}} - \frac{Dhx^{\frac{2}{3}n}}{negg} - \frac{2Dh}{3gg}A$; en prenant la ſomme de ces intégrales, & y ſubſtituant au lieu de $x^{\frac{2}{3}n}$, $x^{\frac{5}{3}n}$, x^n-e, leurs valeurs $\overline{e+fz^n}^{\frac{2}{3}}$, $\overline{e+fz^n}^{\frac{5}{3}}$, fz^n, on trouve en mettant Q pour l'intégrale de

$\frac{x^{\frac{2}{3}n-1}dx}{p+bx^n}$, $-\frac{Dx\sqrt[3]{e+fz^n}}{ngz^n}+\frac{Dhh}{gg}Q-\frac{fg+3eh\times D}{3egg}A$

pour l'intégrale de $\frac{Dz^{-n-1}dz}{g+hz^n\sqrt[3]{e+fz^n}}$. On pourroit encore par un calcul ſemblable trouver les intégrales de ces autres différentielles $\frac{z^{\theta n-1}dz\times\sqrt[\pi]{e+fz^n}}{g+hz^2}$;

$\frac{z^{\theta n-1}dz\times\sqrt[\pi]{e+fz^n}}{g+hz^n}$, &c.

PROBLÊME VI.

90. *TROUVER l'intégrale de la différentielle* $Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz\times\sqrt[\pi]{e+fz^n}$ *ou de cette autre* $Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz\times\sqrt[\pi]{e+fz^n}$, θ *marquant un nombre entier poſitif ou négatif*, & $\frac{\delta}{\lambda}$, $\frac{1}{\pi}$, *des fractions.*

On ſuppoſera $\frac{e+fz^n}{z^n}=x^n$, ce qui donnera $z^n=\frac{e}{x^n-f}$, $e+fz^n=\frac{ex^n}{x^n-f}$, $z^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz=-\frac{e^{\frac{\delta}{\lambda}}x^{n-1}dx}{x^n-f^{\frac{\delta}{\lambda}+1}}$, d'où l'on tire $Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz\times\sqrt[\pi]{e+fz^n}=-\frac{e^{\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{\pi}}Dx^{n+\frac{1}{\pi}n-1}dx}{x^n-f^{\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{\pi}+1}}$, & $Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz\times\sqrt[\pi]{e+fz^n}$

$= -\frac{e^{\theta+\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{\pi}} Dx^{n+\frac{r}{s}n-1}dx}{\overline{x^n-f}^{\theta+\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{\pi}+1}}$; d'où il eſt clair que ſi $\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{\pi}$ eſt égal à un nombre entier poſitif ou négatif, on trouvera toujours l'intégrale demandée, ou exactement lorſque $\theta+\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{\pi}$ eſt égal à un nombre de cette ſuite $-1, -2, -3, -4$, &c. ou par les logarithmes & arcs de cercle lorſque $\theta+\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{\pi}$ marque un nombre de cette autre ſuite, 0, 1, 2, 3, &c.

Par exemple qu'on veuille avoir l'intégrale de la différentielle $\frac{Dz^{\frac{1}{4}n-1}dz}{\sqrt[4]{e+fz^n}}$; dans ce cas on a $\frac{\delta}{\lambda}=\frac{1}{4}$, $\theta=0$, $\pi=-4$, $\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{\pi}=0$, & la propoſée égale à cette autre $\frac{Dx^{\frac{3}{4}n-1}dx}{x^n-f}$, dont on trouvera facilement l'intégrale par les régles qu'on a donné ci-devant, ou par le ſecond Cas de la ſixiéme forme des tables de M. SMITH.

COROLLAIRE

91. EN ſuivant la même méthode & employant le ſecours de l'art. 86. on trouvera les intégrales des différentielles $Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\frac{1}{\pi}+1}$,

$Dz^{\theta n+\frac{\theta}{\pi}n-1}dz \times \overline{e+fz^n}^{\frac{1}{\pi}+2}$, &c. Et si la proposée étoit multipliée ou divisée par une autre quantité telle que $g+hz^n$, on en trouveroit l'intégrale de la maniére qu'on a enseigné dans le Corollaire du Problême précédent.

PROBLÊME VII.

92. *TROUVER l'intégrale de la différentielle* $Dz^{\theta n-1}dz \times \overline{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}^{\frac{1}{\pi}}$, *θ étant un nombre entier positif ou négatif, & $\frac{1}{\pi}$ une fraction quelconque.*

On suppose $\frac{e+fz^n}{g+hz^n}=x^n$, d'où l'on tirera $z^n=\frac{e-gx^n}{hx^n-f}$, & $z^{\theta n-1}dz=\frac{\overline{fg-eh}\times x^{n-1}dx\times\overline{e-gx^n}^{\theta-1}}{\overline{hx^n-f}^{\theta+1}}$;

& par conséquent $Dz^{\theta n-1}dz \times \overline{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}^{\frac{1}{\pi}} = \frac{\overline{fg-eh}\times Dx^{n+\frac{1}{\pi}n-1}dx\times\overline{e-gx^n}^{\theta-1}}{\overline{hx^n-f}^{\theta+1}}$; ainsi la proposée est réduite à la forme qu'éxigent les principes déja posés. Qu'on demande, par exemple, l'intégrale de la différentielle $Dz^{-1}dz\sqrt[4]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}$, on aura $\theta=0$, $\pi=4$, & la donnée égale à $\frac{\overline{fg-eg}\times Dz^{n+\frac{1}{4}n-1}dz}{\overline{hx^n-f}\times\overline{e-gx^n}}$;

on

on décomposera (par l'art. 59.) cette différentielle en ces deux autres $-\frac{bDx^{n}+\frac{1}{4}n-1dx}{bx^{n}-f}-\frac{gDx^{n}+\frac{1}{4}n-1dx}{e-gx^{n}}$; or on trouvera facilement les intégrales de ces deux différentielles par les art. 74 & 81, ou bien par la cinquiéme forme des tables, & la somme sera la requise.

Si outre cela la différentielle $Dz^{\frac{1}{n}-1}dz\times\overline{\frac{e+fz^{n}}{g+bz^{n}}}\Big|^{\frac{1}{\pi}}$ étoit multipliée par une quantité telle que $\overline{k+lz^{n}}^{\mu}$, l'exposant μ étant un nombre entier positif ou négatif, puisque $z^{n}=\frac{e-gx^{n}}{bx^{n}-f}$, on auroit $k+lz^{n}=\frac{el-fk+hkx^{n}-glx^{n}}{bx^{n}-f}$, & en supposant $el-fk=p$, $bk-gl=q$, $\overline{k+lz^{n}}^{\mu}=\frac{\overline{p+qx^{n}}^{\mu}}{\overline{bx+f^{n}}^{\mu}}$, ce qui donne $Dz^{\frac{1}{n}-1}dz\times\overline{k+lz^{n}}^{\mu}\times\overline{\frac{e+fz^{n}}{g+bz^{n}}}\Big|^{\frac{1}{\pi}}=\frac{\overline{fg-eh}\times Dx^{\frac{1}{n}-1}dx\times\overline{e-gx^{n}}^{\frac{1}{n}-1}\times\overline{p+qx^{n}}^{\mu}}{\overline{bx^{n}-f}^{\frac{1}{n}+\mu+1}}$, donc la proposée par cette réduction se trouve comprise dans l'étendue de la théorie précédente, & par conséquent assujettie à ses calculs.

Des différentielles trinomes.

PROBLÊME VIII.

93. *TROUVER l'intégrale de la différentielle* $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$, *θ étant un nombre entier positif ou négatif.*

On a trouvé (art. 39.) en supposant $z^n = x^{\frac{n}{2}} - \frac{\frac{1}{2}f}{g}$, $\frac{Dz^{n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}} = \frac{D}{2} \times \frac{x^{\frac{n}{2}-1}dx}{\frac{eg-\frac{1}{4}ff}{g} + gx^n}$ dont on y a aussi déterminé l'intégrale ; on la trouveroit très-facilement par la seconde forme des tables, car en y substituant, $\frac{eg-\frac{1}{4}ff}{g}$, g, au lieu de, e, f, on auroit $\frac{D}{2n}\sqrt{\frac{1}{eg-\frac{1}{4}ff}} \times \downarrow$ (PBO) pour son intégrale lorsque $\frac{1}{4}ff$ est moindre que eg, OP étant à OA, comme $\frac{1}{2}f + gz^n$ à $\sqrt{eg-\frac{1}{4}ff}$; & $-\frac{D}{2n}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ff-eg}} \times 1 \left\{\frac{CP}{AP}\right\}$ lorsque $\frac{1}{4}ff$ est plus grand que eg, OP étant à OA, comme $\frac{1}{2}f + gz^n$ à $\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}$. Ensuite si $\theta = 2$, on aura $\frac{Dz^{2n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}} = \frac{D}{2} \times \frac{x^{n-1}dx}{\frac{eg-\frac{1}{4}ff}{g} + gx^n} - \frac{\frac{1}{2}fD}{2g}$

$\times \frac{x^{\frac{n}{2}-1}dx}{\frac{eg-\frac{1}{4}ff}{g}+gx^n}$, mais par la premiére forme on

a $\int \frac{D}{2} \times \frac{x^{n-1}dx}{\frac{eg-\frac{1}{4}ff}{g}+gx^n} = \frac{D}{2ng}\left\{\frac{BP}{BO}\right\}$, OP étant à OA comme x^n à $\frac{eg-\frac{1}{4}ff}{gg}$, ou comme $\frac{\frac{1}{2}f}{g}+z^n$ à $\frac{eg-\frac{1}{4}ff}{gg}$, donc $\frac{D}{2ng}\left\{\frac{BP}{BO}\right\} = \frac{D}{2ng}\left\{\frac{g\times\overline{e+fz^n+gz^{2n}}}{eg-\frac{1}{4}ff}\right\}$ ou plûtôt $= \frac{D}{2ng}\left\{\frac{e+fz^n+gz^{2n}}{e}\right\}$ dans la ſuppoſition que cette intégrale s'évanouit lorſque $z^n = 0$; l'intégrale de $\frac{\frac{1}{2}fD}{2g} \times \frac{x^{\frac{n}{2}-1}dx}{\frac{eg-\frac{1}{4}ff}{g}+gx^n}$ ſe trouve comme ci-devant. Pour trouver l'intégrale de la propoſée lorſque θ eſt un nombre poſitif plus grand que 2, on diviſera le numérateur par le dénominateur en prenant z^{2n} pour premier terme du diviſeur, & on continuera la diviſion juſqu'à ce qu'on ait réduit l'expoſant de z à $2n-1$, ce qui étant fait on prendra l'intégrale de chaque terme, & la ſomme ſera l'intégrale cherchée: on trouveroit encore facilement ces intégrales par la table qu'on a donnée dans l'article 84.

Maintenant ſi θ eſt égal à 0, ou à un nombre négatif, on ſuppoſera $z^n = \frac{1}{y^n}$, ce qui donnera

$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}} = -\frac{Dv^{2n-\theta n-1}dv}{g+fv^n+ev^{2n}}$, or l'expoſant $2n-\theta n-1$ eſt néceſſairement poſitif, & par conſéquent la propoſée ſe rapporte au cas précédent. On trouvera auſſi ces intégrales très-commodément de la maniére ſuivante : on cherchera premiérement l'intégrale de $\frac{Dz^{-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$, ce qui ſe fait en multipliant le numérateur & le dénominateur de cette différentielle par z^{-2n}, ce qui donnera $\frac{Dz^{-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}} = \frac{Dz^{-2n-1}dz}{g+fz^{-n}+ez^{-2n}}$; or cette différentielle a la même forme que cette autre $\frac{Dz^{2n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ qu'on a conſidéré dans le premier cas, toute la différence eſt que l'expoſant de poſitif eſt changé en négatif, l'intégrale donc dans ce cas ſera ſemblable à celle du cas précédent, on aura donc $\int\frac{Dz^{-2n-1}dz}{g+fz^{-n}+ez^{-2n}} = -\frac{D}{2ne}\left\{\frac{g+fz^{-n}+ez^{-2n}}{g}\right\}+\frac{Df}{2ne}A$, OP étant à OA, comme $\frac{1}{2}f+ez^{-n}$ à $\sqrt{eg-\frac{1}{4}ff}$ ou $\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}$; & $A = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{eg-\frac{1}{4}ff}}\times\Phi(PBO)$, ou $= -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ff-eg}}\left\{\frac{CP}{AP}\right\}$. Par la même raiſon ſi on ſuppoſe $\int\frac{Dz^{n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}} = \frac{D}{n}B$, on aura $\int\frac{Dz^{n-1}dz}{g+fz^{-n}+ez^{-2n}} = -\frac{D}{n}A$; qu'on

multiplie par z^{-2n} le numérateur & le dénominateur de la différentielle $\frac{Dz^{n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ & on aura $\frac{Dz^{-n-1}dz}{g+fz^{-n}+ez^{-2n}}$ dont l'intégrale demeure égale à $\frac{D}{n}B$, par conséquent $\frac{D}{n}B = -\frac{D}{n}A$, & $A = -B$, d'où l'on déduit $\int\frac{Dz^{n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}} = -\frac{D}{2ne}\left\{\frac{g+fz^{-n}+ez^{-2n}}{g}\right\} - \frac{Df}{2ne}B = -\frac{D}{2ne}\left\{\frac{e+fz^n+gz^{2n}}{gz^{2n}}\right\} - \frac{Df}{2ne}B$, OP étant à OA, comme $\frac{1}{2}f+gz^n$ à $\sqrt{eg-\frac{1}{4}ff}$ ou $\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}$, de même que dans le premier cas.

On trouvera par la même méthode les intégrales des autres différentielles lorsque θ est un nombre négatif : où si l'on aime mieux, on les trouvera par la division faite comme dans le premier cas mais en prenant ici e pour premier terme du diviseur. De cette maniére on pourroit construire une table de ces sortes d'intégrales telle que la forme 29me. de M. SMITH, & qui seroit d'un grand avantage pour la construction de plusieurs autres, comme on verra ci-après.

COROLLAIRE.

94. ON peut rapporter à ce Problême la différen-

tielle $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\overline{e+fz^n+gz^{2n}}^{\theta}\times\overline{k+lz^n}^{\theta}}$; car ſuppoſant $k+lz^n = x^n$, on déduit $z^n = \frac{x^n-k}{l}$, $z^{\theta n-1}dz = \frac{x^{n-1}dx}{l^{\theta}}\times\overline{x^n-k}^{\theta-1}$, $e+fz^n+gz^{2n} = \frac{ell-fkl+gkk+flx^n-2gkx^n+gx^{2n}}{ll}$, donc

$$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\overline{e+fz^n+gz^{2n}}^{\theta}\times\overline{k+lz^n}^{\theta}} = \frac{Dl^{\theta-1}x^{n-1}dx\times\overline{x^n-k}^{\theta-1}}{\overline{ell-fkl+gkk+flx^n-2gkx^n+gx^{2n}}^{\theta}};$$

par conſéquent ſi θ eſt un nombre entier poſitif, cette différentielle ſera ſemblable à celle propoſée dans le Lemme précédent, ainſi mettant, $ell-fkl+gkk$, $fl-2gk$, au lieu de, e, f, on aura ici OP. OA :: $\frac{1}{2}fl-gk+gx^n . \sqrt{\frac{1}{4}fl-gk^2-egll+fgkl+ggkk}$ :: $\frac{1}{2}f+gz^n . \sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}$, & OP . OA :: $\frac{1}{2}f+gz^n : \sqrt{eg-\frac{1}{4}ff}$, en remettant $k\mp lz^n$ au lieu de x^n; & les intégrales ſe tirent de la forme 29. Qu'on demande l'intégrale de $\frac{Dz^{n-1}dz}{\overline{e+fz^n+gz^{2n}}^{\theta}\times\overline{k+lz^n}^{\theta}}$, on aura $\theta = 1$, & ſuppoſant $t = ell-fkl+gkk$, la propoſée ſe changera en cette autre $\frac{Dlx^{-1}dx}{t+flx^n-2gkx^n+gx^{2n}}$ dont l'intégrale ſe trouve égale à $-\frac{Dl}{2nt}\left\{\frac{t+flx^n-2gkx^n+gx^{2n}}{gx^{2n}}\right\}$ $-\frac{Dfl-2Dgk}{2nt}$ ① $= -\frac{Dl}{2nt}\left\{\frac{ll\times\overline{e+fz^n+gz^{2n}}}{g\times\overline{k+lz^n}^2}\right\}-$

$\frac{Dfl - 2Dgk}{2nt}$ ①, on ne doit mettre $\frac{ll \times \overline{e + fz^n + gz^{2n}}}{g \times \overline{k + lz^n}^2}$ que dans la ſuppoſition que l'intégrale devient nulle lorſque $x^n = \infty$, ou $\frac{1}{x^n} = 0$; mais ſi on veut que l'intégrale s'évanouiſſe lorſque $z^n = 0$, on voit qu'il faudroit mettre $\frac{kk \times \overline{e + fz^n + gz^{2n}}}{e \times \overline{k + lz^n}^2}$.

Si θ eſt égal à 0, ou à un nombre entier négatif, il n'y a qu'à ſuppoſer $k + lz^n = \frac{1}{x^n}$, & on trouvera

$$\frac{Dz^{\theta n - 1} dz}{\overline{e + fz^n + gz^{2n}} \times \overline{k + lz^n}} = - \frac{Dlx^{2n-1} dx \times \overline{\frac{1}{lx^n} - \frac{k}{l}}\Big|^{\theta - 1}}{g + flx^n - 2gkx^n + tx^{2n}};$$

or cette différentielle ſe rapporte à ce dernier Problême ; donc &c.

On pourroit encore trouver l'intégrale de la différentielle $\frac{Dz^{\theta n - 1} dz}{\overline{e + fz^n + gz^{2n}} \times \overline{k + lz^n}}$ en la réduiſant en deux autres par l'article 64, qui auroit par là une forme plus ſimple.

REMARQUE.

IL paroît par ce qui a été dit qu'il n'eſt pas difficile de trouver l'intégrale d'une différentielle trinome telle que $\frac{Dz^{\theta n - 1} dz}{\overline{e + fz^n + gz^{2n}}}$, θ étant un nombre entier, parce qu'on peut la réduire en une autre qui n'eſt que binome ; mais lorſque la propoſée eſt de cette

nature $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$, $\frac{\delta}{\lambda}$ étant une fraction moindre que l'unité, alors on ne voit pas si facilement de quelle maniére il en faut découvrir l'intégrale, parce que la méthode donnée dans le dernier Problême ne peut être d'uſage ici. Néanmoins dans le cas où la quantité $\frac{1}{4}ff$ ſurpaſſe eg, on verra que la propoſée peut être réduite en deux binomes, ce qui donnera l'intégrale demandée : mais ſi $\frac{1}{4}ff$ eſt moindre que eg, cette méthode n'aura même plus lieu, puiſque la quantité $\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}$ qui entre dans toutes ces intégrales devenant dans ce cas impoſſible, les intégrales ſeront auſſi impoſſibles. C'eſt pour remédier à cet inconvénient que M. Côtes fit ſes efforts pour trouver moyen de décompoſer la différentielle $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ en pluſieurs différentielles trinomes, ce qu'il exécuta en effet, mais ſa méthode fut reſtreinte aux cas où λ marqueroit un des nombres de cette ſuite, 2, 4, 8, 16, &c. M. de Moivre dans la ſuite étendit cette théorie plus loin, & trouva une méthode générale qui donnât l'intégrale de la propoſée, λ marquant un nombre entier quelconque : on verra que cette méthode eſt ſemblable à celle dont on s'eſt ſervi pour les binomes. Nous donnerons premiérement la méthode de M. Côtes, étant celle qu'a ſuivi M. Smith dans la conſtruction des tables ; & enſuite nous

nous tâcherons de développer celle que M. DE MOIVRE a indiquée.

PROBLÊME IX.

95. *TROUVER l'intégrale de la différentielle* $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$, $\frac{\delta}{\lambda}$ *étant une fraction positive moindre que l'unité.*

PREMIER CAS.

Lorsque $\frac{1}{4}ff$ *est une quantité plus grande que* eg.

ON suppoſera $e+fz^n+gz^{2n}=\overline{p+\sqrt{g}\times z^n}\times\overline{q+\sqrt{g}\times z^n}$, ou plutôt pour ſe débaraſſer des quantités incommenſurables, on ſuppoſera $eg+fgz^n+ggz^{2n}=\overline{p+gz^n}\times\overline{q+gz^n}=pq+pgz^n+qgz^n+ggz^{2n}$; d'où par la comparaiſon des termes on tire $pq=eg$, $p+q=f$, ce qui donne $p=\frac{1}{2}f+\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}$, $q=\frac{1}{2}f-\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}$. Enſuite on ſuppoſera $\frac{g}{eg+fgz^n+ggz^{2n}}=\frac{A}{p+gz^n}+\frac{B}{q+gz^n}$, ou, en réduiſant les deux fractions à une ſeule, $\frac{Aq+Bp+Agz^n+Bgz^n}{\overline{p+gz^n}\times\overline{q+gz^n}}$; ainſi pour déterminer les quantités A & B, on voit qu'il faudra mettre $Aq+Bp=g$, $Ag+Bg=0$, d'où l'on déduit $A=\frac{g}{q-p}$, $B=$

$\frac{g}{p-q}$, ce qui donne $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}} = \frac{g}{q-p} \times \frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{p+gz^n} + \frac{g}{p-q} \times \frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{q+gz^n}$; or ces différentielles ſe rapportant à la partie de la théorie déja ſuffiſamment expliquée, on en trouvera les intégrales ſans aucune peine par les premiéres tables.

SECOND CAS.

Lorſque $\frac{1}{4}ff$ eſt moindre que eg, & λ égal à un des nombres de cette ſuite, 2, 4, 8, 16, *&c.*

QU'ON ſuppoſe $\sqrt[\lambda]{z^n} = x^n$, & on aura $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}} = \frac{\lambda Dx^{\delta n-1}dx}{e+fx^{\lambda n}+gx^{2\lambda n}}$; maintenant on commencera par la différentielle $\frac{Dz^{\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$, laquelle ſe change en cette autre $\frac{2Dx^{n-1}dx}{e+fx^{2n}+gx^{4n}}$; enſuite on ſuppoſera $eg + fgx^{2n} + ggx^{4n} = \overline{p+qx^n+gx^{2n}} \times \overline{r+sx^n+gx^{2n}} = pr + qrx^n + grx^{2n} + psx^n + gsx^{2n} + gsx^{3n} + pgx^{2n} + gqx^{3n} + ggx^{4n}$, & par la comparaiſon des termes, on trouve $pr = eg$, $qr + ps = 0$, $gr + qs + pg = fg$, $gs + gq = 0$; par la derniére de ces équations on trouve $q = -s$, &

par la ſeconde $p = r$, donc par la premiére $r = \sqrt{eg}$, & par la troiſiéme $s = \sqrt{-fg + 2\sqrt{eg^3}}$; ces valeurs de r & s étant ainſi déterminées, on a $eg + fgx^{2n} + ggx^{4n} = r + sx^n + gx^{2n} \times r - sx^n + gx^{2n}$, enſuite on ſuppoſera $\frac{g}{eg + fgx^{2n} + ggx^{4n}} = \frac{A + Bx^n}{r + sx^n + gx^{2n}} + \frac{C + Ex^n}{r - sx^n + gx^{2n}}$

$$= Ar - Asx^n + Agx^{2n} + Brx^n - Bsx^{2n} + Bgx^{3n} + Cr + Csx^n + Cgx^{2n} + Erx^n + Esx^{2n} + Egx^{3n}$$

donc $Ar + Cr = g$, $-As + Br + Cs + Er = 0$, $Ag - Bs + Cg + Es = 0$, $Bg + Eg = 0$; par cette derniére équation on a $E = -B$, par la ſeconde $C = A$, donc par la premiére $A = \frac{g}{2r} = C$, & par la troiſiéme $B = \frac{gg}{2rs} = -E$: par le moyen de ces valeurs on déduira $\frac{2Dx^{n-1}dx}{e + fx^{2n} + gx^{4n}} = \frac{g}{r} \times \frac{Dx^{n-1}dx}{r + sx^n + gx^{2n}} + \frac{gg}{rs} \times \frac{Dx^{2n-1}dx}{r + sx^n + gx^{2n}} + \frac{g}{r} \times \frac{Dx^{n-1}dx}{r - sx^n + gx^{2n}} - \frac{gg}{rs} \times \frac{Dx^{2n-1}dx}{r - sx^n + gx^{2n}}$: en rapportant ces différentielles à la forme 29, on trouve pour les deux premiéres OP . AO :: $\frac{1}{2}s + gz^{\frac{1}{2}n}$. $\sqrt{\frac{1}{4}ss - gr}$ ou $\sqrt{gr - \frac{1}{4}ss}$, & pour les deux autres OP . OA :: $-\frac{1}{2}s + gz^{\frac{1}{2}n}$.

$\sqrt{\frac{1}{4}ss - gr}$ ou $\sqrt{gr - \frac{1}{4}ss}$, & la ſomme des intégrales des deux premiéres égale à $\frac{Dg}{2nrs} M + \frac{Dg}{2nr} ①$, M étant égale à $1 \left\{ \frac{r + sz^{\frac{1}{2}n} + z^n}{r} \right\}$, & la ſomme des intégrales des deux autres égale à $- \frac{Dg}{2nrs} N + \frac{Dg}{2nr} ②$, ſuppoſant $N = 1 \left\{ \frac{r - sz^{\frac{1}{2}n} + gz^n}{r} \right\}$, donc l'intégrale totale de $\frac{Dz^{\frac{1}{2}n-1} dz}{e + fz^n + gz^{2n}}$ eſt $\frac{Dg}{2nrs} \left\{ \frac{r + sz^{\frac{1}{2}n} + gz^n}{r - sz^{\frac{1}{2}n} + gz^n} \right\} + \frac{Dg}{2nr} ① + \frac{Dg}{2nr} ②$, ayant ſoin de donner aux ſymboles, ①, ②, leurs valeurs reſpectives ſelon les différens cas, & les différentes différentielles auxquelles ils appartiennent.

Maintenant ſoit propoſée la différentielle $\frac{Dz^{\frac{1}{4}n-1} dz}{e + fz^n + gz^{2n}}$ qui eſt égale à cette autre $\frac{4Dx^{n-1} dx}{e + fx^{4n} + gx^{8n}}$: on voit par l'exemple précédent qu'on peut ici ſuppoſer $eg + fgx^{4n} + ggx^{8n} = \overline{r + sx^{2n} + gx^{4n}} \times \overline{r - sx^{2n} + gx^{4n}}$, & qu'on aura encore $r = \sqrt{eg}$, $s = \sqrt{-fg + 2\sqrt{eg^3}}$: par la même raiſon on ſuppoſera $rg + sgx^{2n} + ggx^{4n} = \overline{a + cx^n + gx^{2n}} \times \overline{a - cx^n + gx^{2n}}$, & $rg - sgx^{2n} + ggx^{4n} = \overline{\mu + bx^n + gx^{2n}} \times \overline{a - bx^n + gx^{2n}}$, & le calcul pour

trouver les valeurs de, a, b, c, étant ſemblable à celui par lequel on a trouvé celles de, r, s; on aura $a = \sqrt{rg} = \sqrt[4]{eg^3}$, $b = \sqrt{sg + 2\sqrt{rg^3}} = \sqrt{\sqrt{} + \sqrt{-fg^3 + 2\sqrt{eg^7}}} + 2\sqrt[4]{eg^7}$, $c = \sqrt{-sg + 2\sqrt{rg^3}} = \sqrt{\sqrt{} - \sqrt{-fg^3 + 2\sqrt{eg^7}}} + 2\sqrt[4]{eg^7}$. Enſuite on ſuppoſera $\frac{g}{eg + fgx^{4n} + ggx^{8n}} = \frac{A + Bx^{2n}}{r + sx^{2n} + gx^{4n}} + \frac{C + Ex^{2n}}{r - sx^{2n} + gx^{4n}}$, & le calcul ici étant ſemblable à celui de l'exemple précédent, on aura encore $A = \frac{g}{2r} = C$, $B = \frac{gg}{2rs} = -E$, ce qui donne $\frac{4Dx^{n-1}dx}{e + fx^{4n} + gx^{8n}} = \frac{g}{2r} \times \frac{4Dx^{n-1}dx}{r + sx^{2n} + gx^{4n}} + \frac{gg}{2rs} \times \frac{4Dx^{3n-1}dx}{r + sx^{2n} + gx^{4n}} + \frac{g}{2r} \times \frac{4Dx^{n-1}dx}{r - sx^{2n} + gx^{4n}} - \frac{gg}{2rs} \times \frac{4Dx^{3n-1}dx}{r - sx^{2n} + gx^{4n}}$; de la même maniére on décompoſera chacune de ces différentielles en quatre autres, ainſi on ſuppoſera $\frac{g}{rg + sgx^{2n} + ggx^{4n}} = \frac{F + Gx^n}{a + cx^n + gx^{2n}} + \frac{H + Kx^n}{a - cx^n + gx^{2n}}$, & comme les valeurs de F, G, H, K, ſont ſemblables à celles de, A, B, C, E, on aura $F = \frac{g}{2a} = H$, $G = \frac{gg}{2ac} = -K$, ce qui donne $\frac{g}{2r} \times \frac{4Dx^{n-1}dx}{r + sx^{2n} + gx^{4n}} = \frac{gg}{ar} \times \frac{Dx^{n-1}dx}{a + cx^n + gx^{2n}} + \frac{g^3}{acr} \times \frac{Dx^{2n-1}dx}{a + cx^n + gx^{2n}} + \frac{gg}{ar} \times \frac{Dx^{n-1}dx}{a - cx^n + gx^{2n}} - \frac{g^3}{acr} \times$

$\frac{Dx^{2n-1}dx}{a-cx^n+gx^{2n}}$; & $\frac{gg}{2rs} \times \frac{4Dx^{3n-1}dx}{r+sx^n+gx^{2n}} = \frac{g^3}{ars} \times \frac{Dx^{3n-1}dx}{a+cx^n+gx^{2n}} + \frac{g^4}{acrs} \times \frac{Dx^{4n-1}dx}{a+cx^n+gx^{2n}} + \frac{g^3}{ars} \times \frac{Dx^{3n-1}dx}{a-cx^n+gx^{2n}} - \frac{g^4}{acrs} \times \frac{Dx^{4n-1}dx}{a-cx^n+gx^{2n}}$: on réduira les deux autres différentielles de la même maniére en ſuppoſant $\frac{g}{rg-sgx^{2n}+ggx^{4n}} = \frac{L+Mx^n}{a+bx^n+gx^{2n}} + \frac{N+Px^n}{a-bx^n+gx^{2n}}$, où il eſt clair qu'on aura $L = \frac{g}{2a} = N$, $M = \frac{gg}{2ab} = -P$; de ſorte qu'en prenant la ſomme de toutes ces différentielles, on aura $\frac{Dz^{\frac{1}{4}n-1}dx}{e+fz^n+gz^{2n}} = \frac{4Dx^{n-1}dx}{e+fx^{4n}+gx^{8n}} = \frac{gg}{ar} \times \frac{Dx^{n-1}dx}{a+cx^n+gx^{2n}} + \frac{g^3}{acr} \times \frac{Dx^{2n-1}dx}{a+cx^n+gx^{2n}} + \frac{g^3}{ars} \times \frac{Dx^{3n-1}dx}{a+cx^n+gx^{2n}} + \frac{g^4}{acrs} \times \frac{Dx^{4n-1}dx}{a+cx^n+gx^{2n}} + \frac{gg}{ar} \times \frac{Dx^{n-1}dx}{a-cx^n+gx^{2n}} - \frac{g^3}{acr} \times \frac{Dx^{2n-1}dx}{a-cx^n+gx^{2n}} + \frac{g^3}{ars} \times \frac{Dx^{3n-1}dx}{a-cx^n+gx^{2n}} - \frac{g^4}{acrs} \times \frac{Dx^{4n-1}dx}{a-cx^n+gx^{2n}} + \frac{gg}{ar} \times \frac{Dx^{n-1}dx}{a+bx^n+gx^{2n}} + \frac{g^3}{abr} \times \frac{Dx^{2n-1}dx}{a+bx^n+gx^{2n}} - \frac{g^3}{ars} \times \frac{Dx^{3n-1}dx}{a+bx^n+gx^{2n}} - \frac{g^4}{abrs} \times \frac{Dx^{4n-1}dx}{a+bx^n+gx^{2n}} + \frac{gg}{ar} \times \frac{Dx^{n-1}dx}{a-bx^n+gx^{2n}} - \frac{g^3}{abr} \times \frac{Dx^{2n-1}dx}{a-bx^n+gx^{2n}} - \frac{g^3}{ars} \times \frac{Dx^{3n-1}dx}{a-bx^n+gx^{2n}} + \frac{g^4}{abrs} \times \frac{Dx^{4n-1}dx}{a-bx^n+gx^{2n}}$. En rapportant donc ces dif-

férentielles à la forme 29, & y ſubſtituant pour chaque différentielle les quantités qui lui conviennent, on trouve que l'intégrale de la ſomme des quatre premiéres différentielles, eſt $\frac{Dg^3x^{2n}}{2nacrs} + \frac{Dggs - Dagg}{2nacrs}\left\{\frac{a + cx^n + gx^{2n}}{a}\right\} + \frac{Dggs + Dagg}{2nars}$ ①, & l'intégrale de la ſomme des quatre ſuivantes $-\frac{Dg^3x^{2n}}{2nacrs} - \frac{Dggs - Dagg}{2nacrs}\left\{\frac{a - cx^n + gx^{2n}}{a}\right\} + \frac{Dggs + Dagg}{2nars}$ ②; d'où il ſuit que puiſque $z^{\frac{1}{4}n} = x^n$, $aa = rg$, $aar = egg$, l'intégrale des huit premiéres différentielles eſt $\frac{Das + Dgr}{2nes}\left\{\frac{a + cz^{\frac{1}{4}n} + gz^{\frac{1}{2}n}}{a - cz^{\frac{1}{4}n} + gz^{\frac{1}{2}n}}\right\} + \frac{Das + Dgr}{2nes} \times$ ① + ②: pareillement on trouvera que la ſomme des huit autres différentielles a pour intégrale $\frac{Das - Dgr}{2nes}\left\{\frac{a + bz^{\frac{1}{4}n} + gz^{\frac{1}{2}n}}{a - bz^{\frac{1}{4}n} + gz^{\frac{1}{2}n}}\right\} + \frac{Das - Dgr}{2nes} \times$ ③ + ④: on a donc l'intégrale totale. On trouveroit de la même maniére l'intégrale de $\frac{Dz^{\frac{3}{4}n-1}dz}{e + fz^n + gz^{2n}}$ en ſuppoſant $\frac{gx^{2n}}{eg + fgx^{2n} + ggx^{4n}} = \frac{A + Bx^n}{r + sx^n + gx^{2n}} + \frac{C + Ex^n}{r - sx^n + gx^{2n}}$

Les deux exemples qu'on vient de réſoudre font aſſez voir que le calcul qu'il faudroit appliquer à la

différentielle $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$, lorsque la fraction $\frac{\delta}{\lambda}$ est égale à $\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}, \frac{1}{16}, \frac{3}{16}$, &c, est entiérement semblable. *C. Q. F. T.*

REMARQUE.

96. LORSQUE e ou g est une quantité négative, la différentielle proposée se rapporte au premier cas. L'on voit que la méthode qu'on vient d'exposer donne la solution du second cas lorsque λ marque un des nombres de cette suite, 2, 4, 8, 16, &c. puisque dans cette supposition on n'est point embarassé de quantités impossibles, les valeurs des quantités, s, b, c, &c. étant toutes réelles, & que la proposée peut être réduite en plusieurs différentielles trinomes dont on peut facilement trouver les intégrales : mais lorsque λ marque un autre nombre entier quelconque, alors cette méthode de réduire le dénominateur $e+fx^{\lambda n}+gx^{2\lambda n}$ en deux trinomes, & chacun de ces deux en deux autres & ainsi de suite, ne peut être d'usage, parce que de cette maniére on ne parviendroit jamais à des trinomes de cette forme $r+sx^n+gx^{2n}$; par exemple on ne peut résoudre le trinome $e+fx^{3n}+gx^{6n}$ en deux autres trinomes, car pour cela il faudroit supposer $e+fx^{3n}+gx^{6n} = r+sx^{\frac{3}{2}n}+gx^{3n} \times r-sx^{\frac{3}{2}n}+gx^{3n}$, or cette supposition devient inutile, puisqu'il n'y a point de méthode pour trouver l'intégrale d'une différentielle de

de cette nature $\frac{Dx^{n-1}dx}{r+sx^{\frac{1}{2}n}+gx^{n}}$: pour avoir donc une ſolution de ce cas, on ſe ſervira de la méthode générale ſuivante.

PROBLÊME X.

97. *TROUVER l'intégrale de la différentielle* $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^{n}+gz^{2n}}$, $\frac{1}{4}ff$ *étant moindre que* eg, *&* $\frac{\delta}{\lambda}$ *une fraction moindre que l'unité.*

Il faut ſuppoſer $\sqrt[2\lambda]{\frac{g}{e}} \times z^{\frac{n}{\lambda}} = x$, ce qui donnera $z^{n} = x^{\lambda} \times \sqrt{\frac{e}{g}}$, $z^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz = \frac{\lambda}{n}\sqrt[2\lambda]{\frac{e^{\delta}}{g^{\delta}}} \times x^{\delta-1}dx$, & $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^{n}+gz^{2n}} = \frac{D}{n}\sqrt[2\lambda]{\frac{e^{\delta}}{g^{\delta}}} \times \frac{\lambda x^{\delta-1}dx}{e+fx^{\lambda}\times\sqrt{\frac{e}{g}}+ex^{2\lambda}} = \frac{D}{ng}\sqrt[2\lambda]{\frac{g^{2\lambda-\delta}}{e^{2\lambda-\delta}}} \times \frac{\lambda^{\circ}x^{\delta-1}dx}{1+2tx^{\lambda}+x^{2\lambda}}$ en ſuppoſant $f\sqrt{\frac{1}{eg}} = 2t$: mais on a vû (art. 48. & 66.) qu'en prenant ſur une circonférence de cercle un arc AL (*fig.* 18.) dont le co-ſinus eſt t, & enſuite un autre arc $AB = \frac{AL}{\lambda}$, & que ſi du point B on diviſe la circonférence en un nombre de parties égales déſigné par λ, comme BC, CD, DE, EF, FB, & que ſi on ſuppoſe le rayon $OA = 1$, $OP = x$, & que a, b, c, &c. marquent les co-ſinus des arcs AB, AC, AF, &c. on a vû, dis-je, qu'on a

toujours cette équation $\frac{\lambda x^{\delta-1}dx}{1+2tx^{\lambda}+x^{2\lambda}} = \frac{\lambda A dx + \lambda B x dx}{1-2ax+xx}$ $\frac{\lambda C dx + \lambda D x dx}{1-2bx+xx} + \frac{\lambda E dx + \lambda F x dx}{1-2cx+xx}$ + &c. & qu'en supposant $\frac{l+m}{2} = a$, & $lm = 1$, on a $A = \frac{l^{\lambda-\delta} - m^{\lambda-\delta}}{\lambda \times \overline{l^{\lambda} - m^{\lambda}}}$, $B = -\frac{l^{\lambda-\delta-1} - m^{\lambda-\delta-1}}{\lambda \times \overline{l^{\lambda} - m^{\lambda}}}$, ou plutôt puisqu'on a ici $\theta = \delta - 1$, $A = \frac{l^{\lambda-\delta+1} - m^{\lambda-\delta+1}}{\lambda \times \overline{l^{\lambda} - m^{\lambda}}}$, $B = -\frac{l^{\lambda-\delta} - m^{\lambda-\delta}}{\lambda \times \overline{l^{\lambda} - m^{\lambda}}}$. Maintenant puisque l'intégrale de $\frac{dx}{1-2ax+xx}$ est $\frac{2}{l-m\sqrt{-1}}$ (PBO), & celle de $\frac{xdx}{1-2ax+xx}$ est $1\left\{\frac{BP}{BO}\right\} + \frac{l+m}{l-m\sqrt{-1}}$ (PBO), on tire $\int \frac{\lambda A dx + \lambda B x dx}{1-2ax+xx} = -\frac{l^{\lambda-\delta} - m^{\lambda-\delta}}{l^{\lambda} - m^{\lambda}}\left\{\frac{BP}{BO}\right\} + \frac{l^{\lambda-\delta+1} - m^{\lambda-\delta+1} - l^{\lambda-\delta-1} + m^{\lambda-\delta-1}}{\overline{l^{\lambda} - m^{\lambda}} \times \overline{l-m\sqrt{-1}}}$ (PBO); mais $\frac{l^{\lambda-\delta+1} + m^{\lambda-\delta+1} - l^{\lambda-\delta-1} - m^{\lambda-\delta-1}}{l-m} = l^{\lambda-\delta} + m^{\lambda-\delta}$, par conséquent cette intégrale sera $-\frac{\overline{l^{\lambda-\delta} - m^{\lambda-\delta}} \times \sqrt{-1}}{\overline{l^{\lambda} - m^{\lambda}} \times \sqrt{-1}}\left\{\frac{BP}{BO}\right\} + \frac{l^{\lambda-\delta} + m^{\lambda-\delta}}{\overline{l^{\lambda} - m^{\lambda}}\sqrt{-1}}$ (PBO). Mais on a démontré dans l'art. 72, que a ou

$\frac{l+m}{2}$ étant le co-ſinus de l'arc AB, $\frac{\overline{l^{\lambda-\delta}-m^{\lambda-\delta}}\sqrt{-1}}{2}$ ſera le ſinus & $\frac{l^{\lambda-\delta}-m^{\lambda-\delta}}{2}$ le co-ſinus d'un arc qui eſt à AB comme $\lambda-\delta$ à 1, & $\frac{l^{\lambda}-m^{\lambda}}{2}\sqrt{-1}$ le ſinus d'un arc qui eſt à AB comme λ à 1, par conſéquent il ſera facile de déterminer ces modules. Pareillement ſi $\frac{p+q}{2}=b$, & $pq=1$; & $\frac{r+s}{2}=c$, & $rs=1$, on aura $\int\frac{\lambda C dx+\lambda D x dx}{1-2bx+xx}=-\frac{\overline{p^{\lambda-\delta}-q^{\lambda-\delta}}\times\sqrt{-1}}{\overline{p^{\lambda}-q^{\lambda}}\times\sqrt{-1}}\left\{\frac{CP}{CO}\right\}+\frac{p^{\lambda-\delta}+q^{\lambda-\delta}}{\overline{p^{\lambda}-q^{\lambda}}\times\sqrt{-1}}(PCO)$, & $\int\frac{\lambda E dx+\lambda F x dx}{1-2cx+xx}=-\frac{\overline{r^{\lambda-\delta}-s^{\lambda-\delta}}\times\sqrt{-1}}{\overline{r^{\lambda}-s^{\lambda}}\times\sqrt{-1}}\left\{\frac{FP}{FO}\right\}+\frac{r^{\lambda-\delta}+s^{\lambda-\delta}}{\overline{r^{\lambda}-s^{\lambda}}\times\sqrt{-1}}(PFO)$; on voit encore ici que $\frac{\overline{p^{\lambda-\delta}-q^{\lambda-\delta}}\times\sqrt{-1}}{2}$ eſt le ſinus & $\frac{p^{\lambda-\delta}+q^{\lambda-\delta}}{2}$ le co-ſinus d'un arc qui eſt à l'arc AC comme $\lambda-\delta$ à 1 : il faut appliquer le même raiſonnement à toutes les autres intégrales. De plus puiſque t eſt le co-ſinus de l'arc AL $=\lambda\times$ AB, & que $\frac{l^{\lambda}-m^{\lambda}\sqrt{-1}}{2}$ en eſt le ſinus, on a $\frac{l^{\lambda}-m^{\lambda}\sqrt{-1}}{2}=\sqrt{1-tt}$: & en général on a vû (art. 44) qu'en

nommant C la circonférence, & l'arc AL', A, les arcs AB, AC, AF, AD, AE, &c. ſont exprimés de cette maniére $\frac{A}{\lambda}$, $\frac{C+A}{\lambda}$, $\frac{C-A}{\lambda}$, $\frac{2C+A}{\lambda}$, $\frac{2C-A}{\lambda}$, &c. d'où il ſuit que les quantités $\frac{l^\lambda - m^\lambda}{2}\sqrt{-1}$, $\frac{p^\lambda - q^\lambda}{2}\sqrt{-1}$, $\frac{r^\lambda - s^\lambda}{2}\sqrt{-1}$, &c. exprimeront les ſinus des arcs A, C + A, C — A, &c. or on voit clairement que tous ces arcs aboutiſſent au point L, donc ils ont tous le même ſinus que l'arc AL, ce qui donne $\sqrt{1-tt} = \frac{l^\lambda - m^\lambda}{2}\sqrt{-1} = \frac{p^\lambda - q^\lambda}{2}\sqrt{-1} = \frac{r^\lambda - s^\lambda}{2}\sqrt{-1}$ = &c. par conſéquent en mettant π pour $\sqrt{1-ss}$, l'intégrale de $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda n}-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ ou de $\frac{D}{ng}\sqrt[2\lambda]{\frac{g^{2\lambda-\delta}}{e^{2\lambda-\delta}}} \times \frac{\lambda x^{\delta-1}dx}{1+2tx^\lambda+x^{2\lambda}}$ eſt égale à la quantité $\frac{D}{ng\pi}\sqrt[2\lambda]{\frac{g^{2\lambda-\delta}}{e^{2\lambda-\delta}}}$ multipliée par les quantités ſuivantes — $\frac{l^{\lambda-\delta}-m^{\lambda-\delta}}{2}\sqrt{-1}\left\{\frac{BP}{BO}\right\} + \frac{l^{\lambda-\delta}+m^{\lambda-\delta}}{2}(PBO)$ — $\frac{p^{\lambda-\delta}-q^{\lambda-\delta}}{2}\sqrt{-1}\left\{\frac{CP}{CO}\right\} + \frac{p^{\lambda-\delta}+q^{\lambda-\delta}}{2}(PCO)$ — $\frac{r^{\lambda-\delta}-s^{\lambda-\delta}}{2}\sqrt{-1}\left\{\frac{FP}{FO}\right\} + \frac{r^{\lambda-\delta}+s^{\lambda-\delta}}{2}(PBO)$ — &c. & l'on aura OP . OA :: x . 1 :: $\sqrt[\lambda]{z^n}$. $\sqrt[2\lambda]{\frac{e}{g}}$. C. Q. F. T.

COROLLAIRE I.

98. Si la proposée étoit $\frac{Dz^{n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$, par le Problême elle sera égale à celle-ci $\frac{D}{ng}\sqrt[2\lambda]{\frac{g^{\lambda-\delta}}{e^{\lambda-\delta}}} \times \frac{\lambda x^{\lambda+\delta-1}dx}{1+2tx^{\lambda}+x^{2\lambda}}$: or comme $\lambda+\delta-1$ est moindre que 2λ, on aura encore (par l'art. 66.) $\frac{\lambda x^{\lambda+\delta-1}dx}{1+2tx^{\lambda}+x^{2\lambda}} = \frac{\lambda A dx+\lambda Bx dx}{1-2ax+xx}+\frac{\lambda C dx+\lambda Dx dx}{1-2bx+xx}+\frac{\lambda E dx+\lambda Fx dx}{1-2cx+xx}+$ &c. & par un raisonnement semblable à celui que nous avons fait dans le cas du Problême, on trouve $A=-\frac{l^{\delta-1}-m^{\delta-1}}{\lambda\times\sqrt{l^{\lambda}-m^{\lambda}}}$, $B=\frac{l^{\delta}-m^{\delta}}{\lambda\times\sqrt{l^{\lambda}-m^{\lambda}}}$, $C=-\frac{p^{\delta-1}-q^{\delta-1}}{\lambda\times\sqrt{p^{\lambda}-q^{\lambda}}}$, $D=\frac{p^{\delta}-q^{\delta}}{\lambda\times\sqrt{p^{\lambda}-q^{\lambda}}}$, &c. d'où l'on déduit $\int\frac{\lambda A dx+\lambda Bx dx}{1-2ax+xx}=\frac{l^{\delta}-m^{\delta}}{\pi}\sqrt{-1}\left\{\frac{BP}{BO}\right\}+\frac{l^{\delta}+m^{\delta}}{\pi}$ (PBO), & $\int\frac{\lambda C dx+\lambda Dx dx}{1-2bx+xx}=\frac{p^{\delta}-q^{\delta}}{\pi}\sqrt{-1}\left\{\frac{CP}{CO}\right\}$ $\frac{p^{\delta}+q^{\delta}}{\pi}$(PCO), & ainsi des autres termes: de sorte que l'intégrale de $\frac{Dz^{n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ est égale à la quantité $\frac{D}{ng\pi}\sqrt[2\lambda]{\frac{g^{\lambda-\delta}}{e^{\lambda-\delta}}}$ multipliée par les quantités sui-

vantes $+\frac{l^s-m^s}{2}\sqrt{-1}\left\{\frac{BP}{BO}\right\}+\frac{l^s+m^s}{2}(PBO)+\frac{p^s-q^s}{2}\sqrt{-1}\left\{\frac{CP}{CO}\right\}+\frac{p^s+q^s}{2}(PCO)+$ &c. les quantités $\frac{l^s-m^s}{2}\sqrt{-1}$, $\frac{l^s+m^s}{2}$, ſont le ſinus & le co-ſinus d'un arc qui eſt à l'arc AB comme s à 1, & $\frac{p^s-q^s}{2}\sqrt{-1}$, $\frac{p^s+q^s}{2}$ ſont le ſinus & le co-ſinus d'un arc qui eſt à l'arc AC comme s à 1, & ainſi du reſte.

COROLLAIRE II.

99. MAINTENANT ſi la propoſée étoit $\frac{Dz^{\frac{s}{n}n+\frac{s}{n}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$, étant un nombre entier poſitif ou négatif, & plus grand que l'unité lorſqu'il eſt poſitif, on en trouveroit l'intégrale par la table donnée dans l'art. 84, ou par les méthodes expliquées dans l'art. 93.

M. SIMPSON dans ſes *Eſſais* a auſſi donné une méthode élégante pour intégrer les différentielles de cette eſpéce; je n'ai pas eu connoiſſance de ſon livre qu'après avoir entiérement achevé cette théorie, néanmoins on peut voir que la ſolution que j'ai donnée s'accorde avec celle de ce célébre Géométre. On en trouve encore une autre ſolution de M. KLINGENSTIERNA inſérée dans les Tranſactions Philoſophiques num. 417, mais elle n'eſt pas ſi ſimple.

Par ce qui a été dit dans le dernier Problême & ſon premier Corollaire, il eſt clair que la Théorie pour les différentielles trinomes eſt ſemblable à celle qu'on a donnée pour les binomes, & que les formules qu'on a déduites de ces deux théories pour repréſenter les intégrales ſont peu différentes : c'eſt pourquoi il ſeroit inutile de faire voir au long l'application de cette derniére méthode après tous les exemples qu'on a donné ci-devant pour les binomes; comme les formes 31 & 32 ne donnent les intégrales des différentielles $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$, $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$, que dans le cas où la quantité $\frac{1}{4}ff$ eſt plus grande que eg, on ſe contentera d'appliquer les régles précédentes à ces deux différentielles, & par-là on rendra les deux formes complettes en ajoûtant le ſecond cas où $\frac{1}{4}ff$ eſt moindre que eg.

EXEMPLE.

ETANT donc propoſée la différentielle $\frac{Dz^{\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$, on aura $\delta=1$, $\lambda=3$, & par le Problême précédent elle ſe changera en cette autre $\frac{D}{ng}\sqrt[6]{\frac{g^3}{e^3}}\times\frac{3dx}{1+2tx^3+x^6}$: enſuite on décrira du centre O (*fig.* 39.) & du rayon OA = 1, une circonférence de cercle ſur laquelle on prendra l'arc AL plus grand que 90 dégrés à cauſe qu'on a ici $+2t$, & dont le co-ſinus ſoit égal à t; on prendra auſſi l'arc $AB=\frac{AL}{3}$, & du point B on divi-

ſera la circonférence en trois parties égales, BC, CD, DB; & ayant pris ſur le diamétre la partie OP = x, on tirera les lignes PB, PC, PD, BO, CO, DO, & nommant a le co-ſinus de l'arc AB, b celui de AC, c celui de AD, on aura $\frac{3dx}{1+2x^3+x^6} = \frac{Adx+3Bxdx}{1-2ax+xx} + \frac{3Cdx+3Dxdx}{1+2bx+xx} + \frac{3Edx+3Fxdx}{1+2cx+xx}$: & ſi on nomme f le ſinus de l'arc AB, f'' le ſinus & a'' le co-ſinus du double de cet arc; s le ſinus de l'arc AC, s'' le ſinus & b'' le co-ſinus du double de cet arc; σ le ſinus de l'arc AD, σ'' le ſinus & c'' le co-ſinus du double de cet arc, en leur donnant les ſignes qui leur conviennent ſelon l'art. 42, on trouve par la formule du dernier Problême $\int \frac{3Adx+3Bxdx}{1-2ax+xx} = -f''\left\{\frac{BP}{BO}\right\} + a''$ (PBO), $\int \frac{3Cdx+3Dxdx}{1+2bx+xx} = s''\left\{\frac{CP}{CO}\right\} + b''$ (PCO), & $\int \frac{3Edx+3Fxdx}{1+2cx+xx} = \sigma''\left\{\frac{PF}{FO}\right\} - c''$ (PFO): on aura donc l'intégrale totale demandée. On trouvera de la même maniére l'intégrale de $\frac{Dz^{n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ par le premier Corollaire: & par les mêmes formules auſſi les intégrales de $\frac{Dz^{\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$, $\frac{Dz^{n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$; enſuite par le ſecond Corollaire on peut continuer les intégrales auſſi loin qu'on juge à propos. C'eſt de cette maniére que nous avons conſtruit les deux tables ſuivantes.

FORME

FORME XXXI. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 2. *Cas.*

θ	
&c.	
3	$\frac{3Dz^{\frac{4}{3}n}}{4ng} - \frac{3Dfz^{\frac{1}{3}n}}{ngg} + \frac{3Def}{ng^3}$ ① $+ \frac{3Dff-3Deg}{ng^3}$ ②.
2	$\frac{3Dz^{\frac{1}{3}n}}{ng} - \frac{3De}{ngg}$ ① $- \frac{3Df}{ngg}$ ②.
1	$\frac{3D}{ng}$ ②. Voyez fig. 39.
0	$\frac{3D}{ng}$ ①.
1	$-\frac{3D}{2nez^{\frac{2}{3}n}} - \frac{3Df}{neg}$ ① $- \frac{3D}{ne}$ ②.
2	$-\frac{3D}{5nez^{\frac{1}{3}n}} + \frac{3Df}{2neez^{\frac{2}{3}n}} + \frac{3Dff-3Deg}{neeg}$ ① $+ \frac{3Df}{nee}$ ②.
&c.	

OP . OA :: [illegible] . $\sqrt[6]{\frac{e}{g}}$. 1 ; $\pi = \sqrt{\frac{4eg-ff}{4eg}}$.

① $= \frac{1}{3\pi}\sqrt[6]{\frac{e^5}{g^5}}\,x - f''(BP:BO) + s''(CP:CO) + \sigma''(DP:DO) + a''(PBO) + b''(PCO) - c''(PDO)$.

② $= \frac{1}{3\pi}\sqrt[6]{\frac{gg}{ee}}\,x + f(BP:BO) + s(CP:CO) - \sigma(DP:DO) + a(PBO) - b(PCO) + c(PDO)$.

θ	FORME XXXII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 2. *Cas.*
&c.	
3	$\frac{3Dz^{\frac{5}{3}n}}{5ng} - \frac{3Dfz^{\frac{2}{3}n}}{2ngg} + \frac{3Def}{ng^3}$ ① $+ \frac{3Dff-3Deg}{ng^3}$ ②.
2	$\frac{3Dz^{\frac{2}{3}n}}{2ng} - \frac{3De}{ngg}$ ① $- \frac{3Df}{ngg}$ ②.
1	$\frac{3D}{ng}$ ②. Voyez fig. 39.
0	$\frac{3D}{ng}$ ①.
1	$-\frac{3D}{nez^{\frac{1}{3}n}} - \frac{3Df}{neg}$ ① $- \frac{3D}{ne}$ ②.
2	$-\frac{3D}{4nez^{\frac{4}{3}n}} + \frac{3Df}{neez^{\frac{1}{3}n}} + \frac{3Dff-3Deg}{neeg}$ ① $+ \frac{3Df}{nee}$ ②.
&c.	

QP. OA :: $\sqrt[3]{z^n}$. $\sqrt[6]{\frac{e}{g}}$. [redacted] $\sqrt{\frac{4eg-ff}{4eg}}$.

① $= \frac{1}{3\pi}\sqrt[6]{\frac{g^4}{e^4}} \times -f$ (BP : BO) $- s$ (CP : CO) $+ \sigma$ (DP : DO) $+ a$ (PBO) $- b$ (PCO) $+ c$ (PDO).

② $= \frac{1}{3\pi}\sqrt[6]{\frac{g}{e}} \times +f''$ (BP : BO) $- s''$ (CP : CO) $- \sigma''$ (DP : DO) $+ a''$ (PBO) $+ b''$ (PCO) $- c''$ (PDO).

On doit obſerver qu'on a pris comme poſitif le co-ſinus du double de l'arc AB, quoiqu'il puiſſe devenir négatif dans le cas où l'arc AL ſeroit beaucoup plus grand qu'un quart de cercle. Si dans cet exemple on avoit ſuppoſé que f étoit une quantité négative, ce qui auroit donné $1 - 2tx^3 + x^6$ pour le dénominateur de la propoſée, alors l'arc AL auroit été moindre qu'un quart de cercle, le co-ſinus de l'arc AD négatif, le double du co-ſinus de l'arc AC poſitif ou négatif ſelon la grandeur de l'arc AL : enfin connoiſſant la grandeur de l'arc AL, il ſera facile de connoître les ſignes qu'il faudra donner aux ſinus & co-ſinus qui entrent dans les intégrales.

COROLLAIRE III.

100. PAR les deux derniers Problêmes on trouvera auſſi l'intégrale de la différentielle $\frac{Dz^{\theta n + \frac{\delta}{\lambda} n - 1} dz}{e + fz^n + gz^{2n} \times k + lz^n}$ ſoit que $\frac{1}{4}ff$ ſoit une quantité plus grande ou moindre que eg : pour cela on ſuppoſera $\frac{z^{\theta n}}{e + fz^n + gz^{2n} \times k + lz^n} = \frac{A + Bz^n}{e + fz^n + gz^{2n}} + \frac{C}{k + lz^n}$ lorſque θ eſt égal à zero ou à un nombre entier poſitif qui ne ſurpaſſe pas 2, & par l'art. 64, on trouve en mettant t pour $ell - fkl + gkk$,

lorſque $\theta = 0$, $A = \frac{gk - fl}{t}$, $B = -\frac{gl}{t}$, $C = \frac{ll}{t}$.

lorſque $\theta = 1$, $A = \frac{el}{t}$, $B = \frac{gk}{t}$, $C = -\frac{kl}{t}$.

lorſque $\theta = 2$, $A = -\frac{ek}{t}$, $B = \frac{el - fk}{t}$, $C = \frac{kk}{t}$.

Les valeurs de A, B, C, étant ainſi déterminées, on multipliera les fractions $\frac{A + Bz^n}{e + fz^n + gz^{2n}} + \frac{C}{k + lz^n}$ par $z^{\frac{\delta}{\lambda}n - 1}dz$, ce qui réduira la différentielle propoſée en pluſieurs qui ſe rapporteront aux méthodes déja données : par conſéquent puiſqu'on a $\frac{z^{2n + \frac{\delta}{\lambda}n - 1}dz}{e + fz^n + gz^{2n} \times k + lz^n}$

$= -\frac{ekz^{\frac{\delta}{\lambda}n - 1}dz + el - fk \times z^{n + \frac{\delta}{\lambda}n - 1}dz}{t \times e + fz^n + gz^{2n}} + \frac{kkz^{\frac{\delta}{\lambda}n - 1}dz}{t \times k + lz^n}$, lorſque θ eſt égal aux nombres, 3, 4, 5, on multipliera cette équation par z^n, z^{2n}, z^{3n}, &c ; & puiſqu'on a auſſi $\frac{z^{\frac{\delta}{\lambda}n - 1}dz}{e + fz^n + gz^{2n} \times k + lz^n} =$

$\frac{gk - fl \times z^{\frac{\delta}{\lambda}n - 1}dz - glz^{n + \frac{\delta}{\lambda}n - 1}dz}{t \times e + fz^n + gz^{2n}} + \frac{llz^{\frac{\delta}{\lambda}n - 1}dz}{k + lz^n}$, lorſque θ eſt un des nombres -1, -2, -3, &c, on multipliera cette équation par z^{-n}, z^{-2n}, z^{-3n}, &c, & ainſi on trouvera par les régles précédentes les intégrales de toutes ces différentielles ; lorſque $\frac{1}{4}ff$ eſt une quantité plus grande que eg, on aura recours au Problême IX ; & lorſque $\frac{1}{4}ff$ eſt moindre que eg, on ſe ſervira du Problême X ; c'eſt ainſi que nous avons calculé le ſecond cas des formes 37 & 38.

θ	FORME XXXVII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\times\overline{k+lz^n}}$ 2. Cas.
&c.	
3.	$\frac{3Dz^{\frac{2}{3}n}}{ngl}-\frac{3Dk^1}{nll}①+\frac{3De\times\overline{fk-el}}{ngg}②+\frac{3Dk\times\overline{ff-eg}-3Defl}{ngg}③.$
2.	$\frac{3Dkk}{nl}①-\frac{3Dek}{ng}②+\frac{3D\times\overline{el-fk}}{ng}③.$
1.	$-\frac{3Dk}{n}①+\frac{3Del}{ng}②+\frac{3Dk}{n}③.$
0.	$\frac{3Dl}{n}①+\frac{3D\times\overline{gk-fl}}{ng}②-\frac{3Dl}{n}③.$
1.	$-\frac{3D}{2nekz^{\frac{2}{3}n}}-\frac{3Dll}{nk}①+\frac{3Dl\times\overline{ff-eg}-3Dfgk}{neg}②+\frac{3D\times\overline{fl-gk}}{ne}③.$
&c.	

$$t=ell-fkl+gkk$$

2. *Cas.* OP . OA :: $\sqrt[3]{z^n}$. $\sqrt[3]{\frac{k}{l}}$. ① $=\frac{1}{3t}\sqrt[3]{\frac{ll}{kk}}\times-\beta$ (BP : BO) + (DP : DO) + $\downarrow$ (PBO).

2. *Cas.* OP . OA :: $\sqrt[3]{z^n}$. $\sqrt[3]{\frac{-k}{l}}$. ① $=\frac{-1}{3t}\sqrt[3]{\frac{ll}{kk}}\times-$ (AP : AO) + β (CP : CO) + $\downarrow$ (PCO). Voyez fig. 29.

OP . OA :: $\sqrt[3]{z^n}$. $\sqrt[6]{\frac{e}{g}}$. $\pi=\sqrt{\frac{4eg-ff}{4eg}}$.

② $=\frac{1}{3\pi t}\sqrt[6]{\frac{g^5}{e^5}}\times-f^n$ (BP : BO) + s^n (CP : CO) + σ^n (DP : DO) + a^n (PBO) + b^n (PCO) − c^n (PDO).

③ $=\frac{1}{3\pi t}\sqrt[6]{\frac{gg}{ee}}\times+f$ (BP : BO) + s (CP : CO) − σ (DP : DO) + a (PBO) − b (PCO) + c (PDO). Voyez fig. 39.

θ	FORME XXXVIII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\times\overline{k+lz^n}}$ 2. *Cas.*
&c.	
3.	$\frac{3Dz^{\frac{2}{3}n}}{2ngl}-\frac{3Dk^3}{nll}$ ① $+\frac{3De\times\overline{fk-el}}{ngg}$ ② $+\frac{3Dk\times\overline{ff-eg}-3Defl}{ngg}$ ③.
2.	$\frac{3Dkk}{nl}$ ① $-\frac{3Dek}{ng}$ ② $+\frac{3D\times\overline{fk-el}}{ng}$ ③.
1.	$-\frac{3Dk}{n}$ ① $+\frac{3Del}{ng}$ ② $+\frac{3Dk}{n}$ ③.
0.	$\frac{3Dl}{n}$ ① $-\frac{3D\times\overline{fl-gk}}{ng}$ ② $-\frac{3Dl}{n}$ ③.
1.	$-\frac{3D}{nek\times\frac{1}{3}n}-\frac{3Dll}{nk}$ ① $+\frac{3Dl\times\overline{ff-eg}-3Dfgk}{neg}$ ② $+\frac{3D\times\overline{fl-gk}}{ne}$ ③.
&c.	

$$t = ell - fkl + gkk$$

1. *Cas.* OP . OA :: $\sqrt[3]{z^n}$. $\sqrt[3]{\frac{k}{l}}$. ① $= \frac{1}{3t}\sqrt[3]{\frac{l}{k}}\times\alpha + \beta$ (BP : BO) $-$ (DP : DO) $+ \downarrow$ (PBO).

2. *Cas.* OP . OA :: $\sqrt[3]{z^n}$. $\sqrt[3]{\frac{-k}{l}}$. ① $= \frac{-1}{3t}\sqrt[3]{\frac{-l}{k}}\times - (AP : AO) + \beta$ (CP : CO) $- \downarrow$ (PCO). Voyez fig. 29.

OP . OA :: $\sqrt[3]{z^n}$. $\sqrt[6]{\frac{e}{g}}$. $\pi = \sqrt{\frac{4eg-ff}{4eg}}$.

② $= \frac{1}{3\pi t}\sqrt[6]{\frac{g^4}{e^4}}\times - f$ (BP : BO) $- s$ (CP : CO) $+ \sigma$ (DP : DO) $+ a$ (PBO) $- b$ (PCO) $+ c$ (PDO).

③ $= \frac{1}{3\pi t}\sqrt[6]{\frac{g}{e}}\times + f''$ (BP : BO) $- s''$ (CP : CO) $- \sigma''$ (DP : DO) $+ a''$ (PBO) $+ b''$ (PCO) $- c''$ (PDO). Voyez fig. 39.

COROLLAIRE IV.

101. Si la propoſée avoit cette forme $\frac{Dz^{\theta n-1}dz \times \overline{k+lz^n}^{\frac{1}{r}}}{e+fz^n+gz^{2n}}$, ou cette autre $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz \times \overline{k+lz^n}^{\frac{1}{r}}}{e+fz^n+gz^{2n}}$, $\frac{1}{n}$ étant une fraction quelconque, on ſuppoſera pour la premiére $k+lz^n = x^n$, d'où l'on tire $z^n = \frac{x^n-k}{l}$, $z^{n-1}dz \times \overline{k+lz^n}^{\frac{1}{r}} = \frac{x^{n+\frac{1}{r}n-1}dx}{l}$, $e+fz^n+gz^{2n} = \frac{ell-fkl+gkk+flx^n-2gkx^n+gx^{2n}}{ll}$, ce qui donne $\frac{Dz^{\theta n-1}dz \times \overline{k+lz^n}^{\frac{1}{r}}}{e+fz^n+gz^{2n}} = \frac{D}{l^{\theta-2}} \times \frac{x^{n+\frac{1}{r}n-1}dx \times \overline{x^n-k}^{\theta-1}}{ell-fkl+gkk+flx^n-2gkx^n+gx^{2n}}$; par conſéquent θ étant un nombre entier poſitif ou négatif, cette différentielle ſe rapportera aux deux derniers Problêmes ou aux Corollaires précédens.

Pour la ſeconde différentielle il faut ſuppoſer $\frac{k+lz^n}{z^n} = x^n$, ce qui donne $z^n = \frac{k}{x^n-l}$, $e+fz^n+gz^{2n} = \frac{ell-fkl+gkk+fkx^n-2elx^n+ex^{2n}}{\overline{x^n-l}^2}$, $z^{n-1}dz =$

$\frac{kx^{n-1}dx}{\sqrt[\lambda]{x^n-l}}$, d'où l'on tire $\frac{Dz^{\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz \times \sqrt[r]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}} =$

$-\frac{Dk^{\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{r}}x^{\frac{1}{r}n-1}dx \times \sqrt[\lambda]{x^n-l}^{-\frac{\delta}{\lambda}-\frac{1}{r}+1}}{ell-fkl+gkk+fkx^n-2elx^n+ex^{2n}}$; cette différentielle fait voir que toutes les fois que l'exposant $-\frac{\delta}{\lambda}-\frac{1}{r}+1$ est égal à zero ou à un nombre entier positif ou négatif, on trouvera par les régles précédentes l'intégrale de la proposée, & par conséquent aussi celle de $\frac{Dz^{b_n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz \times \sqrt[r]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$: d'où il suit que les tables qu'on auroit construit suivant les articles précédens, seroient d'une grande commodité pour la construction des nouvelles qui représentassent les intégrales des différentielles considérées dans ce Corollaire; nous nous sommes servi des quatre formes données ci-dessus, pour construire le second cas (c'est-à-dire, le cas ou $\frac{1}{4}ff$ est moindre que eg.) des formes 75, 76, 77, 78, qui manquent dans les tables de M. SMITH.

FORME

FORME LXXV. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[3]{k+lz^n}}$ 2. *Cas.*

θ	
&c.	
3	$\frac{3D}{2ngl}PP+\frac{3D\times\overline{fk-el}}{ngg}①-\frac{3Df}{ngg}②.$
2	$-\frac{3Dk}{ng}①+\frac{3D}{ng}②.$
1	$\frac{3Dl}{ng}①.$
0	$-\frac{3D}{ne}◎+\frac{3D\times\overline{gk-fl}}{neg}①-\frac{3D}{ne}②.$
&c.	

$$P=\sqrt[3]{k+lz^n}\,.\,t=ell-fkl+gkk.$$

1. *Cas.* OP . OA :: $\sqrt[3]{k+lz^n}$. $\sqrt[3]{k}$. $◎=\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{k}}x-(AP:AO)+\beta(CP:CO)-\downarrow(PCO)$.

2. *Cas.* OP . OA :: $\sqrt[3]{k+lz^n}$. $\sqrt[3]{-k}$. $◎=\frac{-1}{3}\sqrt[3]{\frac{-1}{k}}x+\beta(BP:BO)-(DP.DO)+\downarrow(PBO)$. Voyez fig. 29.

$$\pi=\sqrt{\frac{4ell-\beta^2ll}{4tg}}.$$

OP . OA :: $\sqrt[3]{k+lz^n}$. $\sqrt[6]{\frac{t}{g}}$. $①=\frac{1}{3\pi}\sqrt[6]{\frac{g^4}{t^4}}x-f(BP:BO)-s(CP:CO)+\sigma DP:DO)+a(PBO)-b(PCO)+c(PDO)$.

$②=\frac{1}{3\pi}\sqrt[6]{\frac{g}{t}}x+f''(BP:BO)-s''(CP:CO)-\sigma''(DP:DO)+a''(PBO)+b''(PCO)-c''(PDO)$. Voyez fig. 39.

θ	FORME LXXVI. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[3]{k+lz^n}}$ 2. *Cas.*
&c.	
2	$\frac{3D}{ng}$ ◎ $-\frac{3D\times\overline{el-fk}}{neg}$ ① $+\frac{3D}{ng}$ ②.
1	$-\frac{3Dk}{ne}$ ①.
0	$\frac{3Dl}{ne}$ ① $-\frac{3D}{ne}$ ②.
1	$-\frac{3D}{2nek}$ PP $-\frac{3D\times\overline{fl-gk}}{nee}$ ① $+\frac{3Df}{nee}$ ②.
&c.	

$$P=\sqrt[3]{\frac{k+lz^n}{z^n}}. \quad t=ell-fkl+gkk.$$

1. *Cas.* OP . OA :: P . $\sqrt[3]{l}$; ◎ $=\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{l}}\times-(AP:AO)+\beta(CP:CO)-\downarrow(PCO)$.

2. *Cas.* OP . OA :: P . $\sqrt[3]{-l}$; ◎ $=\frac{-1}{3}\sqrt[3]{\frac{-1}{l}}\times+\beta(BP:BO)-(DP:DO)+\downarrow(PBO)$. Voyez fig. 29.

OP . OA :: P . $\sqrt[6]{\frac{t}{e}}$. $\pi=\sqrt{\frac{4egkk-ffkk}{4te}}$.

① $=\frac{1}{3\pi}\sqrt[6]{\frac{e^4}{t^4}}\times-f(BP:BO)-s(CP:CO)+\sigma(DP:DO)+a(PBO)-b(PCO)+c(PDO)$.

② $=\frac{1}{3\pi}\sqrt[6]{\frac{e}{t}}\times+f''(BP:BO)-s''(CP:CO)-\sigma''(DP:DO)+a''(PBO)+b''(PCO)-c''(PDO)$. Voyez fig. 39.

θ	FORME LXXVII. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[3]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 2. Cas.
&c.	
3.	$\frac{-12f+3gk+3glz^n}{4ngg\ell}DP+\frac{3Dft}{ng^3}①+\frac{3Dl\times\overline{ff-eg}-3Dfgk}{ng^3}②.$
2.	$\frac{3D}{ng}P-\frac{3Dt}{ngg}①+\frac{3D\times\overline{gk-fl}}{ngg}②.$
1.	$\frac{3Dl}{ng}①.$
0.	$-\frac{3Dk}{ne}◎+\frac{3Dt}{neg}①-\frac{3Dk}{ne}②.$
&c.	

$$P=\sqrt[3]{k+lz^n}\ .\ t=ell-fkl+gkk.$$

1. *Cas.* OP . OA :: $\sqrt[3]{k+lz^n}$. $\sqrt[3]{k}$; $◎=\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{kk}}\times-(AP:AO)+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO)$.

2. *Cas.* OP . OA :: $\sqrt[3]{k+lz^n}$. $\sqrt[3]{-k}$. $◎=\frac{-1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{kk}}\times-\beta(BP:BO)+(DP,DO)+\downarrow(PBO)$. Voyez fig. 29.

$$OP\ .\ OA :: P\ .\ \sqrt[6]{\frac{t}{g}}. \qquad \pi=\sqrt{\frac{4egll-ffll}{4tg}}.$$

$①=\frac{1}{3\pi}\sqrt[6]{\frac{g^5}{t^5}}\times-f''(BP:BO)+s''(CP:CO)+\sigma''(DP:DO)+a''(PBO)+b''(PCO)-c''(PDO)$.

$②=\frac{1}{3\pi}\sqrt[6]{\frac{gg}{tt}}\times+f(BP:BO)+s(CP:CO)-\sigma(DP:DO)+a(PBO)-b(PCO)+c(PDO)$. Voyez fig. 39.

θ	FORME LXXVIII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz\sqrt[3]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 2. Cas.
&c.	
1.	$\frac{3Dl}{ng}$ ◎ $-\frac{3Dt}{neg}$ ① $+\frac{3Dl}{ng}$ ②.
0.	$-\frac{3Dk}{ne}$ ②.
1.	$-\frac{3D}{ne}P+\frac{3Dt}{nee}$ ① $+\frac{3D\times\overline{fk-el}}{nee}$ ②.
2.	$\frac{-3ek-3elz^n+12fkz^n}{4neekz^n}DP-\frac{3Dft}{ne^3}$ ① $-\frac{3Dk\times\overline{ff-eg}-3Defl}{ne^3}$ ②.
&c.	

$$P=\sqrt[3]{\frac{k+lz^n}{z^n}}. \quad t=ell-fkl+gkk.$$

1. *Cas.* OP . OA :: P . $\sqrt[3]{l}$; ◎ $=\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{ll}}\times-(AP:AO)+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO)$.

2. *Cas.* OP . OA :: P . $\sqrt[3]{-l}$; ◎ $=\frac{-1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{ll}}\times-\beta(BP:BO)+(DP:DO)+\downarrow(PBO)$. Voyez fig. 29.

$$OP.OA::P.\sqrt[6]{\frac{t}{e}}. \quad \pi=\sqrt{\frac{4egkk-ffkk}{4te}}.$$

① $=\frac{1}{3\pi}\sqrt[6]{\frac{e^5}{t^5}}\times-f''(BP:BO)+s''(CP:CO)+\sigma''(DP:DO)+\alpha''(PBO)+b''(PCO)-c''(PDO)$.

② $=\frac{1}{3\pi}\sqrt[6]{\frac{ee}{tt}}\times+f(BP:BO)+s(CP:CO)-\sigma(DP:DO)+\alpha(PBO)-b(PCO)+c(PDO)$. Voyez fig. 39.

COROLLAIRE V.

102. ON peut encore rapporter à ces ſortes de différentielles cette autre $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}} \times \frac{k+lz^n}{p+qz^n}\Big|^{\phi}_{\lambda}$ qui peut repréſenter généralement un grand nombre : pour cela on ſuppoſera $\frac{k+lz^n}{p+qz^n} = x^n$, ce qui donnera $z^n = \frac{k-px^n}{qx^n-l}$, & mettant t pour $\frac{ell - fkl + gkk}{t+fkq-2eql+fpl-2gkp \times x^n + eqq-fpq+gpp \times x^{2n}}$, $e + fz^n + gz^{2n} = \frac{\overline{qx^n-l}^2}{\overline{qx^n-l}^2}$,

$z^{n-1}dz = \frac{\overline{pl-kq} \times x^{n-1}dx}{\overline{qx^n-l}^2}$, d'où l'on tire

$$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}} \times \frac{k+lz^n}{p+qz^n}\Big|^{\phi}_{\lambda} = \frac{\overline{pl-qk} \times Dx^{n+\frac{\phi}{\lambda}n-1}dx \times \frac{k-px^n}{qx^n-l}\Big|^{\theta-1}}{t+\overline{fkq-2eql+fpl-2gkp} \times x^n + \overline{eqq-fpq+gpp} \times x^{2n}}$$

ainſi θ étant égal à o ou à un nombre entier poſitif ou négatif, on trouvera l'intégrale de cette différentielle.

PROBLÊME XI.

103. *TROUVER l'intégrale de la différentielle* $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\sqrt{+fz^n+gz^{2n}}}$ *θ étant égal à zero ou à un nombre entier quelconque.*

ON ſuppoſera, comme il a été remarqué dans l'art. 40. $\frac{\frac{1}{2}f}{g} + z^n = x^{\frac{n}{2}}$, & l'on aura $z^n = x^{\frac{n}{2}} - \frac{\frac{1}{2}f}{g}$, $e + fz^n + gz^{2n} = \frac{eg - \frac{1}{4}ff}{g} + gx^n$, & $z^{n-1}dz = \frac{x^{\frac{n}{2}-1}dx}{2}$, ce qui donne $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\sqrt{e + fz^n + gz^{2n}}} = \frac{Dx^{\frac{n}{2}-1}dx \times \overline{x^{\frac{n}{2}} - \frac{\frac{1}{2}f}{g}}^{\theta-1}}{2\sqrt{\frac{eg - \frac{1}{4}ff}{g} + gx^n}}$; on en trouvera l'intégrale par l'art. 88. *C. Q. F. T.*

COROLLAIRE I.

104. Si la propoſée étoit $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\sqrt{k + lz^n} \times \sqrt{e + fz^n + gz^{2n}}}$, on ſuppoſeroit $k + lz^n = x^n$, & delà on déduiroit $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\sqrt{k + lz^n}\sqrt{e + fz^n + gz^{2n}}} = \frac{D}{l^{\theta-1}} \times \frac{x^{-1}dx \times \overline{x^n - k}^{\theta-1}}{\sqrt{ell - fkl + gkk + flx^n - 2gkx^n + gx^{2n}}}$; par ce moyen la propoſée eſt réduite au cas du Problême; & par conſéquent l'intégrale de $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\sqrt{e + fz^n + gz^{2n}}}$ donnera facilement celle de $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\sqrt{k + lz^n}\sqrt{e + fz^n + gz^{2n}}}$.

COROLLAIRE II.

105. MAINTENANT si la proposée étoit de cette nature $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{k+lz^n+mz^{2n}\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}$, il faudroit supposer $k+lz^n+mz^{2n}=0$, ce qui donneroit $z^n=\frac{1}{2}l\pm\sqrt{\frac{1}{4}ll-km}$, & mettant p au lieu de $\frac{1}{2}l+\sqrt{\frac{1}{4}ll-km}$, & q au lieu de $\frac{1}{2}l-\sqrt{\frac{1}{4}ll-km}$ on supposeroit $\frac{m}{mk+mlz^n+m^2z^{2n}}=\frac{A}{p+mz^n}+\frac{B}{q+mz^n}$, & delà on tire $A=\frac{m}{q-p}$, $B=\frac{m}{p-q}$, & ainsi la proposée sera égale à la somme des deux suivantes $\frac{m}{q-p}\times\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{p+mz^n\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}+\frac{m}{p-q}\times\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{q+mz^n\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}$ lesquelles se rapportent au Corollaire précédent.

Et généralement si la proposée étoit $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{k+lz^n+mz^{2n}+nz^{3n}+\&c.\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}$ on réduiroit (par l'art. 59.) la fraction $\frac{z^{\theta n-1}}{k+lz^n+mz^{2n}+nz^{3n}+\&c.}$ en plusieurs fractions simples, pourvû que la quantité $k+lz^n+mz^{2n}+nz^{3n}+$ &c. soit composée du produit de plusieurs quantités simples telles que, $a+bz^n$, $e+fz^n$, $g+hz^n$, &c. ce qui résoudra la différentielle proposée en plusieurs différentielles qui

ſe rapporteront toutes au Corollaire précédent : en réduiſant ainſi les différentielles aux précédentes, on trouvera facilement les intégrales cherchées par le moyen de celles qu'on a déja trouvées, & les tables conſtruites pour un cas ſervent à en conſtruire avec peu de peine pour pluſieurs autres.

De-là on tirera facilement l'intégrale de $\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}{k+lz^n+mz^{2n}+nz^{3n}+\&c.}$ ſoit en ſe ſervant de l'article 87, ſoit en multipliant le numérateur & le dénominateur de cette différentielle par $\sqrt{e+fz^n+gz^n}$, ce qui la réduiroit à cette forme - - -

$$\frac{Dez^{\theta n-1}dz+Dfz^{\theta n+n-1}dz+Dgz^{\theta n+2n-1}dz}{k+lz^n+mz^{2n}+nz^{3n}\ \&c.\ \sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}$$

qui eſt celle qu'on vient d'examiner ; cette intégrale étant connue, on trouveroit celle de $\frac{Dz^{\theta n-1}dz\times e+fz^n+gz^{2n})^{\frac{1}{2}}}{k+lz^n+mz^{2n}+nz^{3n}+\&c.}$, & par le moyen de celle-ci on auroit celle de $\frac{Dz^{\theta n-1}dz\times e+fz^n+gz^{2n})^{\frac{3}{2}}}{k+lz^n+mz^{2n}+nz^{3n}+\&c.}$, & ainſi de ſuite.

Des différentielles quadrinomes & autres.

COMME on peut réduire ces ſortes de différentielles aux différentielles binomes ou trinomes, &

par

conſéquent les aſſujettir aux mêmes loix, il ſuffira d'en dire ici un mot.

PROBLÈME XII.

106. *TROUVER l'intégrale de la différentielle* $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$, *θ étant un nombre entier quelconque.*

IL peut arriver deux cas; car ou la quantité $e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}$ eſt compoſée du produit de trois quantités ſimples binomes, ou de deux quantités dont l'une eſt binome & l'autre trinome; ou ce qui eſt la même choſe l'équation $e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}=0$ a trois racines réelles, ou ſeulement une.

PREMIER CAS.

Lorſque $e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}$ *a trois diviſeurs ſimples.*

QU'ON ſuppoſe que ces trois diviſeurs ſont $\varkappa z^n-k$, λz^n-l, μz^n-m, & lorſque $\theta n-1$ eſt moindre que $3n$, on réduira (par l'art. 59.) la différentielle propoſée en trois différentielles ſimples de cette forme $\frac{A\times Dz^{n-1}dz}{\varkappa z^n-k}+\frac{B\times Dz^{n-1}dz}{\lambda z^n-l}+\frac{C\times Dz^{n-1}dz}{\mu z^n-m}$; nous avons trouvé les valeurs des indéterminées A, B, C, pour un cas dans l'application de cet article, on en trouvera les valeurs pour les autres cas

de la même manière. Lorſque $\theta n - 1$ eſt un nombre poſitif plus grand que $3n$, ou que θ eſt égal à zero ou à un nombre négatif, on réduira la propoſée par la diviſion ou par les autres méthodes qu'on a données.

SECOND CAS.

Lorſque $e + fz^n + gz^{2n} + hz^{3n}$ *n'a qu'un diviſeur ſimple.*

Qu'on ſuppoſe que ce diviſeur eſt $z^n - \frac{k}{l}$, & qu'on faſſe la diviſion en prenant hz^{3n} pour premier terme du dividende & z^n pour premier terme du diviſeur, & on trouvera $hz^{2n} + g + h\frac{k}{l} \times z^n + f + g\frac{k}{l} + h\frac{kk}{ll}$ pour quotient, puiſqu'on ſuppoſe la diviſion exacte; ſi on prend e & $-\frac{k}{l}$ pour premiers termes du dividende & du diviſeur, on trouvera le quotient $-e\frac{l}{k} - e\frac{ll}{kk} + f\frac{l}{k} \times z^n - hz^{2n}$: d'où il ſuit qu'en ſuppoſant $f + g\frac{k}{l} + h\frac{kk}{ll} = p$, ou $-e\frac{l}{k} = p$; & $g + h\frac{k}{l} = q$, ou $-e\frac{ll}{kk} - f\frac{l}{k} = q$, on aura $\frac{Dz^{\theta n - 1}dz}{e + fz^n + gz^{2n} + hz^{3n}} = \frac{Dlz^{\theta n - 1}dz}{p + qz^n + hz^{2n} \times lz^n - k}$, on trouvera l'intégrale de

cette différentielle par l'art. 94, ou par la forme 35 des tables. *C. Q. F. T.*

COROLLAIRE I.

107. On ſe ſervira de la même méthode pour trouver l'intégrale de la différentielle $\frac{Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$; ainſi on la réduira ou en trois différentielles ſimples ou en une ſeule comme $\frac{Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{p+qz^n+hz^{2n}\times lz^n-k}$, dont on trouvera les intégrales de la maniére qu'on a enſeigné ci-devant. Par ce moyen nous allons ajoûter ici le ſecond cas (c'eſt-à-dire, le cas ou la quantité $e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}$ n'a qu'un diviſeur ſimple) des formes, 43, 44, qui par les raiſons que nous avons vûes échappoit à la méthode de M. Côtes.

θ	FORME XLIII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$ 2. *Cas.*
&c.	
3	$\frac{3Dz^{\frac{1}{3}n}}{nh}-\frac{3Dk^3}{nl}①-\frac{3Dpl\times\overline{pl+qk}}{nhh}②+\frac{3Dkl\times\overline{hp-qq}-3Dpqll}{nhh}③.$
2	$-\frac{3Dkk}{n}①+\frac{3Dpkl}{nh}②+\frac{3Dl\times\overline{pl+qk}}{nh}③.$
1	$-\frac{3Dkl}{n}①+\frac{3Dpll}{nh}②-\frac{3Dkl}{n}③.$
0	$-\frac{3Dll}{n}①-\frac{3Dl\times\overline{hk+ql}}{nh}②-\frac{3Dll}{n}③.$
1	$\frac{3Dl}{2npkz^{\frac{2}{3}n}}-\frac{3Dl^3}{nk}①+\frac{3Dll\times\overline{qq-hp}+3Dqhkl}{nhp}②+\frac{3Dl\times\overline{hk+ql}}{np}③.$
&c.	

Si l'équation $e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}=0$ n'a qu'une racine réelle $\frac{k}{l}$ qui ſoit la valeur de z^n, les deux autres racines étant imaginaires, on ſuppoſera $t=pll+qkl+hkk$, $p=-e\frac{l}{k^3}$, $q=-e\frac{ll}{kk}-f\frac{l}{k}$, ou $p=f+g\frac{k}{l}+h\frac{kk}{ll}$, $q=g+h\frac{k}{l}$. $\pi=\sqrt{\frac{4ph-qq}{4ph}}$.

1. *Cas.* OP . OA :: $\sqrt[3]{z^n}$. $\sqrt[3]{\frac{k}{l}}$; ① $=\frac{1}{3t}\sqrt[3]{\frac{ll}{kk}}\times-(AP:AO)+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO)$.

2. *Cas.* OP . OA :: $\sqrt[3]{z^n}$. $\sqrt[3]{\frac{-k}{l}}$; ① $=\frac{-1}{3t}\sqrt[3]{\frac{ll}{kk}}\times-\beta(BP:BO)+\delta(DP:DO)+\downarrow(PBO)$. Voyez fig. 29.

OP . OA :: $\sqrt[3]{z^n}$. $\sqrt[6]{\frac{p}{h}}$; ② $=\frac{1}{3\pi t}\sqrt[6]{\frac{h^5}{p^5}}\times-f''(BP:BO)+s''(CP:CO)+\sigma''(DP:DO)+a''(PBO)+b''(PCO)-c''(PDO)$.

③ $=\frac{1}{3\pi t}\sqrt[6]{\frac{hh}{pp}}\times+f(BP:BO)+s(CP:CO)-\sigma(DP:DO)+a(PBO)-b(PCO)+c(PDO)$. Voyez fig. 39.

θ	FORME XLIV. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$ 2. *Cas.*
&c.	
3.	$\frac{3Dz^{\frac{2}{3}n}}{2nh}-\frac{3Dk^3}{nl}①-\frac{3Dpl\times\overline{pl+qk}}{nbb}②+\frac{3Dkl\times\overline{bp-qq}-3Dpqll}{nbb}③.$
2.	$-\frac{3Dkk}{n}①+\frac{3Dpkl}{nb}②+\frac{3Dl\times\overline{pl+qk}}{nb}③.$
1.	$-\frac{3Dkl}{n}①+\frac{3Dpll}{nb}②-\frac{3Dkl}{n}③.$
0.	$-\frac{3Dll}{n}①-\frac{3Dl\times\overline{bk+ql}}{nb}②-\frac{3Dll}{n}③.$
1.	$\frac{3Dl}{npkz^{\frac{1}{3}n}}-\frac{3Dl^3}{nk}①-\frac{3Dll\times\overline{bp-qq}-3Dqbkl}{nbp}②+\frac{3Dl\times\overline{bk+ql}}{np}③.$
&c.	

Si l'équation $e+fz^n+gz^{2n}+bz^{3n}=0$ n'a qu'une racine réelle $\frac{k}{l}$ qui ſoit la valeur de z^n, les deux autres racines étant imaginaires, on ſuppoſera $t=pll+qkl+hkk$, $p=-e\frac{l}{k}$, $q=-e\frac{ll}{kk}-f\frac{l}{k}$, ou $p=f+g\frac{k}{l}+h\frac{kk}{ll}$, $q=g+b\frac{k}{l}$. $\pi=\sqrt{\frac{4ph-qq}{4pb}}$.

1. *Cas.* OP . OA :: $\sqrt[3]{z^n}$. $\sqrt[3]{\frac{k}{l}}$; ① $=\frac{1}{3t}\sqrt[3]{\frac{l}{k}}\times-$ (AP : AO) $+\beta$ (CP : CO) $-\downarrow$ (PCO).

2. *Cas.* OP . OA :: $\sqrt[3]{z^n}$. $\sqrt[3]{\frac{-k}{l}}$; ① $=\frac{-1}{3t}\sqrt[3]{\frac{-l}{k}}\times+\beta$ (BP : BO) $-$ (DP . DO) $+\downarrow$ (PBO). Voyez fig. 29.

OP . OA :: $\sqrt[3]{z^n}$. $\sqrt[6]{\frac{p}{b}}$; ② $=\frac{1}{3\pi t}\sqrt[6]{\frac{b^4}{p^4}}\times-f$ (BP : BO) $-s$ (CP : CO) $+\sigma$ (DP : DO) $+a$ (PBO) $-b$ (PCO) $+c$ (PDO).

◎ $=\frac{1}{3\pi t}\sqrt[6]{\frac{b}{p}}\times+f''$ (BP : BO) $-s''$ (CP : CO) $-\sigma''$ (DP : DO) $+a''$ (PBO) $+b''$ (PCO) $-c''$ (PDO). Voyez fig. 39.

COROLLAIRE II.

108. ETANT donnée l'intégrale de $\frac{Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+bz^{3n}}$, on trouvera les intégrales des différentielles $\frac{Dz^{\theta n+\frac{\delta}{\lambda}n-1}dz\times\overline{k+lz^n}^{\frac{1}{r}}}{e+fz^n+gz^{2n}+bz^{3n}}$, $\frac{Dz^{\theta n-1}dz\times\overline{k+lz^n}^{\frac{1}{r}}}{e+fz^n+gz^{2n}+bz^{3n}}$, $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+bz^{3n}}\times\frac{k+lz^n}{p+qz^n}\Big|\frac{\delta}{\lambda}$, par la même méthode dont on s'eſt ſervi pour les différentielles trinomes ſemblables.

COROLLAIRE III.

109. IL eſt clair que tout ce qu'on vient de dire touchant les différentielles quadrinomes, doit auſſi s'entendre des autres différentielles dont les dénominateurs contiendroient un plus grand nombre de termes, & que, quelque fût le nombre de ces termes, il ne faudroit pour trouver les intégrales qu'appliquer les mêmes régles en faiſant des calculs ſemblables.

De cette maniére on voit qu'on pourroit conſtruire des tables en auſſi grand nombre & auſſi étendues qu'on voudroit ſe donner la peine de pouſſer les calculs.

Fin de la troiſiéme Partie.

QUATRIEME PARTIE.

APPLICATION DE LA THÉORIE PRÉCÉDENTE.

110. APRÈS avoir exposé les principes & l'étendue de la théorie, & fait voir la construction des tables qu'on en tire; il ne reste plus qu'à faire connoître l'avantage qui résulte de cette méthode par la simplicité des solutions qu'elle donne des Problêmes, & à montrer combien ces tables sont commodes dans la pratique pour trouver les intégrales des différentielles qui s'y rapportent.

Une différentielle étant donnée, il sera facile de connoître la forme à laquelle elle se rapporte, on y prendra son intégrale dont la valeur se déduira des formules données dans les articles 18 & 33. Les valeurs des termes qui marquent des logarithmes se tirent de la formule $M \times l \times r$, dans laquelle M marque le module, l le logarithme du terme pris dans les tables ordinaires, & $r = 2, 30258509$: les valeurs des termes qui expriment un arc de cercle

ſe trouvent par la formule N x R x r, dans laquelle R marque le rayon avec lequel cet arc eſt décrit, N le nombre de dégrés qu'il contient trouvé dans les tables des ſinus, tangentes, &c. & $r = 0,0174529$.

Uſage de la Théorie pour trouver la rectification des Courbes.

PROBLÊME I.

111. *TROUVER la longueur d'un arc quelconque de la Parabole.*

SOIT donnée une parabole AP (*fig.* 40.) dont le paramétre eſt a, l'abſciſſe AQ priſe ſur l'axe ſoit nommée x, l'ordonnée QP, y; & l'intégrale de la différentielle $\sqrt{dx^2 + dy^2}$ donnera la longueur de l'arc AP; ainſi puiſque $ax = yy$, on tire $dy^2 = \frac{a\,dx^2}{4x}$, & $\sqrt{dx^2 + dy^2} = dx\sqrt{\frac{a+4x}{4x}} = \frac{x-\frac{1}{2}dx}{2}\sqrt{a+4x}$.

Maintenant pour voir plus ſenſiblement l'avantage de cette méthode, nous allons comparer la ſolution qu'elle donne de ce Problême avec celle que donne la méthode commune, qui conſiſte à réduire cette différentielle en une ſérie infinie, & à prendre ſéparément l'intégrale de chaque terme, ce qui étant fait, la ſomme de toutes les intégrales particuliéres donne la longueur de l'arc cherché. En tirant donc la racine quarrée de la quantité $a + 4x$, on trouve

$x - \frac{1}{2}dx$

$\frac{x^{-\frac{1}{2}}dx}{2}\sqrt{a+4x} = \frac{a^{\frac{1}{2}}x^{-\frac{1}{2}}dx}{2} + \frac{x^{\frac{1}{2}}dx}{a^{\frac{1}{2}}} - \frac{x^{\frac{3}{2}}dx}{a^{\frac{3}{2}}} + \frac{2x^{\frac{5}{2}}dx}{a^{\frac{5}{2}}} - \frac{5x^{\frac{7}{2}}dx}{a^{\frac{7}{2}}}$ + &c. d'où l'on tire $\int\frac{x^{-\frac{1}{2}}dx}{2}\sqrt{a+4x}$

$= a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} + \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3a^{\frac{1}{2}}} - \frac{2x^{\frac{5}{2}}}{5a^{\frac{1}{2}}} + \frac{4x^{\frac{7}{2}}}{7a^{\frac{5}{2}}} - \frac{10x^{\frac{9}{2}}}{9a^{\frac{7}{2}}} +$

&c. $= \sqrt{ax} \times 1 + \frac{2x}{3a} - \frac{2x^2}{5a^2} + \frac{4x^3}{7a^3} - \frac{10x^4}{9a^4}$ + &c.

Ainſi ſi on demande la longueur de l'arc qui répond à l'abſciſſe $x = \frac{1}{2}$, ſuppoſant $a = 1$, elle ſera égale à $\sqrt{\frac{1}{2}} \times 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2\times5} + \frac{1}{2\times7} - \frac{5}{8\times9}$ + &c. mais on voit que la convergence de cette ſérie eſt aſſez lente, ce qui obligeroit de prendre la ſomme d'un grand nombre de termes, qui eſt une opération très-pénible, d'autant plus que l'on ne voit pas la ſuite progreſſive des termes ſans continuer très-loin l'extraction de la racine quarrée. On trouvera facilement l'intégrale de $\frac{x^{-\frac{1}{2}}dx}{2}\sqrt{a+4x}$ par le moyen des logarithmes, car en rapportant cette différentielle aux tables, on voit que $n = 1$, & que ſuppoſant $\theta n + \frac{1}{2}n - 1 = -\frac{1}{2}$ on tire $\theta = 0$; cette différentielle donc appartient au premier cas de la forme 50, & la comparaiſon des termes donne $z^n = x$, $e = a$, $f = 4$, $D = \frac{1}{2}$, & $\int\frac{x^{-\frac{1}{2}}dx}{2}\sqrt{a+4x} = \frac{x}{2} \times$

$\sqrt{\frac{a+4x}{x}} - \frac{a}{8}\left\{\frac{AP}{AO}\right\} + \frac{a}{8}\left\{\frac{CP}{CO}\right\} = \frac{x}{2}\sqrt{\frac{a+4x}{x}} + \frac{a}{8}$ $\left\{\frac{CP}{AP}\right\}$, OP étant à OA, comme $\sqrt{\frac{a+4x}{x}}$ à 2; ou bien on exprimera l'intégrale de cette façon $\frac{x^{\frac{1}{2}}}{2}\sqrt{a+4x} + \frac{a}{8}\left\{\frac{2x^{\frac{1}{2}} + \sqrt{a+4x}}{2x^{\frac{1}{2}} - \sqrt{a+4x}}\right\}$, ou par l'art. 10. $\frac{x^{\frac{1}{2}}}{2}\sqrt{a+4x} + \frac{a}{4}\left\{\sqrt{\frac{2x^{\frac{1}{2}} + \sqrt{a+4x}}{2x^{\frac{1}{2}} - \sqrt{a+4x}}}\right\}$ & quoique $2x^{\frac{1}{2}}$ ſoit moindre que $\sqrt{a+4x}$, on regardera la quantité $\sqrt{\frac{2x^{\frac{1}{2}} + \sqrt{a+4x}}{2x^{\frac{1}{2}} - \sqrt{a+4x}}}$ comme réelle ſuivant ce qu'on a remarqué dans l'art. 24: mais puiſque $2x^{\frac{1}{2}} + \sqrt{a+4x} \times 2x^{\frac{1}{2}} - \sqrt{a+4x} = -a$, on aura $2x^{\frac{1}{2}} + \sqrt{a+4x} \cdot \sqrt{-a} :: \sqrt{-a} \cdot 2x^{\frac{1}{2}} - \sqrt{a+4x}$; ce qui donne $\sqrt{\frac{2x^{\frac{1}{2}} + \sqrt{a+4x}}{2x^{\frac{1}{2}} - \sqrt{a+4x}}} = \frac{2x^{\frac{1}{2}} + \sqrt{a+4x}}{\sqrt{-a}} = \frac{2x^{\frac{1}{2}} + \sqrt{a+4x}}{\sqrt{a}}$ ou $\frac{\sqrt{a}}{2x^{\frac{1}{2}} - \sqrt{a+4x}}$, ſans s'embarraſſer des quantités imaginaires comme nous venons de dire; par conſéquent $\int \frac{x^{-\frac{1}{2}}dx}{2}\sqrt{a+4x} = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{2}\sqrt{a+4x} + \frac{a}{4}\left\{\frac{2x^{\frac{1}{2}} + \sqrt{a+4x}}{\sqrt{a}}\right\}$: dans notre exemple ou $x = \frac{1}{2}$, cette intégrale ou l'arc AP devient

égal à $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}} + \frac{1}{4}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. Mais $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}} = 0,6123724$, & ſe ſervant de la formule $M\,lr$ on a $M = \frac{1}{4}$, l égale au logarithme de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, c'eſt-à-dire puiſque $\sqrt{2} = 1,4142136$, & $\sqrt{3} = 1,7320508$, on aura $l = 0,4977952$, donc $M \times l = 0,1244488$; on multipliera cette quantité par $2,30258509 = r$ ce qui ſe fera facilement ſi on conſtruit une petite table qui contient les produits de ce nombre par les nombres, 1, 2, 3, 4, &c. de cette façon

1	- - -	= 2, 30258509.
2	- - -	= 4, 60517018.
3	- - -	= 6, 90775527.
4	- - -	= 9, 21034036.
5 × 2, 30258509	-	= 11, 51292545.
6	- - -	= 13, 81551054.
7	- - -	= 16, 11809563.
8	- - -	= 18, 42068072.
9	- - -	= 20, 72326581.

On aura donc $0,1244488 \times 2,30258509 = 1842$

18420
92103
921034
9210340
46051701
230258509

0, 286553949

& en ajoutant à ce produit le nombre 0, 6123724,

la ſomme 0, 8989263 en prenant huit rangs de chiffres ſera égale à l'arc AP dont l'abſciſſe AQ = $\frac{1}{2}$. On pourroit encore abréger ce calcul en ſe ſervant des logarithmes ; ainſi puiſque le logarithme de 2, 30258509 eſt 0, 36221569, & celui de 0, 1244488 eſt $\overline{1}$, 0949906, leur ſomme donne $\overline{1}$, 4572063, qui correſpond au nombre 0, 2865539 comme on vient de trouver par la multiplication. Et de cette façon, ſi on demandoit encore l'arc dont l'abſciſſe eſt égale à l'unité, on auroit $\frac{1}{2}\sqrt{5} + \frac{1}{4}(2+\sqrt{5})$ pour ſa valeur : or $\frac{1}{2}\sqrt{5}$ = 1, 1180339$\frac{1}{2}$, & le logarithme de $2+\sqrt{5}$ eſt 0, 6269629, d'où l'on tire 0, 6269629 × 2, 30258509 =

2072
4605
138155
2072326
13815510
46051701
13 81551054

1, 443635423

Ce produit diviſé par 4 donne la valeur de la formule $M \times l \times r$, laquelle étant ajoutée à 1, 1180339$\frac{1}{2}$ donne 1, 4789428 pour la longueur de l'arc cherché. Si on ſe ſert des logarithmes, on trouve $\overline{1}$, 7972418 pour le logarithme de 0, 6269629, auquel ſi on ajoute 0, 3622157, & qu'on ôte 0, 6020600 logarithme de 4, le reſte eſt $\overline{1}$, 5573975 qui répond au nombre 0, 3609088$\frac{1}{2}$, ce qui don-

ne l'arc égal à 1, 4789428 comme auparavant.

En ſe ſervant ainſi des logarithmes on voit que, ſi on veut ſe contenter de prendre des nombres qui contiennent moins que huit rangs de chifres, il ne faudra que quelques momens de temps pour trouver par ce calcul les intégrales cherchées, ſurtout lorſqu'on a devant ſoi des tables de logarithmes un peu étendues comme ſont celles de M. GARDINER.

Si en outre on demandoit une conſtruction géométrique qui en quelque façon repréſentât généralement cette intégrale $\frac{x^{\frac{1}{2}}}{2}\sqrt{a+4x}+\frac{a}{4}\left\{\frac{2x^{\frac{1}{2}}+\sqrt{a+4x}}{\sqrt{a}}\right\}$, on pourroit donner la ſuivante : mais pour voir plus clairement comment on peut la trouver, il faut réduire les termes ſous une autre forme, ainſi le premier terme étant réduit tout ſous le ſigne ſera $\sqrt{\frac{ax}{4}+xx}=\sqrt{\frac{yy}{4}+xx}$, d'où l'on voit que ſi on tire AL qui coupe l'ordonnée PQ en deux parties égales au point L, on aura $AL=\sqrt{\frac{yy}{4}+xx}$; enſuite ſi on multiplie le numérateur & le dénominateur du rapport $\frac{2x^{\frac{1}{2}}+\sqrt{a+4x}}{\sqrt{a}}$ par $\frac{x^{\frac{1}{2}}}{2}$, on aura $\frac{a}{4}\left\{\frac{2x^{\frac{1}{2}}+\sqrt{a+4x}}{\sqrt{a}}\right\}$

$$=\frac{a}{4}\left\{\frac{x+\sqrt{\frac{ax}{4}+xx}}{\sqrt{\frac{ax}{4}}}\right\}=\frac{a}{4}\left\{\frac{x+\sqrt{\frac{yy}{4}+xx}}{\frac{y}{2}}\right\}$$ &c. par conſéquent ſi F eſt le foyer de la parabole,

$\frac{a}{4}\left\{\frac{x+\sqrt{\frac{yy}{4}+xx}}{\frac{y}{2}}\right\} = AF\left\{\frac{AQ+AL}{QL}\right\}$: mais comme tous les trois termes AQ, AL, QL, ſont variables, pour en avoir le moins qu'il eſt poſſible, on tirera ſur AL la perpendiculaire LH qui rencontre l'axe en H, & le triangle LQH ſera ſemblable au triangle LQA, & comme l'on ſçait par la nature de la parabole que la ſoûtangente de l'arc AP eſt double de l'abſciſſe AQ, la ligne AL ſera paralléle à la tangente au point P, & LH paralléle à PS tirée perpendiculairement ſur la courbe au point P, donc puiſque QS eſt la moitié du paramétre, QH en eſt le quart, & par conſéquent QH = AF, ce qui donne $AF\left\{\frac{AQ+AL}{QL}\right\} = QH\left\{\frac{QL+LH}{QH}\right\}$: d'où il ſuit que ſi à AL on ajoute $LM = QH\left\{\frac{QL+LH}{QH}\right\}$ c'eſt-à-dire la meſure ou le logarithme du rapport $\frac{QL+LH}{QH}$ au module QH, la toute AM ſera égale à l'arc AP. *C. Q. F. T.*

PROBLÉME II.

112. *TROUVER la longueur d'un arc quelconque de la ſpirale d'*Archiméde.

SOIT tirée la droite QA (*fig.* 41.) tangente au point Q commencement de la ſpirale donnée QPA,

ſoit A le point où elle coupe la ſpirale, & du centre Q & du rayon QA on décrira le cercle ACA; & ayant mené une ordonnée QPC qui coupe la ſpirale en P & le cercle en C, & une autre ordonnée Qpc infiniment proche de l'autre, on décrira du centre Q le petit arc de cercle Pn, & nommant AQ, a; QP, y; AC, x; & la circonférence entiére c, les ſecteurs ſemblables CQc, PQn donneront, AC (a). Cc (dx) :: QP (y). Pn $= \frac{ydx}{a}$; & parce que la nature de la courbe donne $ax = cy$, on tire $Pp = \sqrt{\frac{y^2dx^2}{a^2} + dy^2} = \frac{dy}{aa}\sqrt{a^4 + ccyy}$. Cette différentielle ſe rapporte à la forme 50 puiſque $n = 2$, & la comparaiſon des termes donne $\theta = 0$, $D = \frac{1}{aa}$, $e = a^4$, $f = cc$, & l'intégrale ou l'arc QP égal à $\frac{yy}{2aa}\sqrt{\frac{a^4 + ccyy}{yy}} + \frac{aa}{4c}\left\{\frac{CP}{AP}\right\} = \frac{y}{2aa}\sqrt{a^4 + ccyy} + \frac{aa}{2c}\left\{\sqrt{\frac{cy + \sqrt{a^4 + ccyy}}{cy - \sqrt{a^4 + ccyy}}}\right\}$: mais parce que $\sqrt{cy + \sqrt{a^4 + ccyy}} \times \sqrt{cy - \sqrt{a^4 + ccyy}} = -a^4$, en regardant comme réels les rapports imaginaires on aura $\sqrt{\frac{cy + \sqrt{a^4 + ccyy}}{cy - \sqrt{a^4 + ccyy}}} = \frac{cy + \sqrt{a^4 + ccyy}}{aa}$ ou $\frac{aa}{cy - \sqrt{a^4 + ccyy}}$; par conſé-

quent $QP = \frac{y}{2aa}\sqrt{a^4+ccyy} + \frac{aa}{2c}\left\{\frac{cy+\sqrt{a^4+ccyy}}{aa}\right\}$; on trouvera donc cet arc de la maniére qu'on a fait voir dans le Problême précédent. On en peut donner auſſi une conſtruction géométrique ſemblable à celle du Problême précédent : car menant la tangente PT qui rencontre en T la ligne QT tirée perpendiculairement ſur l'ordonnée QP on aura ſuivant ce qui eſt démontré par *Archiméde* $QT = \frac{xy}{a} = \frac{cyy}{aa}$ ce qui donne $PT = \frac{y}{aa}\sqrt{a^4+ccyy}$, & en diviſant QT en deux également au point F, & menant FL paralléle à TP, $LF = \frac{y}{2aa}\sqrt{a^4+ccyy}$ qui eſt le premier terme de l'intégrale : pour conſtruire le ſecond terme $\frac{aa}{2c}\left\{\frac{cy+\sqrt{a^4+ccyy}}{aa}\right\}$ on tirera ſur FL la perpendiculaire LH qui rencontre en H la ligne FQ prolongée, & les triangles ſemblables FQL, LQH donnent $FQ\left\{\frac{cyy}{2aa}\right\} . QL\left\{\frac{y}{2}\right\} :: QL\left\{\frac{y}{2}\right\} . QH = \frac{aa}{2c}$ qui eſt le module cherché ; enſuite multipliant & diviſant par $\frac{y}{2aa}$ le rapport $\frac{cy+\sqrt{a^4+ccyy}}{aa}$, on aura $\frac{\frac{cyy}{2aa}+\frac{y}{2aa}\sqrt{a^4+ccyy}}{\frac{y}{2}} = \frac{cy+\sqrt{a^4+ccyy}}{aa}$, or on vient

de

de voir que $\frac{cyy}{2aa} = FQ$, & $\frac{y}{2aa}\sqrt{a^4 + ccyy} = FL$, par conſéquent $\frac{aa}{2c}\left\{\frac{cy + \sqrt{a^4 + ccyy}}{aa}\right\} = QH\left\{\frac{FQ + FL}{QL}\right\}$ ou $QH\left\{\frac{QL + LH}{QH}\right\}$ à cauſe de la ſimilitude des triangles FQL, LQH; ſi donc à FL on ajoute LM égale à la meſure ou au logarithme du rapport $\frac{QL + LH}{QH}$ au module QH, la toute FM égalera l'arc QP. *C. Q. F. T.*

De ce qu'on vient de faire voir dans ces deux Problêmes on découvre une grande analogie entre la parabole & la ſpirale d'*Archiméde*, ce qu'on peut remarquer en paſſant.

On voit que comme dans la parabole, QH (*fig.* 40.) eſt le quart du paramétre, de même QH (*fig.* 41.) dans la ſpirale eſt une quantité conſtante, qu'on peut regarder comme le quart de ſon paramétre, ſurtout puiſqu'en ſuppoſant que le paramétre commun de ces deux courbes eſt $4QH = \frac{2aa}{c}$, & qu'en prenant deux ordonnées égales QP, QP, on trouve que les ſoûtangentes des arcs, AP, QP, ſont égales, leur valeur commune étant $\frac{cyy}{aa}$, & qu'ainſi l'abſciſſe AQ dans la parabole eſt égale à FQ dans la ſpirale, & comme dans la parabole on a $\overline{QP}^2 =$

$AQ \times \frac{2aa}{c}$, de même dans la ſpirale le triangle rectangle FLH donne $\overline{QP}^2 = FQ \times \frac{2aa}{c}$; de plus puiſque les triangles ALH & FLH ſont égaux en tout, l'arc AP de la parabole eſt égal à l'arc QP de la ſpirale.

PROBLÊME III.

113. *TROUVER la longueur d'un arc quelconque de la courbe* logarithmique.

SOIT donnée la logarithmique E M *em*, (*fig.* 42.) dont l'aſymptote eſt la ligne AF *af*; pour avoir la longueur d'un arc E*e*, on tirera les ordonnées EA, *ea*, & les tangentes EF, *ef*, & une autre ordonnée *gb* infiniment proche de *ea*, ſur laquelle on tirera la perpendiculaire *en*, & ſi on nomme *a* la ſoûtangente *af* qui par la nature de la courbe eſt une quantité conſtante, l'ordonnée *ae*, *y*, les deux triangles ſemblables, *eaf*, *enb*, donneront, $ae\ (y) . ef\ (\sqrt{aa+yy}) :: bn\ (dy) . be = \frac{dy}{y}\sqrt{aa+yy}$: or cette différentielle ſe rapporte à la forme 49, puiſque $n = 2$, & la comparaiſon des termes donne $\theta = 0$, $D = 1$, $z^n = yy$, $e = aa$, $f = 1$, & $\int \frac{dy}{y}\sqrt{aa+yy} = \sqrt{aa+yy} - \frac{a}{2}\left\{\frac{CP}{AP}\right\} = \sqrt{aa+yy} - a\left\{\sqrt{\frac{a+\sqrt{aa+yy}}{a-\sqrt{aa+yy}}}\right\}$, OP

étant à OA, comme $\sqrt{aa+yy}$ à a : mais parceque $a+\sqrt{aa+yy} \times a-\sqrt{aa+yy} = -yy$, on aura $\sqrt{\frac{a+\sqrt{aa+yy}}{a-\sqrt{aa+yy}}} = \frac{a+\sqrt{aa+yy}}{y} = \frac{y}{a-\sqrt{aa+yy}}$; en choisissant cette derniére valeur comme étant la plus commode dans cet exemple, l'intégrale est $\sqrt{aa+yy} - a\left\{\frac{y}{a-\sqrt{aa+yy}}\right\} = ef - af\left\{\frac{ea}{af-ef}\right\}$, ou plûtôt $ef - af\left\{\frac{ea}{ef-af}\right\}$ suivant ce qui a été remarqué dans l'art. 24. Par la même raison pour le point E on auroit l'intégrale $EF - AF\left\{\frac{AE}{EF-AF}\right\}$, & de cette intégrale ôtant la précédente, on trouve pour reste $EF - ef + af\left\{\frac{ae}{ef-af}\right\} - AF\left\{\frac{AE}{EF-AF}\right\}$ qui est la valeur de l'arc Ee ; cet arc sera donc connu en évaluant les termes $af\left\{\frac{ae}{ef-af}\right\}$, $AF\left\{\frac{AE}{EF-AF}\right\}$ par le moyen de la formule $M \times l \times r$, comme dans le premier Problême. On peut donner à cette intégrale la construction générale suivante.

Ayant pris sur EA la partie AL = EF — AF, on tirera LM parallèle à l'asymptote qui rencontre la courbe au point M, & puisque l'on sçait que la partie de l'asymptote comprise entre deux ordonnées

eſt le logarithme du rapport qui eſt entr'elles en prenant la ſoûtangente pour module, il s'enſuit que $LM = AF\left\{\frac{AE}{EF - AF}\right\}$: on prendra pareillement ſur ea la partie $al = ef - af$, & tirant lm parallèle à l'aſymptote qui rencontre la courbe en m, on aura $lm = af\left\{\frac{ae}{ef - af}\right\}$, ce qui donne l'arc $Ee = EF - ef + lm - LM$. *C. Q. F. T.*

PROBLÈME IV.

114. *TROUVER la longueur d'un arc de la* Ciſſoïde.

SOIT A le ſommet de la Ciſſoïde AP (*fig.* 43.), AB le diamétre du cercle générateur, & BE ſon aſymptote; tirant une ordonnée quelconque PQ, & nommant AB, a; BQ, x; PQ, y; la nature de la courbe donne $y = a - x\sqrt{\frac{a-x}{x}}$, d'où l'on tire $dy = -\frac{adx + 2xdx}{2x}\sqrt{\frac{a-x}{x}}$, & $\sqrt{dx^2 + dy^2} = \frac{ax - \frac{1}{2}dx}{2} \times \sqrt{a + 3x}$ ou plutôt $-\frac{ax - \frac{1}{2}dx}{2}\sqrt{a + 3x}$, parce qu'on cherche l'arc AP & non pas l'arc infini PO. Cette différentielle comme on voit ſe rapporte à la forme 50, parce que $n = 1$, & en comparant les termes on trouve $\theta = -1$, $D = \frac{a}{2}$, $e = a$, $f = 3$, & $\int -\frac{ax - \frac{1}{2}dx}{2}\sqrt{a + 3x} = a\sqrt{\frac{a+3x}{x}} - \frac{3}{2}\sqrt{\frac{1}{3}aa}$

$\left\{\frac{\sqrt{3}+\sqrt{\frac{a+3x}{x}}}{\sqrt{3}-\sqrt{\frac{a+3x}{x}}}\right\}$, ou plutôt, parce que $\sqrt{3}+\sqrt{\frac{a+3x}{x}}$ $\times\sqrt{3}-\sqrt{\frac{a+3x}{x}}=-\frac{a}{x}$, $a\sqrt{\frac{a+3x}{x}}-a\sqrt{3}\left\{\frac{\sqrt{3x}+\sqrt{a+3x}}{\sqrt{a}}\right\}$; mais parce que cette intégrale doit être nulle lorsque $x=a$, on voit qu'il en faut retrancher $2a-a\sqrt{3}\left\{\frac{\sqrt{3a}+2\sqrt{a}}{\sqrt{a}}\right\}$; par conséquent l'intégrale complette est $a\sqrt{\frac{a+3x}{x}}-2a+a\sqrt{3}\left\{\frac{\sqrt{3a}+2\sqrt{a}}{\sqrt{a}}\right\}-a\sqrt{3}$ $\left\{\frac{\sqrt{3x}+\sqrt{a+3x}}{\sqrt{a}}\right\}=a\sqrt{\frac{a+3x}{x}}-2a+a\sqrt{3}\left\{\frac{\sqrt{3a}+2\sqrt{a}}{\sqrt{3x}+\sqrt{a+3x}}\right\}$ par l'article 10. on trouvera donc l'arc AP par le moyen des logarithmes. Pour donner une construction géométrique de la solution de ce Problême, il faut tirer par le milieu L de l'ordonnée PQ la ligne ALE qui rencontre l'asymptote au point E, & la similitude des triangles AQL, ABE, donne, AQ $(a-x)$. AL $\left\{\sqrt{a-x^2+\frac{yy}{4}}\right\}$ :: AB(a). AE$=\frac{a}{a-x}\times$ $\sqrt{a-x^2+\frac{yy}{4}}=\frac{a}{2}\sqrt{\frac{a+3x}{x}}$, ce qui donne $a\sqrt{\frac{a+3x}{x}}$ $-2a=2$AE-2AB, qui sont les deux premiers termes de l'intégrale : on appercevra plus aisément de quelle maniére on doit construire le terme $a\sqrt{3}$ $\left\{\frac{\sqrt{3a}+2\sqrt{a}}{\sqrt{3x}+\sqrt{a+3x}}\right\}$ en le multipliant & le divisant par

$\sqrt{a}$, ce qui donne $a\sqrt{3}\left\{\frac{\sqrt{3aa}+2a}{\sqrt{3ax}+\sqrt{aa+3ax}}\right\}$; on tirera donc la ligne AF qui rencontre l'asymptote en F, & qui fasse avec BA l'angle BAF de 60 degrés, ou, ce qui revient au même, du centre A & du rayon 2AB on décrira un arc de cercle qui coupera l'asymptote en F, & on aura $AF = 2a$, $BF = \sqrt{3aa} = a\sqrt{3}$: on prendra aussi BD en sorte que BQ . BD :: BD . BA, ce qui donnera $BD = \sqrt{ax}$, & tirant DG parallèle à AF, les triangles semblables AFB, DGB donneront $BG = \sqrt{3ax}$, & menant AG, on aura $AG = \sqrt{aa+3ax}$; par conséquent $a\sqrt{3}\left\{\frac{\sqrt{3aa}+2a}{\sqrt{3ax}+\sqrt{aa+3ax}}\right\} = BF\left\{\frac{BF+AF}{BG+AG}\right\}$.

Si l'on veut se servir de la construction de M. Côtes on multipliera & on divisera le terme $3\sqrt{\frac{1}{3}aa}\left\{\frac{\sqrt{3a}+2\sqrt{a}}{\sqrt{3x}+\sqrt{a+3x}}\right\}$ par $\sqrt{\frac{a}{3}}$, ce qui le réduira à cette forme $3\sqrt{\frac{1}{3}aa}\left\{\frac{a+\sqrt{\frac{4}{3}aa}}{\sqrt{ax}+\sqrt{\frac{1}{3}aa+ax}}\right\}$, & tirant la droite AC qui rencontre l'asymptote en C, & qui fasse avec AB l'angle BAC de 30 degrés, BC sera la moitié de AC, & par conséquent $\overline{AC}^2 - \overline{BC}^2 = 3\overline{BC}^2 = 4a$, & $BC = \sqrt{\frac{1}{3}aa}$, & $AC = \sqrt{\frac{4}{3}aa}$, ensuite prenant $BD = yax$ comme dans la construction précédente, & menant DC, on aura $DC = \sqrt{\frac{1}{3}aa+ax}$; d'où

l'on trouve $3\sqrt{\frac{1}{3}aa}\left\{\frac{a+\sqrt{\frac{4}{3}aa}}{\sqrt{ax}+\sqrt{\frac{1}{3}aa+ax}}\right\}=3BC\left\{\frac{AB+AC}{BD+DC}\right\}$

$=BC\left\{\frac{\overline{AB+AC}^{3}}{\overline{BD+DC}^{3}}\right\}$, donc l'intégrale totale ou l'arc

Ee eſt égal à $2AE-2AB+BC\left\{\frac{\overline{AB+AC}^{3}}{\overline{BD+DC}^{3}}\right\}$.

C. Q. F. T.

Uſage de la Théorie pour la quadrature des Courbes.

ENTRE le grand nombre des lignes courbes dont on peut trouver la ſurface par cette théorie, il ſuffira d'en apporter quelques-unes pour en faire connoître l'uſage.

PROBLEME V.

115. *TROUVER la ſurface de la courbe appellée* la figure des Secantes.

DANS un cercle donné QS (*fig.* 44.) décrit du centre O & du rayon OQ qu'on tire la tangente infinie QP ; & par tous les points S de la circonférence les ſécantes OP ; tirant auſſi la droite AR égale au quart de la circonférence, & élevant la perpendiculaire AD = QO, on prendra AB = QS, & on menera BC = OP, & ainſi on formera la courbe DC : ſi maintenant on tire la ſécante Op infiniment proche de OP, qui rencontre la circonférence en *s*,

& Pϖ perpendiculaire sur Op, & qu'en prenant Bb = Ss, on méne l'ordonnée bc, nommant OQ ou AD, r; QS ou AB, x; OP ou BC, y; les triangles semblables OQP, Pϖp donneront, QP $(\sqrt{yy-rr})$. OQ (r) :: ϖp (dy) . P$\varpi = \frac{rdy}{\sqrt{yy-rr}}$; & les secteurs semblables POϖ, SOs, OP (y) . OS (r) :: Pϖ $\left\{\frac{rdy}{\sqrt{yy-rr}}\right\}$. S$s = \frac{rrdy}{y\sqrt{yy-rr}} =$ B$b = dx$, ce qui donne $ydx = \frac{rrdy}{\sqrt{yy-rr}} =$ BbcC différence de l'espace ADCB.

Cette différentielle se rapporte à la forme 48, & la comparaison des termes donne $n = 2$, $\theta = 0$, $D = rr$, $e = -rr$, $f = 1$, $z^n = yy$, & $\int \frac{rrdy}{\sqrt{yy-rr}} = \frac{rr}{2}\left\{\frac{CP}{AP}\right\} = rr\left\{\sqrt{\frac{y+\sqrt{yy-rr}}{y-\sqrt{yy-rr}}}\right\}$; mais parce que $\sqrt{y+\sqrt{yy-rr}} \times \sqrt{y-\sqrt{yy-rr}} = rr$, on aura $rr\left\{\sqrt{\frac{y+\sqrt{yy-rr}}{y-\sqrt{yy-rr}}}\right\} = rr\left\{\frac{y+\sqrt{yy-rr}}{r}\right\}$ ou $rr\left\{\frac{r}{y-\sqrt{yy-rr}}\right\}$, c'est-à-dire, l'espace ADCB $= \overline{OQ}^2\left\{\frac{OP+PQ}{OQ}\right\}$ ou $\overline{OQ}^2\left\{\frac{OQ}{OP-QP}\right\}$. *C. Q. F. T.*

Ce Problême est d'usage dans la navigation.

PROBLEME

PROBLÈME VI.

116. *TROUVER la quadrature de l'eſpace* OAQP *de la courbe* AQ (fig. 45.) *dont la nature, en nommant* OA, a; *l'abſciſſe* AP, x; *l'ordonnée* PQ, y; *eſt exprimée par cette équation* $aay + xxy = a^3$.

DE l'équation de la courbe on tire $y = \frac{a^3}{aa+xx}$, ce qui donne $ydx = \frac{a^3dx}{aa+xx}$ pour la différence de l'eſpace variable OAQP. On voit que cette différentielle appartient à la ſeconde forme, & que $n = 2$, $\theta = 0$, $D = a^3$, $e = aa$, $f = 1$, $z^n = xx$, d'où par le premier cas de cette forme on a $\int \frac{a^3dx}{aa+xx} = \frac{a^3}{2}\sqrt{\frac{1}{aa}} \times \downarrow(PBO) = aa\,(PBO)$, puiſque $\downarrow = 2BO = 2$: ainſi cette intégrale dépend de la meſure d'un angle, dont le rayon eſt à la tangente comme OA à OP, ou comme a à x, d'où il eſt clair qu'en tirant AP, l'angle PBO de la forme eſt le même qu'ici l'angle OAP, & que par conſéquent $\int \frac{a^3dx}{aa+xx} = aa\,(OAP) = \overline{AO}^2\,(OAP)$.

On trouvera la valeur de cette intégrale par la formule $N \times R \times r$: par exemple ſi on veut que $a = AO = 1$, $x = OP = \frac{1}{2}$, on aura $R = aa = 1$, & puiſque le rayon eſt à la tangente de l'angle OAP comme 2 à 1, on trouvera par les tables des ſinus

& tangentes que cet angle eſt de 26°. 33′. 54″ = 26, 565, ce qui donne N = 26, 565, & ſi pour la commodité de ces ſortes de calculs on fait une petite table des produits de 0, 01745329 par les nombres 1, 2, 3, &c.

1	- - -	= 0, 01745329.
2	- - -	= 0, 03490658.
3	- - -	= 0, 05235987.
4	- - -	= 0, 06981316.
5	× 0, 01745329 -	= 0, 08726645.
6	- - -	= 0, 10471974.
7	- - -	= 0, 12217303.
8	- - -	= 0, 13962632.
9	- - -	= 0, 15707961.

On aura N × R × r = 26, 565 × 0, 01745329 = 008726645
010471974
008726645
010471974
003490658

0, 4636466 4885

qui eſt la valeur de l'eſpace OAQP lorſque QP = $\frac{1}{2}$.

On trouveroit encore la même choſe très-facilement en ſe ſervant des logarithmes : car puiſque le logarithme du nombre 0, 01745329 eſt $\overline{2}$, 24187735, & 1, 4243098 celui de 26, 565 ; la ſomme $\overline{1}$, 66618715 répond au nombre 0, 4636466$\frac{1}{2}$, comme on vient de trouver.

Ce calcul deviendroit beaucoup plus pénible si suivant la méthode ordinaire on cherchoit l'intégrale de la différentielle $\frac{a^3dx}{aa+xx}$ par une série infinie.

La construction géométrique de l'intégrale $\overline{AO}$ (OAP) est très-simple; car si du centre A & du rayon AO on décrit le quart de cercle OB, qui coupe AP en C, l'arc OC est la mesure de l'angle AOP au module AO, c'est-à-dire OC = AO (OAP), ce qui donne le secteur $OAC = \frac{\overline{AO}^2}{2}$ (OAP), & par conséquent l'espace OAQP est égal au double du secteur OAC, & l'espace total AEEO compris entre la courbe AE & son asymptote OE est le double du quart de cercle OAB. *C. Q. F. T.*

PROBLÈME VII.

117. *TROUVER la surface d'une partie quelconque de la courbe* OBCLO (fig. 46.) *le rapport des abscisses* AF *ou* NH, x; *& des ordonnées* FH *ou* AN, y, *étant exprimé par cette équation* $x^4 - 6aaxx + 4xxyy + a^4 = 0$, *dans laquelle* a = QB, *qu'on suppose paralléle à* AN.

L'EQUATION de la courbe $x^4 - 6aaxx + 4xxyy + a^4 = 0$, ou $x^4 - 2aaxx + a^4 = 4aaxx - 4xxyy$, donne $aa - xx = \pm 2x\sqrt{aa - yy}$, d'où l'on tire

$x = \pm\sqrt{2da - yy} \mp \sqrt{aa - yy}$, par conſéquent on aura $xdy = dy\sqrt{2aa - yy} - dy\sqrt{aa - yy} =$ NHhn différence de l'eſpace AOHN, & $xdy = dy\sqrt{2aa - yy} + dy\sqrt{aa - yy} =$ NSsn différence de l'eſpace ACSN. Ces différentielles étant rapportées à la forme 50, on en trouvera les intégrales par des arcs de cercle de la maniére qu'on a vu dans le Problême précédent ; ſi on en veut une conſtruction géométrique, il n'eſt nullement néceſſaire d'avoir recours aux tables, les différentielles ſont ſi ſimples d'elles-mêmes qu'elles en indiquent clairement la conſtruction : car puiſque l'équation de la courbe donne QA = QB, il n'y a qu'à décrire du centre A & des rayons AQ = a, AM = $a\sqrt{2}$, les quarts de cercle QD, MG, qui rencontrent les lignes NS, ns, en P, p, & E, e, & on aura NE = $\sqrt{2aa - yy}$, NP = $\sqrt{aa - yy}$, & EP = $\sqrt{2aa - yy} - \sqrt{aa - yy}$, ce qui donne EP$pe$ = $dy\sqrt{2aa - yy} - dy\sqrt{aa - yy}$; d'où l'on voit que EP eſt toujours égale à NH, & que les élémens EPpe ſont tous égaux aux élémens NHhn, & par conſéquent MQPE = AOHN, d'où il ſuit qu'en tirant BD paralléle à QA & tangente aux points B & D, on aura OADB = QMBD. De la même maniére on voit que ACSN = AQPN + AMEN, ACBD = 2AQD + QMBD, & puiſque QMBD = OADB, il s'enſuit que OCBO =

2AQD = AMG. On peut voir auſſi la quadrature de cette courbe (*de Methodo Integ. J. Bernoulli Lect.* 3ª.) & (*Anal. Dem. du P. Reyneau art.* 810.) *C. Q. F. T.*

PROBLÊME VIII.

118. *TROUVER la ſurface de la* Conchoïde de Nicomede.

SOIENT AE, Bk, (*fig.* 47.) les deux courbes qui compoſent la Conchoïde décrites du pole P, dont l'aſymptote commun eſt CD perpendiculaire ſur PC. Du pole P qu'on tire une ligne PD qui coupe les deux courbes en k & E, & l'aſymptote en D, qu'on tire auſſi une autre ligne Pm infiniment proche de PD, & du centre P ayant décrit le petit arc Dp, nommant AB, a; PC, b; CD, x; les triangles ſemblables PCD, Dpm donneront, PD $(\sqrt{bb+xx})$. PC (b) :: Dm (dx) . Dp $= \frac{bdx}{\sqrt{bb+xx}}$: or on ſçait par la nature de la courbe que Ek = AB, & qu'ainſi Ek × Dp $= \frac{abdx}{\sqrt{bb+xx}}$ qui eſt la différence de l'eſpace AEkB. Cette différentielle ſe rapporte à la forme 48, & la comparaiſon des termes donne $n=2$, $\theta=0$, $D=ab$, $e=bb$, $f=1$, $z^n=xx$, & $\int \frac{abdx}{\sqrt{bb+xx}}$ $= \frac{ab}{2}\left\{\frac{CP}{AP}\right\} = ab\left\{\sqrt{\frac{x+\sqrt{bb+xx}}{x-\sqrt{bb+xx}}}\right\}$: mais parce que

$\sqrt{x+\sqrt{bb+xx}} \times \sqrt{x-\sqrt{bb+xx}} = -bb$, on aura $ab\left\{\sqrt{\frac{x+\sqrt{bb+xx}}{x-\sqrt{bb+xx}}}\right\} = ab\left\{\frac{x+\sqrt{bb+xx}}{b}\right\} = AB \times PC\left\{\frac{CD+PD}{PC}\right\}$; on trouvera donc la valeur de cette intégrale par le moyen des logarithmes. Si l'on prend $CM = PC\left\{\frac{CD+PD}{PC}\right\}$, & qu'on tire par le point M la droite GML paralléle à AB & qui rencontre en G & L les lignes AG, BL perpendiculaires ſur AB, il eſt clair que le parallélogramme AL eſt égal à l'eſpace Conchoïdal AE*k*B.

Si on veut avoir l'eſpace AEDC, on décrira du centre P & du rayon PE le petit arc E*e* & puiſque ED = AC les ſecteurs ſemblables DP*p*, EP*e* donne $DP(\sqrt{bb+xx}) . Dp\left\{\frac{bdx}{\sqrt{bb+xx}}\right\} :: EP\left\{\sqrt{bb+xx}+\frac{a}{2}\right\} . Ee = \frac{bdx}{\sqrt{bb+xx}} + \frac{ab}{2} \times \frac{dx}{bb+xx}$; d'où l'on tire $\sqrt{Ee+Dp} \times \frac{ED}{2} = \frac{abdx}{2\sqrt{bb+xx}} + \frac{aab}{8} \times \frac{dx}{bb+xx} =$ E*ep*D différence de l'eſpace EDCA; mais on vient de voir que $\int \frac{abdx}{2\sqrt{bb+xx}} =$ ACMG, & rapportant la différentielle $\frac{aab}{8} \times \frac{dx}{bb+xx}$ à la ſeconde forme, on trouve que ſon intégrale eſt $\frac{aa}{2\times 8} \times \frac{1}{2}(PBO) =$

$\frac{aa}{8}$ (PBO), OP étant à OA, ou le rayon à la tangente comme b à x, ce qui fait voir que l'angle PBO est le même qu'ici l'angle DPC, donc l'espace AEDC est égal à AGMC $+ \frac{aa}{8}$ (DPC); si donc l'on prend sur l'asymptote la partie CN = CP (DPC), c'est-à-dire CN égale à l'arc CH décrit du centre P & du rayon PC & terminé par la ligne PD, & qu'on tire PN & par le point M la droite MF parallèle à PN, à cause des triangles semblables CPN, GMF, puisque CN est égale à l'arc CH mesure de l'angle DPC, GF sera égale à l'arc, qui mesure le même angle, décrit du rayon MG ou AC, & par conséquent GF $= \frac{a}{2}$ (DPC), & GF $\times \frac{GM}{2} = \frac{aa}{8}$ (DPC); donc le trapéze AFMC est égal à l'espace AEDC: d'où il suit aussi qu'en prolongeant la ligne FM jusqu'à ce qu'elle rencontre Bk en f, le trapéze CMfB est égal à l'espace CDkB. *C. Q. F. T.*

PROBLEME IX.

119. *TROUVER la quadrature de la courbe dont le rapport entre les abscisses* x, *& les ordonnées* y, *est généralement exprimé par cette équation* $ax^x + bx^u y^\sigma + cy^\tau = 0$.

On supposera que la surface de la courbe proposée est égale à la surface d'une autre courbe dont les ordonnées sont u & les abscisses z, d'où il suit

que leurs différences ſeront égales, c'eſt-à-dire $ydx = udz$; enſuite on ſuppoſera $\frac{x^s}{s} = z$, (s eſt un expoſant indéterminé), ce qui donne $x = s^{\frac{1}{s}} z^{\frac{1}{s}}$, $x^\lambda = s^{\frac{\lambda}{s}} z^{\frac{\lambda}{s}}$, $x^\mu = s^{\frac{\mu}{s}} z^{\frac{\mu}{s}}$, $x^{s-1}dx = dz$, d'où l'on tire $y = \frac{udz}{dx} = ux^{s-1} = u \times s^{\frac{s-1}{s}} z^{\frac{s-1}{s}}$, & delà $ax^\lambda + bx^\mu y^\sigma + cy^\tau = as^{\frac{\lambda}{s}} z^{\frac{\lambda}{s}} + bu^\sigma \times s^{\frac{\mu+\overline{s-1}\times\sigma}{s}} \times z^{\frac{\mu+\overline{s-1}\times\sigma}{s}} + cu^\tau \times s^{\frac{\overline{s-1}\times\tau}{s}} z^{\frac{\overline{s-1}\times\tau}{s}} = 0$, & en diviſant l'équation par $s^{\frac{\mu+\overline{s-1}\times\sigma}{s}} \times z^{\frac{\mu+\overline{s-1}\times\sigma}{s}}$, on aura $as^{\frac{\lambda-\mu-\overline{s-1}\times\sigma}{s}} z^{\frac{\lambda-\mu-\overline{s-1}\times\sigma}{s}} + bu^\sigma + cu^\tau \times s^{\frac{\overline{s-1}\times\tau-\sigma-\mu}{s}} z^{\frac{\overline{s-1}\times\tau-\sigma-\mu}{s}} = 0$: afin donc de faire enſorte que le troiſiéme terme de cette équation ne ſoit point embarraſſé du produit uz, on ſuppoſera l'expoſant $\frac{\overline{s-1}\times\tau-\sigma-\mu}{s} = 0$. Ce qui donne $s = \frac{\tau+\mu-\sigma}{\tau-\sigma}$, & $\frac{\lambda-\mu-\overline{s-1}\times\sigma}{s} = \frac{\lambda\tau-\mu\tau-\lambda\sigma}{\tau-\sigma+\mu}$: pour abréger, on ſuppoſera $\frac{\lambda\tau-\mu\tau-\lambda\sigma}{\tau-\sigma+\mu} = \beta$, & ainſi l'équation trouvée ci-deſſus

ſus deviendra $as^{\beta}z^{\beta} + bu^{\sigma} + cu^{\tau} = 0$, ce qui donne $sz = \overline{-\frac{b}{a}u^{\sigma} - \frac{c}{a}u^{\tau}}^{\frac{1}{\beta}}$, & parce que $\int \overline{udz + zdu} = uz$, & $\int udz = uz - \int zdu = uz - \int \frac{du}{s} \times \overline{-\frac{b}{a}u^{\sigma} - \frac{c}{a}u^{\tau}}^{\frac{1}{\beta}}$, & que $udz = ydx$, & $uz = \frac{xy}{s}$, on aura $\int ydx = \frac{xy}{s} - \int \frac{du}{s} \times \overline{-\frac{b}{a}u^{\sigma} - \frac{c}{a}u^{\tau}}^{\frac{1}{\beta}}$.

Il eſt facile de connoître ſur le champ ſi la différentielle $\frac{du}{s} \times \overline{-\frac{b}{a}u^{\sigma} - \frac{c}{a}u^{\tau}}^{\frac{1}{\beta}}$ eſt compriſe dans la théorie qu'on a donnée, & par conſéquent ſi la courbe propoſée eſt exactement quarrable, ou ſi ſa quadrature dépend des ſections coniques, ou de quelqu'autre courbe d'un dégré plus élevé : c'eſt ce que M. NEWTON avoit découvert autrefois, comme il l'aſſure dans une lettre qu'il écrivit à M. COLLINS datée du 8 Novembre 1676.

Soit donc l'équation de la courbe dont il faut trouver la ſurface, $x^3 - axy + y^3 = 0$, & on aura $a = 1, b = -a, c = 1, \lambda = 3, \mu = 1, \sigma = 1, \tau = 3, s = \frac{1}{2}, \beta = 1$, ce qui donne $\int ydx = \frac{2xy}{3} - \int \frac{2du}{3} \times \overline{au - u^3} = \frac{2xy}{3} - \frac{auu}{3} + \frac{u^4}{6}$, ou plutôt $\frac{2xy}{3} - \frac{ayy}{3x} + \frac{y^4}{6xx}$ en mettant au lieu de u ſa valeur $\frac{y}{x^{\frac{1}{2}}}$, mais

à cauſe de l'équation $x^3 - axy + y^3 = 0$, la quantité $\frac{2xy}{3} - \frac{ayy}{3x} + \frac{y^4}{6xx}$ ſe réduit à $\frac{xy}{2} - \frac{ayy}{6x}$; on trouvera donc exactement la ſurface de cette courbe.

Si l'équation de la courbe étoit $x^5 - x^3yy + ggy^3 = 0$, dans ce cas on auroit $\lambda = 5$, $\mu = 3$, $\sigma = 2$, $\tau = 3$, $\alpha = 1$, $b = -1$, $c = gg$, d'où l'on tire $s = 4$, $\beta = -1$, & par conſéquent la ſurface de la courbe égale à $\frac{xy}{4} - \int \frac{dz}{4} \times \overline{z^2 - ggz^3}^{-1} = \frac{xy}{4} - \int \frac{z^{-\frac{1}{2}} dz}{4 \times \overline{1 - gg}z}$: or la différentielle $\frac{z^{-\frac{1}{2}} dz}{4 \times \overline{1 - gg}z}$ ſe rapporte à la premiére forme, ſon intégrale donc ſe trouvera par la meſure d'un rapport, & ainſi la quadrature de la courbe propoſée dépend de celle de l'hyperbole. De cette maniére on peut chercher la quadrature de toute autre courbe dont l'équation ſe rapporte à celle du Problême. *C. Q. F. T.*

La méthode qu'on a donnée dans ce Problême pour réduire l'équation de la courbe en une nouvelle, dont la forme ſoit propre à faire connoître la nouvelle courbe de laquelle dépend ſa quadrature, eſt principalement d'uſage pour les équations où les deux variables x & y ſont tellement mêlées enſemble, qu'on ne peut commodément les ſéparer par les méthodes ordinaires de réſoudre les équations. Si l'équation de la courbe a plus de trois termes, on la réduira en une nouvelle d'une maniére tout-à-fait ſemblable à celle de ce Problême, comme on peut

voir *dans les coroll. 7. & 8. de la prop. 9. de Quadrat. Curv. Newt.*

PROBLÊME X.

120. *DANS une portion donnée* BD (fig. 48.) *d'une parabole quelconque dont l'axe eſt* AP, *ayant mené une ordonnée* PD, *& l'indéfinie* BO *paralléle à* PD, *qu'on tire la droite* AD *qui coupe* BO *en* C, *& qu'on tire* CQ *paralléle à* BP *qui coupe* PD *en* Q ; *cela poſé, qu'il faille trouver l'aire de la courbe* BQ *qui paſſe par tous les points* Q *ainſi déterminés.*

NOMMANT la donnée AB, a ; BP, x ; PD, y ; la nature de toutes les paraboles peut généralement être exprimée par cette équation $y^m = x$, l'expoſant m étant un nombre poſitif entier ou rompu ; & à cauſe des triangles ſemblables APD, ABC, on a AP $(a+x)$. PD (y) ou $(x^{\frac{1}{m}})$: AB (a) . BC $= \frac{ax^{\frac{1}{m}}}{a+x} =$ PQ, donc $ydx = \frac{ax^{\frac{1}{m}}dx}{a+x}$, or l'on voit que cette différentielle ſe rapporte aux tables, & qu'on en trouvera toujours l'intégrale. Par exemple ſi BD eſt la premiére parabole cubique, ſon équation eſt $y^3 = x$, & l'eſpace BQP $= \int \frac{ax^{\frac{1}{3}}dx}{a+x}$: en rapportant la différentielle $\frac{ax^{\frac{1}{3}}dx}{a+x}$ aux tables, on voit

qu'on a premiérement $n = 1$, & enſuite faiſant $\theta n + \frac{\delta}{\lambda} n - 1 = \frac{1}{3}$, l'on tire $\theta + \frac{\delta}{\lambda} = 1 + \frac{1}{3}$, ce qui fait voir que $\theta = 1$, & $\frac{\delta}{\lambda} = \frac{1}{3}$, & par conſéquent cette différentielle appartient à la troiſiéme forme ; & puiſque $D = a, e = a, f = 1, z^n = x$, l'intégrale par le premier cas de cette forme eſt $3ax^{\frac{1}{3}} - 3aa \times \frac{1}{1} \sqrt[1]{\frac{1}{aa}} \times -\beta (BP : BO) + 1 (DP : DO) + \downarrow (PBO)$; mais parce que β eſt la corde de la ſixiéme partie de la circonférence dont le rayon eſt l'unité, & $\downarrow$ la corde du double de cet arc, on aura $\beta = 1$, & $\downarrow = 1,7320508$, & l'intégrale ſera $3ax^{\frac{1}{3}} - a^{\frac{4}{3}} \left\{\frac{DP}{BP}\right\} - a^{\frac{4}{3}} \times 1,7320508 (PBO)$ ou bien $3ax^{\frac{1}{3}} - a^{\frac{4}{3}} \cdot \left\{\frac{a^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{1}{3}}}{\sqrt{a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}} x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}}}\right\} - a^{\frac{4}{3}}, \times 1,7320508 (PBO)$ à cauſe que $OP : OA :: x^{\frac{1}{3}} . a^{\frac{1}{3}}$: la valeur de cette intégrale ſe trouvera par les régles déja employées dans les Problêmes précédens. Si on veut que $x = 1$, & $a = 2$, & qu'on demande l'eſpace BQP ; dans ce cas on aura $3ax^{\frac{1}{3}} = 6$, & $a^{\frac{4}{3}} \left\{\frac{a^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{1}{3}}}{\sqrt{a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}} x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}}}\right\} = \sqrt[3]{16} \left\{\frac{\sqrt[3]{2} + 1}{\sqrt{\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{2} + 1}}\right\}$ on cherchera la valeur de cette expreſſion par la formule $M \times l \times r$, le calcul en eſt facile ſi on le fait par les logarithmes ; on

trouve donc $\sqrt[3]{16}\left\{\frac{\sqrt[3]{2}+1}{\sqrt{\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}+1}}\right\} = 1,697588$; enſuite cherchant l'angle PBO de la maniére qu'on a enſeigné dans l'art. 75, on le trouve de 48°. 44'. 1", ou 48, 73361, & ainſi la formule N x R x r donne $\sqrt[3]{16} \times 1,7320508$ (PBO) $= 3,712272$, d'où l'on tire $6 - 1,697588 - 3,712272 = 0,590140$ qui eſt l'eſpace demandé. *C. Q. F. T.*

PROBLÊME XI.

121. *TROUVER la quadrature des ellypſes & des hyperboles de tous les genres.*

Soit une ellypſe & une hyperbole quelconque AQ, (*fig.* 49. *&* 50.) dont l'abſciſſe AP eſt x, l'ordonnée PQ, y, & l'axe AB, a: par la nature de ces courbes le produit $\overline{AP}^m \times \overline{PB}^n$ eſt à $\overline{PQ}^{m+n}$ en raiſon donnée, comme de a à b, les expoſans m & n étant des nombres poſitifs entiers ou rompus; ce qui donne $y^{m+n} = \frac{b}{a}x^m \times \overline{a \mp x}^n$, & $y\,dx = \sqrt[m+n]{\frac{b}{a}} \times x^{\frac{m}{m+n}}dx \times \overline{a \mp x}^{\frac{n}{m+n}}$: or puiſque $\frac{m}{m+n} + \frac{n}{m+n} = 1$, il eſt clair par l'art. 90. qu'on trouvera toujours l'intégrale de cette différentielle. Soit $m = 2$, & $n = 1$, & on aura $y\,dx = \sqrt[3]{\frac{b}{a}} \times x^{\frac{2}{3}}dx \times \overline{a \mp x}^{\frac{1}{3}}$, on trouvera l'intégrale dans ce cas par la forme 54.

Soit $m = 3$, & $n = 1$, & la différentielle ydx ſera égale à celle-ci $\sqrt[4]{\frac{b}{a}} \times x^{\frac{1}{4}}dx \times \overline{a \mp x}^{\frac{1}{4}}$, laquelle ſe rapporte à la forme 58. Si $m = 3$ & $n = 2$, il viendra $ydx = \sqrt[3]{\frac{b}{a}} \times x^{\frac{1}{3}}dx \times \overline{a \mp x}^{\frac{2}{3}}$: cette différentielle ne ſe trouve pas dans les tables parce qu'elles n'ont point été continuées juſqu'à ce point, on en aura l'intégrale par l'art. 90. & ainſi des autres ſuppoſitions. *C. Q. F. T.*

PROBLÈME XII.

122. *TROUVER la ſuperficie d'un Sphéroïde formé par la révolution d'une ellypſe autour de ſon axe.*

SOIT ANB (*fig.* 51.) la moitié d'une ellypſe, dont le premier axe eſt AC, le ſecond CB, le foyer F: tirant une ordonnée XN, & nommant CA, a; CB, b; CX, x; XN, y, on aura $y = \frac{b}{a}\sqrt{aa - xx}$, $dy = -\frac{bxdx}{a\sqrt{aa - xx}}$, & ſi l'on mene l'ordonnée xn infiniment proche de XN, la différence de la ſurface formée par la révolution de l'arc BN ſera égale au petit arc Nn multiplié par la circonférence décrite du rayon XN, c'eſt-à-dire, ſi $\frac{1}{p}$ marque le rapport du rayon à la circonférence, cette petite ſurface ſera $py\sqrt{dx^2 + dy^2}$: ſi on veut avoir un cercle dont la ſurface ſoit égale à celle du Sphéroïde, nommant z le rayon de ce cercle, pz en ſera la circonférence, donc par l'hy-

pothéſe $\int py\sqrt{dx^2+dy^2} = \frac{pzz}{2}$, ce qui donne $\int 2y\sqrt{dx^2+dy^2} = zz$: mais on a $2y\sqrt{dx^2+dy^2} = \frac{2bdx}{aa}\sqrt{a^4 - aa - bb \times xx} = \frac{2bdx}{aa}\sqrt{a^4 - ccxx}$ en ſuppoſant $cc = aa - bb = \overline{CF}^2$, & ſuppoſant encore $c . a :: a . m = \frac{aa}{c}$, on déduit $\frac{2bdx}{aa}\sqrt{a^4 - ccxx} = \frac{2bdx}{m}\sqrt{mm - xx}$: cette différentielle, comme on voit, ſe rapporte à la forme 50, par laquelle on trouve que ſon intégrale eſt $\frac{bx}{m}\sqrt{mm - xx} - bm$ (PBO), donc ſi dans XN prolongée on prend le point E enſorte que $CE = m$, on aura $XE = \sqrt{mm - xx}$, & tirant ſur CE la perpendiculaire XL, les triangles ſemblables CEX, CXL donneront CE (m) . XE ($\sqrt{mm - xx}$) :: CX (x) . XL $= \frac{x}{m}\sqrt{mm - xx}$. De plus puiſque dans la forme OP eſt à OA, c'eſt-à-dire, la tangente au rayon, ou bien le ſinus au co-ſinus de l'angle PBO comme $\sqrt{mm - xx}$ à x, ou ſi l'on veut le rayon au co-ſinus comme m à x ou CE à CX, il eſt clair que ſi du centre C & du rayon CE on décrit le quart de cercle QEZ, on aura l'angle PBO = l'angle XCE, & EQ = m (PBO) = m (XCE) : mais parce que l'intégrale qu'on cherche doit s'évanouir lorſque $x = 0$, on voit que pour la

rendre complette il faut ſe ſervir de l'arc EZ, & ainſi au lieu de l'intégrale CB × XL — CB × EQ, on aura CB × XL + CB × EZ; ſi donc à XL on ajoute LM = EZ, on aura $z = \sqrt{CB \times XM}$, qui eſt le rayon du cercle dont la ſurface eſt égale à celle du Sphéroïde compriſe entre les lignes CB & XN: delà il ſuit que cette ſurface eſt à celle du cercle dont le rayon eſt CB, comme XM à CB. Si l'ellypſe ANB faiſoit ſa révolution autour du ſecond axe CB, on trouveroit par un ſemblable calcul la ſurface du Sphéroïde, qui dans ce cas dépendroit de la meſure d'un rapport. *C. Q. F. T.*

De cette maniére on trouveroit auſſi la ſuperficie de l'hyperboloïde, & d'une infinité d'autres corps ſolides.

On peut auſſi appliquer cette Théorie à la recherche de la ſolidité des corps.

Uſage de la Théorie dans la ſolution des Problêmes de Méchanique.

QUOIQU'IL y ait un grand nombre de Problêmes de Méchanique qui ſe rapportent à la Théorie préſente, cependant comme ils dépendent pour la plûpart d'un trop grand nombre de principes qu'on ſeroit obligé de ſuppoſer ici, j'ai crû qu'il ſuffiroit de n'en apporter que quelques-uns dont les ſolutions ne demandent que des principes aſſez connus; ceux qui voudront une application plus ample, pourront ſe ſatisfaire

ſatisfaire par la lecture de MM. CÔTES & MACLAURIN, & en s'exerçant eux-mêmes à réſoudre des Problêmes qu'ils ſe propoſeront ou qu'ils trouveront dans les ouvrages de Mécanique comme ceux de MM. NEWTON, EULER, &c.

PROBLÈME XIII.

123. *ETANT donnée la hauteur du Mercure dans le Barométre ſur la ſurface de la Terre, trouver cette hauteur à une diſtance quelconque, la loi de la peſanteur étant en raiſon inverſe d'une puiſſance quelconque* n *de la diſtance au centre.*

SOIT S le centre de la Terre, (*fig.* 52.) A un point de ſa ſurface, & ſur SA prolongée prenant un point quelconque F, & nommant SA, r; SF, x; P la force de la peſanteur au point A, D la denſité connue de l'air en ce point; v ſa denſité en F; par l'hypothéſe on a $\frac{1}{r^n} . \frac{1}{x^n} :: P . \frac{r^n}{x^n} P =$ à la peſanteur en F, enſuite multipliant cette peſanteur par la denſité v, & par dx qui eſt en même raiſon que le petit volume d'air dont la hauteur eſt meſurée par dx, on aura $\frac{Pvr^n dx}{x^n}$ pour la différence de la preſſion que toute la colomne d'air au-deſſus du point F exerce ſur ce point; & puiſqu'on a trouvé par expérience que la denſité de l'air eſt proportionnelle à la force de la compreſſion, il s'enſuit que dv eſt en même

raiſon que $\frac{Pvr^n dx}{x^n}$, & qu'ainſi b étant une quantité conſtante, on aura $bdv = \frac{Pvr^n dx}{x^n}$, ou plutôt $-bdv = \frac{Pvr^n dx}{x^n}$ parce que la denſité diminue à meſure que la diſtance augmente. Donc $bv = \int \frac{Pvr^n dx}{x^n}$, & au point A, $bD = \int \frac{Pvr^n dx}{x^n}$. Maintenant on dira, la denſité du Mercure eſt à la denſité de l'air, comme l'élévation du Mercure dans le Barométre eſt à un quatriéme terme AC qui ſeroit la hauteur de l'Atmoſphére, ſi elle avoit par tout la même denſité qu'au point A; & dans cette hypothéſe la compreſſion que ſouffriroit le point A ſeroit comme la quantité d'air compris dans la colomne AC multipliée par ſa peſanteur, c'eſt-à-dire, cette compreſſion s'exprimeroit par P x D x AC; d'où l'on aura P x D x AC = bD, ce qui donne b = P x AC, & ſubſtituant cette valeur de b, on a $-$ P x AC x $dv = \frac{Pvr^n dx}{x^n}$, ou $-$ AC x $\frac{dv}{v} = \frac{r^n dx}{x^n}$; d'où (par l'art. 17.) l'on tire $-$ AC x log. $v = -\frac{1}{n-1} \times \frac{r^n}{x^{n-1}}$, & au point A, $-$ AC x log. D $= -\frac{r}{n-1}$, ôtant cette derniére équation de la précédente il vient AC x log. D $-$ AC x log. $v = \frac{r}{n-1} - \frac{1}{n-1} \times \frac{r^n}{x^{n-1}}$, ou AC

$\times \log. \frac{D}{v} = -\frac{1}{n-1} \times \frac{\overline{r^n}}{x^{n-1}} - r = -\frac{1}{n-1} \times \frac{\overline{SA^n}}{\overline{SF^{n-1}}} - SA$: donc la quantité $-\frac{1}{n-1} \times \frac{\overline{SA^n}}{\overline{SF^{n-1}}} - SA$ est la mesure ou le logarithme du rapport entre les densités D & v au module AC. Soit l le logarithme de $\frac{D}{v}$ tel que le donnent les tables ordinaires, & par l'art. 18, on aura $AC \times \frac{l}{m} = -\frac{1}{n-1} \times \frac{\overline{SA^n}}{\overline{SF^{n-1}}} - SA$, ce qui donne $l = -\frac{m}{n-1 \times AC} \times \frac{\overline{SA^n}}{\overline{SF^{n-1}}} - SA$. Si la pesanteur est uniforme & constante, c'est-à-dire, si $n = 0$, alors on a $l = m \times \frac{AF}{AC}$; si elle est en raison inverse des quarrés des distances au centre S, qu'on sçait être la loi de la nature, la formule devient $l = \frac{m}{AC} \times \frac{SA \times AF}{SF}$. On appliquera cette formule à un ou deux exemples après qu'on aura déterminé les valeurs de SA & AC. Suivant les dernières mesures faites par M. CASSINI le fils & M. LA CAILLE, le degré moyen d'un méridien de la Terre contient 57050 toises, & par conséquent le contour de la Terre supposée sphérique contient 20538008 toises (*la Méridienne de Paris, pag.* 114.) d'où il suit

que le rayon de la Terre eſt de 3268723 toiſes, qui eſt la valeur de SA. M. Côtes trouva par expérience que la denſité de l'air eſt à celle du mercure comme 1 à 11900, & que le mercure dans le Baromètre ſe tient à la hauteur de $29\frac{1}{2}$ pouces, d'où par la proportion 1 . 11900 :: $29\frac{1}{2}$. AC, on trouve AC = 29254 pieds d'Angleterre ou 27469 pieds de France, ou bien 4578 toiſes. Ces valeurs ſuppoſées, on prendra l'obſervation faite ſur la montagne du *Puy de Domme* par M. Cassini de Thury & M. le Monnier, dont le premier détermina par des opérations géométriques la hauteur de cette montagne au-deſſus du Jardin des Minimes de 560 toiſes (*obſervations d'Hiſtoire Naturelle, à la fin de la méridienne de Paris, pag.* CLXXIV.)

Hauteur du mercure { aux Minimes - 27 pouces 0 l. $\frac{6}{12}$. ; au *Puy de Domme* 23 9 $\frac{6}{12}$. }

Pour chercher par la formule $l = \frac{m}{AC} \times \frac{SA \times AF}{SF}$ la hauteur du mercure ſur le *Puy de Domme*, on aura en ſe ſervant des logarithmes.

6, 5143782	6, 5144525	9, 2625662
2, 7481880	3, 6606758	— 10, 5373440
9, 2625662	0, 3622157	$\overline{2}$, 7252222
	10, 5373440	

le logarithme $\overline{2}$, 7252222 correſpond au nombre 0, 0531156 qui eſt la valeur de l, c'eſt-à-dire, le logarithme de $\frac{D}{v}$: or l'élévation du mercure dans

le Barométre eſt proportionnelle à la denſité de l'air, d'où, en mettant 27 P. 0 l. $\frac{6}{12}$ pour D, l'on déduit $v = 23$ P. 11 l. qui eſt l'élévation du mercure que donne le calcul pour la hauteur de 560 toiſes: la différence d'avec l'obſervation eſt de $1\frac{1}{2}$ ligne.

La ſeconde obſervation eſt tirée de l'*Hydrodynamique* de DANIEL BERNOULLI, où il rapporte pag. 214. que la hauteur de la montagne du *Pic de Tenerif* au-deſſus du niveau de la mer ayant été déterminée de 13158 pieds de *Paris* ou de 2193 toiſes on trouva la hauteur du Mercure { au niveau de la mer - - 27 P. 10 l. / au ſommet du *Pic* - - - 17 P. 5 l.

Faiſant un calcul ſemblable au précédent on trouve 17 P. 3 l. pour l'élévation du mercure, qui différe de l'obſervée de 2 lignes. On ne ſera point ſurpris de trouver ces différences entre le calcul & les obſervations, ſi on fait attention à toutes les variations qui ſurviennent dans l'Atmoſphére cauſées par les vapeurs & exhalaiſons, & ſurtout du froid & du chaud qui ſelon M. BERNOULLI dérangent beaucoup l'état naturel de l'air.

Pour avoir une conſtruction géométrique de ce Problême on prendra Sf qui ſoit le dernier terme de la progreſſion géométrique $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ SF . SA..... Sf, dont le nombre des termes eſt égal à $n + 1$, & prenant la partie infiniment petite FM on fera comme auparavant $\frac{\cdot\cdot}{\cdot\cdot}$ SM . SA..... Sm: or la nature des progreſſions donne $\overline{SF} . \overline{SA} :: SF . Sf$, & $\overline{SM}$.

$\overline{SA}^{n}$ :: SM . Sm, d'où l'on tire $\overline{SF}^{n-1}$. $\overline{SM}^{n-1}$ :: Sm . Sf, & puiſque $\overline{SM}^{n-1} = \overline{SF}^{n-1} + \overline{n-1} \times FM \times \overline{SF}^{n-1}$, on aura $\overline{SM}^{n-1} - \overline{SF}^{n-1}$, ou $(\overline{n-1} \times FM \times \overline{SF}^{n-2})$. $\overline{SM}^{n-1}$ :: Sf — Sm, ou fm . Sf, & mettant SF au lieu de SM, $\overline{n-1} \times FM$. fm :: SF . Sf :: $\overline{SF}^{n}$. $\overline{SA}^{n}$, ce qui donne $fm = \overline{n-1} \times FM \times \frac{\overline{SA}^{n}}{\overline{SF}^{n}}$: donc ſur Sf élevant la perpendiculaire fb qui ſoit proportionnelle à la denſité au point F, & mp proportionnelle à la denſité en M, ou ce qui eſt la même choſe $fb = \frac{v}{n-1}$ & $mp = \frac{v}{n-1}$, on aura $fm \times fb = fb \times FM \times \frac{\overline{SA}^{n}}{\overline{SF}^{n}} = \frac{vr^{n}dx}{x^{n}}$; d'où il eſt clair ſuivant ce qu'on a fait voir au commencement du Problême que le petit eſpace $fbpm$ eſt comme la différence de la denſité ou de la preſſion de l'air au point F, & ſi on fait de même pour tous les points M pris dans la ligne SF prolongée à l'infini, & qu'on tire la courbe BhpO qui paſſe par tous les points, h, p, &c. l'eſpace SfbO compoſé de tous les eſpaces $fbpm$ eſt proportionnel à la denſité ou la preſſion de l'air au point F, & l'eſpace SABO à la denſité en A : par conſéquent puiſque l'ordonnée fb a été priſe proportionnelle à cette même denſité, il s'enſuit que l'eſ-

pace $SfhO$ eſt toujours comme l'ordonnée fh, & qu'ainſi la courbe BhO eſt la *logarithmique*, puiſque l'on ſçait que l'eſpace compris entre la logarithmique & ſon aſymptote eſt égal au rectangle de l'ordonnée qui le termine multipliée par la ſoûtangente qui eſt conſtante, & puiſque dans notre conſtruction l'ordonnée au point S eſt infiniment petite. Qu'on tire la tangente ht qui rencontre l'aſymptote en t, & ſur fh la perpendiculaire pq, & les triangles pqh, tfh, donneront pq ou $fm = \frac{ft \times gh}{fh} = \frac{ft \times dv}{v}$, donc $fm \times fh = ft \times dv = \frac{vr^n dx}{x^n}$; en comparant cette équation avec cette autre $AC \times dv = \frac{vr^n dx}{x^n}$, on voit que $ft = AC$, c'eſt-à-dire, que la ſoûtangente de la logarithmique eſt égale à la hauteur de l'atmoſphére ſi elle avoit partout la même denſité qu'au point A.

Si la loi de la peſanteur étoit en raiſon directe d'une fonction quelconque de la diſtance au centre S, la logarithmique s'étendroit du point B vers le point F, & la conſtruction ſeroit à peu-près ſemblable à celle de l'autre cas. *C. Q. F. T.*

PROBLÈME XIV.

124. *LA loi de la peſanteur étant comme une puiſſance quelconque* n *de la diſtance au centre, déterminer le temps de la chûte d'un corps qui tombe en ligne droite.*

SOIT S (*fig.* 53.) le centre, SA une droite donnée par laquelle on ſuppoſe qu'un corps tombe librement ; prenant un point quelconque P, & nommant SA, a ; SP, x ; le temps de la chûte par AP, t ; la viteſſe du corps au point P, v ; la viteſſe, qu'on peut regarder comme uniforme pour un intervalle de temps infiniment petit, eſt en raiſon directe de l'eſpace parcouru, & inverſe du temps, c'eſt-à-dire, $v = \frac{dx}{dt}$ ou plutôt $v = \frac{-dx}{dt}$; & la force accélératrice étant par l'hypothéſe comme x^n, eſt auſſi en raiſon directe de la viteſſe qu'elle produit durant un inſtant infiniment petit, & en raiſon réciproque de cet inſtant, ce qui donne $x^n = \frac{dv}{dt}$: de ces deux équations l'on tire $vdv = -x^n dx$ & delà $\frac{vv}{2} = -\frac{x^{n+1}}{n+1}$, ou plutôt, comme cette viteſſe eſt nulle lorſque $x = a$, $\frac{vv}{2} = \frac{1}{n+1} \times \overline{a^{n+1} - x^{n+1}}$, c'eſt-à-dire que v eſt proportionnelle à $\sqrt{\frac{1}{n+1} \times \overline{a^{n+1} - x^{n+1}}}$; mettant donc cette valeur dans l'équation $v = \frac{-dx}{dt}$, on a $dt = \frac{-dx}{\sqrt{\frac{1}{n+1} \times \overline{a^{n+1} - x^{n+1}}}}$.

Si la peſanteur eſt réciproquement comme le quarré de la diſtance, c'eſt-à-dire ſi $n = -2$, alors on

on a $dt = \frac{-dx}{\sqrt{-a^{-1}+x^{-1}}} = \frac{-\sqrt{a}\times x^{\frac{1}{2}}dx}{\sqrt{a-x}}$: cette différentielle se rapporte à la forme 48, par laquelle on trouve $t = \sqrt{ax-xx}+a$ (PBO) négligeant la constante $\sqrt{a}$; d'où il est clair qu'en décrivant sur le diamétre SA (*fig.* 53.) la demi-circonférence ADS, & tirant l'ordonnée PD, on aura $PD = \sqrt{aa-xx}$, & puisque le rayon est à la tangente ou le co-sinus au sinus de l'angle PBO, comme x à $\sqrt{ax-xx}$, le module étant SA, il n'y a qu'à décrire du centre S avec le rayon SA l'arc AN, & mener la droite SDN, & l'on voit que l'angle PBO de la formé est ici PSD, & a (PBO) = AS (PSD) = AN, mais l'arc AN est égal à l'arc AD, donc $t =$ PD + AD, c'est-à-dire que le temps de la chûte par AP est proportionnel à PD + AD.

Maintenant qu'on prenne la partie AC infiniment petite, & tirant la perpendiculaire CBM qui coupe les deux circonférences en B & M, l'on voit que pendant que le corps tombe de A en C, un autre corps faisant sa révolution dans le cercle AN autour du centre S décriroit l'arc AM, mais puisque $AC = \frac{\overline{AB}^2}{AS} = \frac{\overline{AM}^2}{2AS}$, on tire $AM = AB\sqrt{2}$; & puisque l'arc infiniment petit AB se confond avec son sinus CB, le temps de la chûte par AC sera représenté par 2AB : de plus, l'on sçait que les vitesses des corps

qui font leurs révolutions dans des cercles concentriques ſont en raiſon réciproque des racines quarrées des rayons, d'où il ſuit que, r marquant le rayon du cercle dans lequel un corps décriroit un arc égal à 2AB tandis qu'un autre corps décrit dans le cercle AN l'arc AM, on aura $AB\sqrt{2} . 2AB :: \sqrt{n} . \sqrt{a}$, ce qui donne $r = \frac{a}{2}$, par conſéquent décrivant du centre S avec le rayon $SO = \frac{AS}{2}$ la demi-circonférence OFH, & prenant l'arc $OF = PD + AD$, pendant qu'un corps tomberoit de A en P, un autre corps décriroit uniformement l'arc OF, & ainſi le temps de la chûte par la ligne entiére AS eſt égal à la moitié du temps périodique du corps qui décrit le cercle OFH. C'eſt auſſi la conſtruction qu'en donne M. *Newton prop.* 35. *&* 36. *du premier livre des Princ. Mathem.*

Delà il eſt facile de ſupputer le temps qu'il faudroit à une planéte pour tomber de ſon orbite au centre du mouvement : car les temps périodiques dans différens cercles étant comme les racines quarrées des cubes des rayons, le temps de la révolution dans le cercle AN eſt à celui de la révolution dans le cercle OFH comme $\sqrt{8}$ à 1, ou $2\sqrt{2}$ à 1 ; donc ſi T dénote le temps de la révolution dans le cercle AN, le temps de la chûte par AS ſera $\frac{T}{4\sqrt{2}}$. Si on veut appliquer ce calcul à la Lune, on aura $T = 27$;

$7^h. 43'$, ce qui donne $\frac{T}{4\sqrt{2}} = 4^j. 19^h. 55'$, qui eſt l'intervalle du temps que la Lune employeroit à tomber de ſon orbite juſqu'au centre de la Terre dans l'hypothéſe que la peſanteur eſt partout réciproquement comme le quarré de la diſtance à ce centre.

Si la peſanteur eſt proportionnelle à la diſtance SP, alors $n = 1$, & $dt = \frac{-dx}{\sqrt{\frac{1}{2} \times aa - xx}}$, ou ſimplement $dt = \frac{-dx}{\sqrt{aa - xx}}$, & par la forme $48\ t = 1$ (PBO) ou a (PBO) en multipliant l'intégrale par la donnée a; d'où il ſuit que puiſque le ſinus eſt au co-ſinus de l'angle PBO comme $\sqrt{aa - xx}$ à x, ou bien le rayon au co-ſinus comme a à x, il ne faut que du centre S avec le rayon SA décrire le quart de cercle AEQ *(fig. 54.)*, & tirant le ſinus PE, on aura l'arc AE = a (PBO); donc le temps de la chûte par AP eſt proportionnel à l'arc AE. Enſuite prenant la partie AC infiniment petite, & menant le ſinus CM, puiſqu'un corps tomberoit de A en C dans le temps qu'un autre décriroit l'arc AM, & puiſque le temps de la chûte par AC eſt au temps de la chûte par AS comme AM à AQ, & que le temps qu'un corps employeroit à décrire l'arc AM eſt à celui qu'il employeroit à décrire le quart de cercle AMQ, comme AM à AQ, il eſt évident que le temps de la chûte par AS eſt égal au temps

qu'un autre corps employeroit à décrire le quart de cercle AMQ.

Delà il eſt facile dans cette hypothéſe de trouver le temps de la chûte des corps: ainſi puiſque cette loi a lieu dans l'intérieur de la terre, & puiſque le temps périodique de la Lune eſt à celui d'une Planéte qui feroit ſa révolution à la diſtance du rayon de la Terre, comme $60\frac{1}{2}$ à 1, on trouve que le temps périodique de cette nouvelle Planéte, ſeroit de $1^{h}.\ 24\frac{11}{2}'$, dont le quart, ſçavoir 21 minutes, eſt le temps qu'il faudroit à un corps pour tomber de la ſurface de la Terre au centre. Ceci s'accorde avec *la prop.* 38. *lib.* 1. *Princ. Mathem. Newt. C. Q. F. T.*

PROBLÈME XV.

125. *LA gravité étant ſuppoſée uniforme, déterminer le mouvement d'un corps qui tombe ou qui monte dans un milieu dont la denſité eſt partout égale, & dont la réſiſtance eſt comme une puiſſance quelconque n de la viteſſe du corps qui le traverſe.*

SOIT nommée p la peſanteur, r la réſiſtance du milieu, & lorſque le corps tombe, x l'eſpace parcouru par le corps depuis le commencement de ſa chûte, t le temps qu'il a employé à le parcourir, & v la viteſſe acquiſe pendant le temps t. Cela poſé, on peut regarder le mouvement du corps comme uniforme pendant un inſtant infiniment petit, & par conſéquent durant cet inſtant l'eſpace

parcouru eſt en raiſon compoſée de la viteſſe & du temps, c'eſt-à-dire $dx = v\,dt$. Puiſque la peſanteur accélére le mouvement du corps, & que la réſiſtance du milieu le retarde, la premiére étant ſuppoſée plus forte que la ſeconde, il n'y a que leur différence $p - r$ qui accélére le mouvement du corps; or toute force accélératrice eſt meſurée par la viteſſe qu'elle produit pendant un inſtant diviſée par ce même inſtant, ainſi $p - r = \frac{dv}{dt}$: de ces deux équations ou proportions on tire $dx = \frac{v\,dv}{p - r}$; mais puiſque par l'hypothéſe r eſt en même raiſon que v^n ou plutôt $\frac{v^n}{p^{n-1}}$, mettant cette valeur de r dans la formule, il vient $dx = \frac{p^{n-1} v\,dv}{p^n - v^n}$, & $dt = \frac{p^{n-1}\,dv}{p^n - v^n}$.

Si la réſiſtance eſt comme le quarré de la viteſſe, on aura $n = 2$, & $dx = \frac{p v\,dv}{pp - vv}$, & $dt = \frac{p\,dv}{pp - vv}$: par la premiére forme on trouve $x = -\frac{p}{2}\left\{\frac{pp - vv}{pp}\right\} = \frac{p}{2}\left\{\frac{pp}{pp - vv}\right\}$: mais de ce que $r = \frac{vv}{p}$, on déduit $pp \cdot vv :: p \cdot r$, & $pp \cdot pp - vv :: p \cdot p - r$, ce qui donne $x = \frac{p}{2}\left\{\frac{p}{p - r}\right\}$: par la ſeconde forme on trouve $t = \frac{1}{2}\left\{\frac{p + v}{p - v}\right\}$; donc l'eſpace x eſt proportionnel à la meſure ou au logarithme du rapport

$\frac{p}{p-r}$, & le temps t à la meſure ou au logarithme du rapport $\frac{p+v}{p-v}$: c'eſt pourquoi pour en avoir une conſtruction géométrique, on tirera la droite CA (*fig.* 55.) qui repréſentera la peſanteur p, on prendra AK pour marquer la réſiſtance r, & AP enſorte qu'on ait AC . AP :: AP . AK ; d'où il eſt clair que AP marque la viteſſe v ; enſuite élevant la perpendiculaire CH, on décrira entre les aſymptotes CH, CA, une hyperbole quelconque NB, & menant les ordonnées KN, AB, on aura l'eſpace ABNK pour la meſure ou le logarithme du rapport $\frac{CA}{CK} = \frac{p}{p-r}$, donc l'eſpace x eſt proportionnel à l'eſpace ABNK : prenant auſſi dans CA prolongée Ap = AP, & menant les ordonnées PM, pm, l'eſpace hyperbolique PMmp eſt la meſure du rapport $\frac{Cp}{CP} = \frac{p+v}{p-v}$, donc le temps t eſt proportionnel à l'eſpace PMmp.

Si le corps eſt jetté en haut, dans ce cas la peſanteur & la réſiſtance du milieu concourent toutes deux pour retarder le mouvement du corps, ce qui fait qu'on a $p + r = \frac{-dv}{dt}$, & $dx = v\,dt$, d'où l'on tire $dx = \frac{-v\,dv}{p+r} = \frac{-p^{n-1}v\,dv}{p^n+v^n}$, & $dt = \frac{-dv}{p+r} = \frac{-p^{n-1}dv}{p^n+v^n}$: ſi $n = 2$, alors il vient $dx =$

$\frac{-pvdv}{pp+vv}$, & $dt = \frac{-pdv}{pp+vv}$; par la premiére forme on a $x = -\frac{p}{2}\left\{\frac{pp+vv}{pp}\right\} = -\frac{p}{2}\left\{\frac{p+r}{p}\right\}$, & par la ſeconde forme $t = -1$ (PBO) le rayon étant à la tangente de l'angle PBO comme p à v : d'où il eſt clair qu'en prenant de l'autre côté du point A, Ak = AK, Ap = AP, & tirant l'ordonnée kl, l'eſpace hyperbolique ABlk eſt la meſure du rapport $\frac{Ck}{CA} = \frac{p+r}{p}$, (on a pris les points k & p de l'autre côté du point A à cauſe qu'on a $-\left\{\frac{p+r}{p}\right\}$), donc l'eſpace x qui reſte à parcourir juſqu'à ce que le corps ait perdu tout ſon mouvement eſt proportionnel à l'eſpace ABlk. Enſuite prolongeant la ligne BA enſorte que AD = AC, & du centre D avec le rayon DA décrivant un arc de cercle AE, & tirant la ſécante Dp qui coupe le cercle en t, l'arc At eſt la meſure de l'angle ADt dont le rayon eſt à la tangente comme AD à Ap, ou comme p à v, par conſéquent l'angle ADt eſt égal à l'angle PBO, & l'arc At proportionnel au temps qui reſte au mobile pour monter avant que de perdre tout ſon mouvement.

Et ſi l'expoſant n étoit égal à un autre nombre quelconque poſitif ou négatif, entier ou rompu, on trouveroit toujours la ſolution du Problême par les autres formes des tables. *C. Q. F. T.*

Delà on peut trouver l'eſpace parcouru dans un temps donné par un corps qui deſcend ou monte dans un milieu réſiſtant. Soit AB, b ; & l'eſpace que le corps parcourt en deſcendant étant exprimé par ABNK, la différence de cet eſpace eſt $\frac{bpdr}{p-r}$ ou $\frac{2bpvdv}{pp-vv}$ dans l'hypothéſe que la réſiſtance eſt comme le quarré de la viteſſe : enſuite nommant s l'eſpace que le corps décriroit uniformement dans un temps quelconque avec la viteſſe AC qui eſt la plus grande que le corps puiſſe acquérir en tombant dans le milieu réſiſtant, les différences des eſpaces parcourus dans un temps donné infiniment petit ſont comme les viteſſes, donc on aura $ds . dx$ ou $\frac{2bpvdv}{pp-vv}$ :: AC ou p . AP ou v ; ce qui donne $ds = \frac{2bp^2dv}{pp-vv}$, & par la ſeconde forme on tire $s = bp\left\{\frac{p+v}{p-v}\right\} =$ PMmp ; donc les temps étant ſuppoſés égaux, on a $x . s$ :: ABNK . PMmp.

Si le corps montoit, on auroit $ds . dx$ ou $\frac{-2bpvdv}{pp+vv}$ :: $p . v$, ce qui donneroit $s = -2b \times At$, & ſi on prend AB $= \frac{AC}{4}$, on aura $2b \times At = \frac{p}{2} \times At =$ au ſecteur ADt, d'où l'on tire $x . s$ :: ABlk, ADt.

Maintenant ſoit P le temps que le corps employe en

en deſcendant dans le milieu réſiſtant pour acquérir la viteſſe AP, ce temps, comme nous avons vû, eſt exprimé par l'eſpace PM*mp*; ſoit *t* le temps que le corps employeroit à acquérir cette même viteſſe AP en tombant librement, & ſi on mene infiniment proche de BA les deux ordonnées *ba*, *eq*, également éloignées de BA, & qu'on tire BD paralléle à AC; *dt* repréſentera le temps que le corps employe à acquérir la viteſſe infiniment petite A*a* ſoit qu'il tombe librement ou dans le milieu réſiſtant; ainſi on aura *dt*. *t* :: A*a*. AP :: AB*ba*. ABQP; & auſſi *dt*. P :: *abeq*. PM*mp*; par conſéquent, puiſque *abeq* = 2AB*ba*, il vient *t*. P :: 2ABQP. PM*mp*: & ſi G marque le temps qu'il faudroit au corps pour acquérir la viteſſe AC en tombant librement, on aura G. P :: 2CABD. PM*mp*.

Si le corps monte, & que P dénote le temps à la fin duquel le corps aura perdu le reſte A*p* de ſa viteſſe, & *t* le temps qui reſteroit au corps, qui monteroit librement, pour perdre la même viteſſe A*p*, on auroit *dt*. *t* :: A*q*. A*p*, & *dt*. P :: A*r* ou A*q*. A*t*; donc *t*. P :: A*p*. A*t*.

De ce qu'on vient de démontrer on déduira la formule que donne M. *Newton*, *prop.* 40. *lib.* 2. *Phil. Nat. Princ. Math.* pour trouver l'eſpace parcouru pendant un temps donné par un corps qui tombe dans un fluide : car nommant H la plus grande viteſſe que le corps puiſſe acquérir en tombant & qui eſt repréſentée par AC, on a G. P ::

$2CA \times AB . PMmp$ ou $CA \times AB \left\{\frac{H+v}{H-v}\right\} :: 2 . 1 \left\{\frac{H+v}{H-v}\right\}$, ce qui donne en supposant $m = 0$, 43429448 &c. log. $\frac{H+v}{H-v} = \frac{2mP}{G}$ (par l'art. 18.); soit $\frac{H+v}{H-v} = N$, & on aura $v = \frac{N-1}{N+1} H$, & $AK = \frac{vv}{H} = \frac{\overline{N-1}^2}{\overline{N+1}^2} H$ & par conséquent $CK = \frac{4N \times H}{\overline{N+1}^2}$ & $\frac{CA}{CK} = \frac{\overline{N+1}^2}{4N}$; d'où en reprenant la proportion trouvée ci-dessus on a $x . s :: ABNK$ ou log. $\frac{\overline{N+1}^2}{4N} . PMmp$ ou log. N; soit F l'espace que parcourroit un corps en tombant librement pendant le temps G, & 2F sera l'espace qu'il parcourroit uniformement durant le même temps avec la viteſſe H acquiſe à la fin de ce temps, ce qui donne $G . P :: 2F . s = \frac{2PF}{G}$, donc on aura $x = \frac{2PF}{G} \times \log. \frac{\overline{N+1}^2}{4N} \times \frac{1}{\log. N}$, mais $\frac{\overline{N+1}^2}{4N} = \frac{N \times \overline{N+1}^2}{4NN}$, & ſi on nomme L le logarithme de $\frac{N+1}{N}$ pris dans les tables ordinaires, on aura $2L = \log. \frac{\overline{N+1}^2}{NN}$ & $\log. \frac{N \times \overline{N+1}^2}{4NN} = 2L + \log. N - \log. 4$, & cette équation étant diviſée par

le log. N donne log. $\frac{\overline{N+1}^{2}}{4N} \times \frac{1}{\log. N} = \frac{2L}{\log. N} + 1 - \frac{\log. 4}{\log. N}$; d'où en ſubſtituant au lieu du log. N ſa valeur $\frac{2mP}{G}$, l'on trouve $x = \frac{2LF}{m} + \frac{2PF}{G} - \frac{F \times \log. 4}{m}$, ou puiſque $\frac{2}{m} = 4,6051702$, & $\frac{\log. 4}{m} = \frac{0,60205999}{m}$ $= 1,3862944$, on aura $x = 4,6051702\,LF + \frac{2PF}{G} - 1,3862944\,F$.

PROBLÊME XVI.

126. *L'ATTRACTION qu'exercent les particules de la matiére étant ſuppoſée en raiſon réciproque des quarrés des diſtances, trouver la force avec laquelle un ſphéroïde homogéne attire un corpuſcule, placé ſur l'extrémité de ſon axe.*

ON ſuivra ici le raiſonnement de M. NEWTON, & on donnera deux ſolutions de ce Problême, la premiére ſuivant la méthode de NEWTON, & l'autre ſuivant celle de M. CÔTES, afin qu'en les comparant enſemble on voye que, quoique toutes les deux ſoient très-élégantes, la ſeconde néanmoins eſt plus ſimple dans ſa conſtruction & abrége beaucoup le calcul dans la pratique. Pour trouver l'attraction d'un ſolide, il faut auparavant déterminer celle d'une ſurface; c'eſt pourquoi ſur la ligne PA (*fig.* 56.) ſoit élevée la perpendiculaire AE, laquelle ſi on ſuppoſe qu'elle tourne autour

de PA lui demeurant toujours perpendiculaire, décrira une ſurface circulaire ; cela poſé, ſi on ſuppoſe un corpuſcule placé au point P, & qu'on tire à un point quelconque C la ligne PC & Pc infiniment proche de PC, & ſur Pc la perpendiculaire Cm, nommant PA, a ; PC, x ; & l'attraction que le point A exerce ſur le corpuſcule étant ſuppoſée égale à l'unité, celle que le point C exerce ſur le même corpuſcule dans la direction PC ſera $\frac{aa}{xx}$, & dans la direction PA $\frac{aa}{xx} \times \frac{a}{x}$; & puiſque l'anneau circulaire compris entre les circonférences décrites des rayons AC, Ac, eſt proportionnel au produit AC x Cc, il s'enſuit que cet anneau attire le corpuſcule P dans la direction PA avec une force proportionnelle à $\frac{a^3}{x^3}$ x AC x Cc, mais à cauſe des triangles ſemblables PAC, Cmc, on a PC . AC :: Cc . mc, ce qui donne AC x Cc = PC x mc = xdx, par conſéquent l'attraction de l'anneau eſt exprimée par $\frac{a^3 dx}{xx}$ dont l'intégrale complette eſt $a^3 \times \frac{1}{a} - \frac{1}{x} = a^3 \times \frac{x-a}{ax}$, donc la force avec laquelle la ſurface du cercle décrit du rayon AC attire le corpuſcule P dans la direction PA eſt proportionnelle à $\frac{PC-PA}{PC}$ ou à $1 - \frac{PA}{PC}$.

Maintenant ſoit une ligne courbe ACB (*fig.* 57.) qui faiſant ſa révolution autour de l'axe AB forme un corps ſolide, & qu'on tire une ordonnée quelconque ED, & ſi on ſuppoſe un corpuſcule placé au point P pris dans l'axe prolongé & qu'on tire PD, la force avec laquelle la ſurface du cercle décrit du rayon ED attire le corpuſcule P eſt proportionnelle, comme nous venons de voir, à $1 - \frac{PE}{PD}$, c'eſt-à-dire, nommant PA, a; AE, x; ED, y; à $1 - \frac{a+x}{\sqrt{a+x^2+yy}}$; multipliant cette quantité par dx, on voit que la différentielle $dx - \frac{a\,dx + x\,dx}{\sqrt{a+x^2+yy}}$ exprime la différence de la force avec laquelle la partie du ſolide formée par la révolution de l'arc AD attire le corpuſcule P. Soit donc ACB une circonférence de cercle dont le centre eſt S, & nommant AS, b, la différentielle précédente deviendra $dx - \frac{a\,dx}{\sqrt{aa+2a+2bxx}} - \frac{x\,dx}{\sqrt{aa+2a+2bxx}}$, dont l'intégrale complette trouvée par la forme 47 eſt $x - \frac{2aa+3ab+\overline{a+b}xx}{3\times\overline{a+b}^2}\times\sqrt{aa+2a+2bxx} + \frac{2a^3+3aab}{3\times\overline{a+b}^2}$; & lorſque $x = 2b$, alors $\sqrt{aa+2a+2bxx} = a+2b$, & l'intégrale dans

ce cas se réduit à $\frac{2b^3}{3 \times a+b^2} = \frac{2\overline{AS}^3}{3\overline{PS}^2}$ qui marque l'attraction du corpuscule P vers la sphére ACBG.

Si la courbe ACB est une ellypse, dont les deux axes sont AB, GC; nommant AS, b; CS, r; le paramétre p; on aura $yy = px - \frac{p}{2b}xx$, & la différence de la force avec laquelle la portion du sphéroïde formée par la révolution de l'arc AD attire le corpuscule P est $dx - \frac{adx}{\sqrt{aa + \overline{2a+p} \times x + \frac{2b-p}{2b}xx}} - \frac{xdx}{\sqrt{aa + \overline{2a+p} \times x + \frac{2b-p}{2b}xx}}$: on trouvera facilement les intégrales des deux derniéres différentielles par la huitiéme forme des tables que donne M. NEWTON à la fin de son Traité *de Quadr. Curv.* ou bien on les trouvera encore par les articles 87 & 103 ci-devant, étant supposée connue l'intégrale de $-dx\sqrt{aa + \overline{2a+p} \times x + \frac{2b-p}{2b}xx}$: or il est clair qu'en prolongeant ED en R enforte que ER = PD = $\sqrt{aa + \overline{2a+p} \times x + \frac{2b-p}{2b}xx}$, & nommant PD ou ER, u, on aura $uu = aa + \overline{2a+p} \times x + \frac{2b-p}{2b}xx$, ce qui fait voir que la courbe MRKN qui passe par

tous les points R eſt une ſection conique, & que l'intégrale de $dx\sqrt{aa + \overline{2a + p} \times x + \frac{2b-p}{2b} xx}$ eſt l'eſpace AKRE, AK étant égale à PA & paralléle à ER ; pour ce qui eſt de la courbe NKRM, on voit que c'eſt une hyperbole lorſque $2b > p$, une ellypſe lorſque $2b < p$, & une parabole lorſque $2b = p$; ce dernier cas n'a lieu que lorſque la courbe ACB eſt un cercle, lequel cas nous avons déja réſolu : nommant donc A l'eſpace AKRE, on trouve par les articles déja cités que l'intégrale de $\frac{adx}{\sqrt{aa + \overline{2a + p} \times xx + \frac{2b-p}{2b} xx}}$ eſt

$$\frac{-\overline{8ab - 4ap} \times A + \overline{4ab - 2ap} \times ux + \overline{4aab + 2abp} \times u}{2aap + 4abp + bpp},$$

& celle de $\frac{xdx}{\sqrt{aa + \overline{2a + p} \times xx + \frac{2b-p}{2b} xx}}$ eſt

$$\frac{\overline{8ab + 4bp} \times A - \overline{4ab + 2bp} \times ux - 4aab \times u}{2aap + 4abp + bpp}$$; & comme ces intégrales doivent s'évanouir lorſque $x = 0$, en les rendant complettes, on trouve que leur ſomme eſt $\frac{\overline{4a + 4b} \times A - \overline{2a + 2b} \times ux + 2ab \times u - 2aab}{2aa + 4ab + bp}$: enſuite faiſant $x = 2b$, $u = a + 2b$, A marquera l'eſ-

pace AKMB, & mettant auſſi $2rr$ au lieu de bp à cauſe de la proportion $b . r :: 2r . p$, la ſomme ci-deſſus deviendra $\frac{\overline{2a+2b} \times A - 2aab - 4abb - 4b^3}{aa+2ab+rr}$ laquelle étant ôtée de $2b$, on trouve pour reſte $\frac{4aab + 8abb + 4b^3 + 2brr - \overline{2a+2b} \times A}{aa+2ab+rr} =$ $\frac{2brr + \overline{2a+2b} \times \overline{2ab+2bb} - A}{aa+2ab+rr}$; mais ſi on tire la ligne KM le trapéze AKMB eſt égal à $2ab + 2bb$, par conſéquent l'intégrale précédente ſe change en celle-ci $\frac{2brr - \overline{2a+2b} \times KMRK}{aa+2ab+rr} =$ $\frac{2AS \times \overline{CS}^2 - 2PS \times KMRK}{\overline{PS}^2 + \overline{CS}^2 - \overline{AS}^2}$ qui exprime l'attraction que le ſphéroïde homogéne exerce ſur le corpuſcule P: donc la force avec laquelle le corpuſcule P eſt attiré par le ſphéroïde eſt à celle avec laquelle il eſt attiré par la ſphére dont le diamétre eſt AB comme $\frac{AS \times \overline{CS}^2 - PS \times KMRK}{\overline{PS}^2 + \overline{CS}^2 - \overline{AS}^2}$ à $\frac{\overline{AS}^3}{3\overline{PS}^2}$, qui eſt la proportion marquée par M. *Nevvton Coroll. 2. prop. 91. lib. 1. Phil. Nat. Princ. Math.*

Maintenant pour venir au cas que nous nous ſommes principalement propoſé, qui eſt celui où le corpuſcule P eſt placé à l'extrémité de l'axe en A; parce qu'il

qu'il ſert pour déterminer la figure de la terre, on voit que dans ce cas l'attraction du ſphéroïde ſera à celle de la ſphére, comme $\frac{\overline{CS}^2 - PMRP}{\overline{CS}^2}$ à $\frac{1}{3}$ (*fig.* 58.) ou comme $\overline{CS}^2 - PMRP$ à $\frac{1}{3}\overline{CS}^2$.

Pour réſoudre ce cas par la méthode de M. CÔTES; puiſque PA $= a = 0$, GC étant le premier axe, la formule de l'attraction vers le ſphéroïde ſera $dx - \frac{xdx}{\sqrt{px + \frac{2b-p}{2b}xx}}$ ou $dx - \frac{x^{\frac{1}{2}}dx}{\sqrt{\frac{2rr}{b} - \frac{ccx}{bb}}}$ en mettant cc au lieu de $rr - bb$; en comparant la derniére différentielle à la forme 48 on trouve que ſon intégrale eſt $-\frac{bb}{cc}\sqrt{\frac{2rrx}{b} - \frac{ccxx}{bb}} - \frac{2bbrr}{c^3}$ (PBO), le rayon étant à la tangente de l'angle PBO comme $\frac{r}{b}$ à $\sqrt{\frac{2rr}{bx} - \frac{cc}{bb}}$, mais parce que cette tangente ne s'évanouit point lorſque $x = 0$, mais au contraire devient infinie, il eſt clair qu'elle dénote le complément de l'angle qu'on cherche, & par conſéquent puiſque le rayon eſt moyen proportionnel entre la tangente d'un angle & la tangente de ſon complément, la tangente de l'angle véritable PBO eſt $\frac{ccx^{\frac{1}{2}}}{bb\sqrt{\frac{2rr}{b} - \frac{ccx}{bb}}}$, donc le rayon eſt à la tangente de

l'angle BPO comme $\frac{c}{b}$ à $\frac{ccx^{\frac{1}{2}}}{bb\sqrt{\frac{2rr}{b}-\frac{ccx}{bb}}}$ ou comme b à $\frac{cx}{\sqrt{\frac{2rrx}{b}-\frac{ccxx}{bb}}}$, & l'intégrale complette $-\frac{bb}{cc}\sqrt{\frac{2rrx}{b}-\frac{ccxx}{bb}+\frac{2bbrr}{c^3}}$ (PBO) : enſuite faiſant $x = 2b$, l'intégrale totale de $dx - \frac{x^{\frac{1}{2}}dx}{\sqrt{\frac{2rr}{b}-\frac{ccx}{bb}}}$ eſt $\frac{2brr}{cc}-\frac{2bbrr}{c^3}$ (PBO) le rayon étant à la tangente dans ce cas comme b à c ; d'où l'on voit qu'en décrivant du centre P avec le rayon PS un arc de cercle, & tirant au foyer F de l'ellypſe la ligne PF qui coupe le cercle en N, on aura $SF = c$, & $PBO = SPF$, & l'arc SN égal à la meſure de l'angle SPF au module PS, c'eſt-à-dire $SN = b$ (SPF), & puiſque la force avec laquelle la ſphére dont le diamétre eſt PB attire le corpuſcule P eſt exprimée par $\frac{2b}{3}$, il s'enſuit que cette attraction de la ſphére eſt à celle du ſphéroïde, comme c^3 à $3rr \times c - SN$, c'eſt-à-dire, comme $\overline{SF}^3$ à $3CS \times \overline{SF - SN}$.

Si l'ellypſe ACBG faiſoit ſa révolution autour du premier axe GC, la formule de l'attraction devien-

droit $dx - \frac{x^{\frac{1}{2}}dx}{\sqrt{\frac{2bb}{r} + \frac{ccx}{rr}}}$ & en prenant l'intégrale par la même forme 48, on trouve que la force avec laquelle la ſphére dont le diamétre eſt GC attire un corpuſcule placé en G eſt à celle avec laquelle le ſphéroïde l'attire comme c^3 à $3bbr\left\{\frac{r+c}{b}\right\} - 3bbc$, donc ſi on prend ſur l'axe SG la partie $SL = r\left\{\frac{r+c}{b}\right\} = PF\left\{\frac{PF+FS}{PS}\right\}$, l'attraction de la ſphére ſera à celle du ſphéroïde comme $\overline{CF}^3$ à $3\overline{AS}^2 \times FL$. *C. Q. F. T.*

Il eſt facile, comme on voit, d'appliquer le calcul à cette derniére ſolution, lequel deviendroit fort pénible en ſe ſervant de la premiére, ſurtout ſi on vouloit déterminer la valeur de l'eſpace conique PMRP par le moyen d'une ſérie. Qu'on ſuppoſe donc que PS eſt à CS comme 100 à 101, & on aura SF = 14, 177447, & puiſque PS eſt à SF, comme le rayon eſt à la tangente de l'angle SPF, on trouve que cet angle eſt de 8°. 4'. $9\frac{11}{12}''$ = 8, 06930, ce qui donne l'arc SN = 14, 083584, d'où l'on tire SF — SN = 0, 093863 dont le logarithme eſt $\overline{2}$, 9724944 ; le logarithme donc de $3\overline{CS}^2 \times \overline{SF - SN}$ eſt 3, 4582583 duquel ôtant 3, 4547941 logarithme de $\overline{SF}^3$ la différence eſt 34642 qui eſt à peu près égale à la différence des logarithmes des nombres 125 & 126 ; par conſéquent

la force d'attraction que le ſphéroïde formé par la révolution de l'ellypſe PCB autour du petit axe PB exerce ſur le corpuſcule P, eſt à celle de la ſphére dont le diamétre eſt PB ſur le même corpuſcule à peu-près comme 126 à 125.

Pareillement puiſque $\frac{PF+SF}{PS} = 1,15177447$ dont le logarithme eſt 0, 0613674$\frac{1}{2}$, on trouve PF $\left\{\frac{PF+SF}{PS}\right\} = 14,271681$, de ce nombre ôtant SF, il vient FL = 0, 094234, & $3\overline{PS}^{2} \times FL = 2827,02$ dont le logarithme eſt 3, 4513289 lequel étant ôté du logarithme 3, 4547941 on trouve la différence 34652 qui eſt encore à peu-près égale à la différence des logarithmes des nombres 125 & 126 : par conſéquent le ſphéroïde formé par la révolution de l'ellypſe GBC autour du premier axe GC attire le corpuſcule en G avec une force, qui eſt à celle avec laquelle la ſphére dont le diamétre eſt GC l'attire, à peu-près comme 125 eſt à 126. Ces proportions ſont les mêmes que M. NEWTON trouve par la premiére conſtruction *prop.* 19. *lib.* 3. *Phil. Nat. Princ. Math.*

AVERTISSEMENT.

AFIN qu'on puiſſe entendre ſans peine l'uſage des tables, j'ai cru qu'il ſeroit à propos d'en expliquer ici l'ordre & les termes.

On voit clairement que chaque table contient les différentes intégrales de la différentielle qui eſt miſe ſous le titre de Forme ſuivant les différentes valeurs de la quantité variable z : les nombres qui ſe trouvent dans la colomne θ ſont en deſcendant poſitifs juſqu'à o, enſuite ils ſont négatifs. Les modules β, γ, δ, &c. marquent le double des co-ſinus, & $\downarrow, \chi, \varphi$, &c. le double des ſinus des arcs AB, AC, AD, & de tous les arcs qui ont ces mêmes ſinus & co-ſinus, le rayon AO étant = 1. Une telle expreſſion β (BP : BO) marque la meſure ou le logarithme du rapport $\frac{BP}{BO}$ au module β, ou le logarithme de $\frac{BP}{BO}$ pris dans les tables ordinaires & multiplié par $\beta \times z$, 30258509; cette autre expreſſion $\downarrow$ (PBO) marque la meſure de l'angle PBO au module $\downarrow$, ou ce qui revient au même, l'arc de cercle décrit du centre B & du rayon $\downarrow$ & compris dans l'angle PBO, ou bien le nombre de dégrés de l'angle PBO multiplié par $\downarrow \times$ 0.01745329. Dans les endroits où il n'y a point de module marqué, il faut y ſous-entendre l'unité pour module.

θ	FORME I. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n}$.
&c.	
5.	$\frac{Dz^{4n}}{4nf} - \frac{Dez^{3n}}{3nff} + \frac{Deez^{2n}}{2nf^3} - \frac{De^3z^n}{nf^4} + \frac{De^4}{nf^5}$ ①
4.	$\frac{Dz^{3n}}{3nf} - \frac{Dez^{2n}}{2nff} + \frac{Deez^n}{nf^3} - \frac{De^3}{nf^4}$ ①
3.	$\frac{Dz^{2n}}{2nf} - \frac{Dez^n}{nff} + \frac{Dee}{nf^3}$ ①
2.	$\frac{Dz^n}{nf} - \frac{De}{nff}$ ①
1.	$\frac{D}{nf}$ ① Voyez fig. 27.
0.	$\frac{-D}{ne}$ ②
— 1.	$\frac{-D}{nez^n} + \frac{Df}{nee}$ ②
— 2.	$\frac{-D}{2nez^{2n}} + \frac{Df}{neez^n} - \frac{Dff}{ne^3}$ ②
— 3.	$\frac{-D}{3nez^{3n}} + \frac{Df}{2neez^{2n}} - \frac{Dff}{ne^3z^n} + \frac{Df^3}{ne^4}$ ②
— 4.	$\frac{-D}{4nez^{4n}} + \frac{Df}{3neez^{3n}} - \frac{Dff}{2ne^3z^{2n}} + \frac{Df^3}{ne^4z^n} - \frac{Df^4}{ne^5}$ ②
&c.	

1. *Cas.* $\begin{cases} OP : OA :: z^n : \frac{e}{f}; & ① = 1\ (BP : BO) \\ OP : OA :: \frac{1}{z^n} : \frac{f}{e}; & ② = 1\ (BP : BO) \end{cases}$

2. *Cas.* $\begin{cases} OP : OA :: z^n : \frac{-e}{f}; & ① = 1\ (AP : AO) \\ OP : OA :: \frac{1}{z^n} : \frac{-f}{e}; & ② = 1\ (AP : AO) \end{cases}$

θ	FORME II. $\frac{Dz^{n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{2Dz^{\frac{7}{2}n}}{7nf} - \frac{2Dez^{\frac{5}{2}n}}{5nff} + \frac{2Deez^{\frac{3}{2}n}}{3nf^3} - \frac{2De^3z^{\frac{1}{2}n}}{nf^4} + \frac{2De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{2Dz^{\frac{5}{2}n}}{5nf} - \frac{2Dez^{\frac{3}{2}n}}{3nff} + \frac{2Deez^{\frac{1}{2}n}}{nf^3} - \frac{2De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{2Dz^{\frac{3}{2}n}}{3nf} - \frac{2Dez^{\frac{1}{2}n}}{nff} + \frac{2Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{2Dz^{\frac{1}{2}n}}{nf} - \frac{2De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{2D}{nf}$ (I) Voyez fig. 28.
— 1.	$\frac{-2D}{nez^{\frac{1}{2}n}} - \frac{2D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-2D}{3nez^{\frac{3}{2}n}} + \frac{2Df}{neez^{\frac{1}{2}n}} + \frac{2Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-2D}{5nez^{\frac{5}{2}n}} + \frac{2Df}{3neez^{\frac{3}{2}n}} - \frac{2Dff}{ne^3z^{\frac{1}{2}n}} - \frac{2Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-2D}{7nez^{\frac{7}{2}n}} + \frac{2Df}{5neez^{\frac{5}{2}n}} - \frac{2Dff}{3ne^3z^{\frac{1}{2}n}} + \frac{2Df^3}{ne^4z^{\frac{1}{2}n}} + \frac{2Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[n]{z^n} : \sqrt[n]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{2}\sqrt[n]{\frac{f}{e}} \times \downarrow (PBO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[n]{z^n} : \sqrt[n]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{2}\sqrt[n]{\frac{-f}{e}} \times -(AP : AO) + (CP : CO)$

θ	FORME III. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{3Dz^{\frac{10}{3}n}}{10nf} - \frac{3Dez^{\frac{7}{3}n}}{7nff} + \frac{3Deez^{\frac{4}{3}n}}{4nf^3} - \frac{3De^3z^{\frac{1}{3}n}}{nf^4} + \frac{3De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{3Dz^{\frac{7}{3}n}}{7nf} - \frac{3Dez^{\frac{4}{3}n}}{4nff} + \frac{3Deez^{\frac{1}{3}n}}{nf^3} - \frac{3De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{3Dz^{\frac{4}{3}n}}{4nf} - \frac{3Dez^{\frac{1}{3}n}}{nff} + \frac{3Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{3Dz^{\frac{1}{3}n}}{nf} - \frac{3De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{3D}{nf}$ (I) Voyez fig. 29.
— 1.	$\frac{-3D}{2nez^{\frac{2}{3}n}} - \frac{3D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-3D}{5nez^{\frac{5}{3}n}} + \frac{3Df}{2neez^{\frac{2}{3}n}} + \frac{3Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-3D}{8nez^{\frac{8}{3}n}} + \frac{3Df}{5neez^{\frac{5}{3}n}} - \frac{3Dff}{2ne^3z^{\frac{2}{3}n}} - \frac{3Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-3D}{11nez^{\frac{11}{3}n}} + \frac{3Df}{8neez^{\frac{8}{3}n}} - \frac{3Dff}{5ne^3z^{\frac{5}{3}n}} + \frac{3Df^3}{2ne^4z^{\frac{2}{3}n}} + \frac{3Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{e}{f}}$;

$$(I) = \tfrac{1}{3}\sqrt[3]{\tfrac{ff}{ee}}x - \beta(BP:BO) + (DP:DO) + \downarrow(PBO)$$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{-e}{f}}$;

$$(I) = \tfrac{-1}{3}\sqrt[3]{\tfrac{ff}{ee}}x - (AP:AO) + \beta(CP:CO) + \downarrow(PCO)$$

FORME

θ	FORME IV. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{3Dz^{\frac{11}{3}n}}{11nf} - \frac{3Dez^{\frac{8}{3}n}}{8nff} + \frac{3Deez^{\frac{5}{3}n}}{5nf^3} - \frac{3De^3z^{\frac{2}{3}n}}{2nf^4} + \frac{3De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{3Dz^{\frac{8}{3}n}}{8nf} - \frac{3Dez^{\frac{5}{3}n}}{5nff} + \frac{3Deez^{\frac{2}{3}n}}{2nf^3} - \frac{3De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{3Dz^{\frac{5}{3}n}}{5nf} - \frac{3Dez^{\frac{2}{3}n}}{2nff} + \frac{3Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{3Dz^{\frac{2}{3}n}}{2nf} - \frac{3De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{3D}{nf}$ (I) Voyez fig. 29.
— 1.	$\frac{-3D}{ne z^{\frac{1}{3}n}} - \frac{3D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-3D}{4ne z^{\frac{4}{3}n}} + \frac{3Df}{nee z^{\frac{1}{3}n}} + \frac{3Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-3D}{7ne z^{\frac{7}{3}n}} + \frac{3Df}{4nee z^{\frac{4}{3}n}} - \frac{3Dff}{ne^3 z^{\frac{1}{3}n}} - \frac{3Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-3D}{10ne z^{\frac{10}{3}n}} + \frac{3Df}{7nee z^{\frac{7}{3}n}} - \frac{3Dff}{4ne^3 z^{\frac{4}{3}n}} + \frac{3Df^3}{ne^4 z^{\frac{1}{3}n}} + \frac{3Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{e}{f}}$;

$(I) = \frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{f}{e}}\,x + \beta(BP : BO) - (DP : DO) + \downarrow(PBO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{-e}{f}}$;

$(I) = \frac{-1}{3}\sqrt[3]{\frac{-f}{e}}\,x - (AP : AO) + \beta(CP : CO) - \downarrow(PCO)$

θ	FORME V. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{4Dz^{\frac{13}{4}n}}{13nf} - \frac{4Dez^{\frac{9}{4}n}}{9nff} + \frac{4Deez^{\frac{5}{4}n}}{5nf^3} - \frac{4De^3z^{\frac{1}{4}n}}{nf^4} + \frac{4De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{+Dz^{\frac{9}{4}n}}{9nf} - \frac{4Dez^{\frac{5}{4}n}}{5nff} + \frac{4Deez^{\frac{1}{4}n}}{nf^3} - \frac{4De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{4Dz^{\frac{5}{4}n}}{5nf} - \frac{4Dez^{\frac{1}{4}n}}{nff} + \frac{4Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{4Dz^{\frac{1}{4}n}}{nf} - \frac{4De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{4D}{nf}$ (I) Voyez fig. 30.
— 1.	$\frac{-4D}{3nez^{\frac{3}{4}n}} - \frac{4D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-4D}{7nez^{\frac{7}{4}n}} + \frac{4Df}{3neez^{\frac{3}{4}n}} + \frac{4Df}{nee}$ (II)
— 3.	$\frac{-4D}{11nez^{\frac{11}{4}n}} + \frac{4Df}{7neez^{\frac{7}{4}n}} - \frac{4Dff}{3ne^3z^{\frac{3}{4}n}} + \frac{4Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-4D}{15nez^{\frac{15}{4}n}} + \frac{4Df}{11neez^{\frac{11}{4}n}} - \frac{4Dff}{7ne^3z^{\frac{7}{4}n}} + \frac{4Df^3}{3ne^4z^{\frac{3}{4}n}} + \frac{4Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{f^3}{e^3}} \times -\alpha(BP:BO) + \beta(DP:DO) + \psi(PBO) + \psi(PDO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{4}\sqrt[4]{\frac{-f^3}{e^3}} \times -(AP:AO) + (EP:EO) + \chi(PCO)$

θ	FORME VI. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{4Dz^{\frac{15}{4}n}}{15nf} - \frac{4Dez^{\frac{11}{4}n}}{11nff} + \frac{4Dee z^{\frac{7}{4}n}}{7nf^3} - \frac{4De^3z^{\frac{3}{4}n}}{3nf^4} + \frac{4De^4}{nf^5}$ (I).
3.	$\frac{4Dz^{\frac{11}{4}n}}{11nf} - \frac{4Dez^{\frac{7}{4}n}}{7nff} + \frac{4Deez^{\frac{3}{4}n}}{3nf^3} - \frac{4De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{4Dz^{\frac{7}{4}n}}{7nf} - \frac{4Dez^{\frac{3}{4}n}}{3nff} + \frac{4Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{4Dz^{\frac{3}{4}n}}{3nf} - \frac{4De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{4D}{nf}$ (II). Voyez fig. 30.
— 1.	$\frac{-4D}{nez^{\frac{1}{4}n}} - \frac{4D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-4D}{5nez^{\frac{1}{4}n}} + \frac{4Df}{neez^{\frac{1}{4}n}} + \frac{4Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-4D}{9nez^{\frac{2}{4}n}} + \frac{4Df}{5neez^{\frac{1}{4}n}} - \frac{4Dff}{ne^3z^{\frac{2}{4}n}} - \frac{4Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-4D}{13nez^{\frac{13}{4}n}} + \frac{4Df}{9neez^{\frac{2}{4}n}} - \frac{4Dff}{5ne^3z^{\frac{1}{4}n}} + \frac{4Df^3}{ne^4z^{\frac{1}{4}n}} + \frac{4Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{f}{e}} \times + \beta(BP : BO) - \beta(DP : DO) + \psi(PBO) + \psi(PDO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{-\frac{e}{f}}$;

(I) $= -\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-f}{e}} \times - (AP : AO) + (EP : EO) - \chi(PCO)$

θ	FORME VII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{5}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{5Dz^{\frac{16}{5}n}}{16nf} - \frac{5Dez^{\frac{11}{5}n}}{11nff} + \frac{5Dee z^{\frac{6}{5}n}}{6nf^3} - \frac{5De^3z^{\frac{1}{5}n}}{nf^4} + \frac{5De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{5Dz^{\frac{11}{5}n}}{11nf} - \frac{5Dez^{\frac{6}{5}n}}{6nff} + \frac{5Deez^{\frac{1}{5}n}}{nf^3} - \frac{5De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{5Dz^{\frac{6}{5}n}}{6nf} - \frac{5Dez^{\frac{1}{5}n}}{nff} + \frac{5Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{5Dz^{\frac{1}{5}n}}{nf} - \frac{5De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{5D}{nf}$ (I) Voyez fig. 31.
— 1.	$\frac{-5D}{4nez^{\frac{4}{5}n}} - \frac{5D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-5D}{9nez^{\frac{9}{5}n}} + \frac{5Df}{4neez^{\frac{4}{5}n}} + \frac{5Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-5D}{14nez^{\frac{14}{5}n}} + \frac{5Df}{9neez^{\frac{9}{5}n}} - \frac{5Dff}{4ne^3z^{\frac{4}{5}n}} - \frac{5Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-5D}{19nez^{\frac{19}{5}n}} + \frac{5Df}{14neez^{\frac{14}{5}n}} - \frac{5Dff}{9ne^3z^{\frac{9}{5}n}} + \frac{5Df^3}{4ne^4z^{\frac{4}{5}n}} + \frac{5Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{5}\sqrt[5]{\frac{f^4}{e^4}} \times -\alpha\,(BP:BO) + \gamma\,(DP:DO) + (FP:FO) + \downarrow (PBO) + \chi\,(PDO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{e}{\frac{1}{f}}}$;

(I) $= \frac{-1}{5}\sqrt[5]{\frac{f^4}{e^4}} \times -(AP:AO) - \gamma\,(CP:CO) + \beta\,(EP:EO) + \chi\,(PCO) + \downarrow (PEO)$

θ	FORME VIII. $\frac{Dz^{n+\frac{4}{3}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{5Dz^{\frac{19}{3}n}}{19nf} - \frac{5Dez^{\frac{14}{3}n}}{14nff} + \frac{5Dee z^{\frac{9}{3}n}}{9nf^3} - \frac{5De^3z^{\frac{4}{3}n}}{4nf^4} + \frac{5De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{5Dz^{\frac{14}{3}n}}{14nf} - \frac{5Dez^{\frac{9}{3}n}}{9nff} + \frac{5Dee z^{\frac{4}{3}n}}{4nf^3} - \frac{5De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{5Dz^{\frac{9}{3}n}}{9nf} - \frac{5Dez^{\frac{4}{3}n}}{4nff} + \frac{5Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{5Dz^{\frac{4}{3}n}}{4nf} - \frac{5De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{5D}{nf}$ (I) Voyez fig. 31.
— 1.	$\frac{-5D}{nez^{\frac{1}{3}n}} - \frac{5D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-5D}{6nez^{\frac{6}{3}n}} + \frac{5Df}{neez^{\frac{1}{3}n}} + \frac{5Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-5D}{11nez^{\frac{11}{3}n}} + \frac{5Df}{6neez^{\frac{6}{3}n}} - \frac{5Dff}{ne^3z^{\frac{1}{3}n}} - \frac{5Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-5D}{16nez^{\frac{16}{3}n}} + \frac{5Df}{11neez^{\frac{11}{3}n}} - \frac{5Dff}{6ne^3z^{\frac{6}{3}n}} + \frac{5Df^3}{ne^4z^{\frac{1}{3}n}} + \frac{5Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{5}\sqrt[5]{\frac{f}{e}}x + \beta(BP : BO) - \gamma(DP : DO) - (FP : FO) + \downarrow(PBO) + \chi(PDO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{5}\sqrt[5]{\frac{-f}{e}}x - (AP : AO) - \gamma(CP : CO) + \beta(EP : EO) - \chi(PCO) - \downarrow(PEO)$

FORME IX. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{5}n-1}dz}{e+fz^n}$

θ	
&c.	
4.	$\frac{5Dz^{\frac{17}{5}n}}{17nf} - \frac{5Dez^{\frac{12}{5}n}}{12nff} + \frac{5Deez^{\frac{7}{5}n}}{7nf^3} - \frac{5De^3z^{\frac{2}{5}n}}{2nf^4} + \frac{5De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{5Dz^{\frac{12}{5}n}}{12nf} - \frac{5Dez^{\frac{7}{5}n}}{7nff} + \frac{5Deez^{\frac{2}{5}n}}{2nf^3} - \frac{5De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{5Dz^{\frac{7}{5}n}}{7nf} - \frac{5Dez^{\frac{2}{5}n}}{2nff} + \frac{5Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{5Dz^{\frac{2}{5}n}}{2nf} - \frac{5De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{5D}{nf}$ (I) Voyez fig. 31.
— 1.	$\frac{-5D}{3nez^{\frac{3}{5}n}} - \frac{5D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-5D}{8nez^{\frac{8}{5}n}} + \frac{5Df}{3neez^{\frac{3}{5}n}} + \frac{5Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-5D}{13nez^{\frac{13}{5}n}} + \frac{5Df}{8neez^{\frac{8}{5}n}} - \frac{5Dff}{3ne^3z^{\frac{3}{5}n}} - \frac{5Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-5D}{18nez^{\frac{18}{5}n}} + \frac{5Df}{13neez^{\frac{13}{5}n}} - \frac{5Dff}{8ne^3z^{\frac{8}{5}n}} + \frac{5Df^3}{3ne^4z^{\frac{3}{5}n}} + \frac{5Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{e}{f}}$;

$(I) = \frac{1}{5}\sqrt[5]{\frac{f^3}{e^3}} \times - \gamma\,(BP : BO) + \beta\,\{DP : DO) - (FP : FO) + \chi\,(PBO) - \downarrow\,(PDO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{-e}{f}}$;

$(I) = \frac{-1}{5}\sqrt[5]{\frac{-f^3}{e^3}} \times - (AP : AO) + \beta\,(CP : CO) - \gamma\,(EP : EO) + \downarrow\,(PCO) - \chi\,(PEO)$

FORME X. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{5}n-1}dz}{e+fz^n}$

θ	
&c.	
4.	$\frac{5Dz^{\frac{18}{5}n}}{18nf} - \frac{5Dez^{\frac{13}{5}n}}{13nff} + \frac{5Deez^{\frac{8}{5}n}}{8nf^3} - \frac{5De^3z^{\frac{3}{5}n}}{3nf^4} + \frac{5De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{5Dz^{\frac{13}{5}n}}{13nf} - \frac{5Dez^{\frac{8}{5}n}}{8nff} + \frac{5Deez^{\frac{3}{5}n}}{3nf^3} - \frac{5De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{5Dz^{\frac{8}{5}n}}{8nf} - \frac{5Dez^{\frac{3}{5}n}}{3nff} + \frac{5Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{5Dz^{\frac{3}{5}n}}{3nf} - \frac{5De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{5D}{nf}$ (I) Voyez fig. 31.
— 1.	$\frac{-5D}{2nez^{\frac{2}{5}n}} - \frac{5D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-5D}{7nez^{\frac{7}{5}n}} + \frac{5Df}{2neez^{\frac{2}{5}n}} + \frac{5Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-5D}{12nez^{\frac{12}{5}n}} + \frac{5Df}{7neez^{\frac{7}{5}n}} - \frac{5Dff}{2ne^3z^{\frac{2}{5}n}} - \frac{5Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-5D}{17nez^{\frac{17}{5}n}} + \frac{5Df}{12neez^{\frac{12}{5}n}} - \frac{5Dff}{7ne^3z^{\frac{7}{5}n}} + \frac{5Df^3}{2ne^4z^{\frac{2}{5}n}} + \frac{5Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{5}\sqrt[5]{\frac{ff}{ee}} \times + \gamma (BP : BO) - \beta (DP : DO) + (FP : FO) + \chi (PBO) - \downarrow (PDO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{5}\sqrt[5]{\frac{ff}{ee}} \times - (AP : AO) + \beta (CP : CO) - \gamma (EP : EO) - \downarrow (PCO) + \chi (PEO)$

θ	FORME I. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n}$.
&c.	
5.	$\frac{Dz^{4n}}{4nf} - \frac{Dez^{3n}}{3nff} + \frac{Deez^{2n}}{2nf^3} - \frac{De^3z^n}{nf^4} + \frac{De^4}{nf^5}$ ①
4.	$\frac{Dz^{3n}}{3nf} - \frac{Dez^{2n}}{2nff} + \frac{Deez^n}{nf^3} - \frac{De^3}{nf^4}$ ①
3.	$\frac{Dz^{2n}}{2nf} - \frac{Dez^n}{nff} + \frac{Dee}{nf^3}$ ①
2.	$\frac{Dz^n}{nf} - \frac{De}{nff}$ ①
1.	$\frac{D}{nf}$ ① Voyez fig. 27.
0.	$\frac{-D}{ne}$ ②
— 1.	$\frac{-D}{nez^n} + \frac{Df}{nee}$ ②
— 2.	$\frac{-D}{2nez^{2n}} + \frac{Df}{neez^n} - \frac{Dff}{ne^3}$ ②
— 3.	$\frac{-D}{3nez^{3n}} + \frac{Df}{2neez^{2n}} - \frac{Dff}{ne^3z^n} + \frac{Df^3}{ne^4}$ ②
— 4.	$\frac{-D}{4nez^{4n}} + \frac{Df}{3neez^{3n}} - \frac{Dff}{2ne^3z^{2n}} + \frac{Df^3}{ne^4z^n} - \frac{Df^4}{ne^5}$ ②
&c.	

1. *Cas.* $\begin{cases} OP : OA :: z^n : \frac{e}{f}; & ① = 1\,(BP : BO) \\ OP : OA :: \frac{1}{z^n} : \frac{f}{e}; & ② = 1\,(BP : BO) \end{cases}$

2. *Cas.* $\begin{cases} OP : OA :: z^n : \frac{-e}{f}; & ① = 1\,(AP : AO) \\ OP : OA :: \frac{1}{z^n} : \frac{-f}{e}; & ② = 1\,(AP : AO) \end{cases}$

θ	FORME II. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{2Dz^{\frac{7}{2}n}}{7nf} - \frac{2Dez^{\frac{5}{2}n}}{5nff} + \frac{2Dee z^{\frac{3}{2}n}}{3nf^3} - \frac{2De^3z^{\frac{1}{2}n}}{nf^4} + \frac{2De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{2Dz^{\frac{5}{2}n}}{5nf} - \frac{2Dez^{\frac{3}{2}n}}{3nff} + \frac{2Dee z^{\frac{1}{2}n}}{nf^3} - \frac{2De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{2Dz^{\frac{3}{2}n}}{3nf} - \frac{2Dez^{\frac{1}{2}n}}{nff} + \frac{2Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{2Dz^{\frac{1}{2}n}}{nf} - \frac{2De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{2D}{nf}$ (I) Voyez fig. 28.
— 1.	$\frac{-2D}{nez^{\frac{1}{2}n}} - \frac{2D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-2D}{3nez^{\frac{3}{2}n}} + \frac{2Df}{neez^{\frac{1}{2}n}} + \frac{2Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-2D}{5nez^{\frac{5}{2}n}} + \frac{2Df}{3neez^{\frac{3}{2}n}} - \frac{2Dff}{ne^3z^{\frac{1}{2}n}} - \frac{2Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-2D}{7nez^{\frac{7}{2}n}} + \frac{2Df}{5neez^{\frac{5}{2}n}} - \frac{2Dff}{3ne^3z^{\frac{1}{2}n}} + \frac{2Df^3}{ne^4z^{\frac{1}{2}n}} + \frac{2Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[n]{z^n} : \sqrt[n]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{2}\sqrt[n]{\frac{f}{e}} \times \frac{1}{2}(PBO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[n]{z^n} : \sqrt[n]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{2}\sqrt[n]{\frac{-f}{e}} \times -(AP : AO) + (CP : CO)$

θ	FORME III. $\frac{Dz^{1n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{3Dz^{\frac{10}{3}n}}{10nf} - \frac{3Dez^{\frac{7}{3}n}}{7nff} + \frac{3Dee z^{\frac{4}{3}n}}{4nf^3} - \frac{3De^3z^{\frac{1}{3}n}}{nf^4} + \frac{3De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{3Dz^{\frac{7}{3}n}}{7nf} - \frac{3Dez^{\frac{4}{3}n}}{4nff} + \frac{3Dee z^{\frac{1}{3}n}}{nf^3} - \frac{3De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{3Dz^{\frac{4}{3}n}}{4nf} - \frac{3Dez^{\frac{1}{3}n}}{nff} + \frac{3Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{3Dz^{\frac{1}{3}n}}{nf} - \frac{3De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{3D}{nf}$ (I) Voyez fig. 29.
— 1.	$\frac{-3D}{2nez^{\frac{2}{3}n}} - \frac{3D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-3D}{5nez^{\frac{5}{3}n}} + \frac{3Df}{2neez^{\frac{2}{3}n}} + \frac{3Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-3D}{8nez^{\frac{8}{3}n}} + \frac{3Df}{5neez^{\frac{5}{3}n}} - \frac{3Dff}{2ne^3z^{\frac{2}{3}n}} - \frac{3Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-3D}{11nez^{\frac{11}{3}n}} + \frac{3Df}{8neez^{\frac{8}{3}n}} - \frac{3Dff}{5ne^3z^{\frac{5}{3}n}} + \frac{3Df^3}{2ne^4z^{\frac{2}{3}n}} + \frac{3Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{e}{f}}$;

$$(I) = \tfrac{1}{3}\sqrt[3]{\tfrac{ff}{ee}} \times -\beta(BP:BO) + (DP:DO) + \downarrow(PBO)$$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{-e}{f}}$;

$$(I) = \tfrac{-1}{3}\sqrt[3]{\tfrac{ff}{ee}} \times -(AP:AO) + \beta(CP:CO) + \downarrow(PCO)$$

FORME

θ	FORME IV. $\frac{Dz^{\frac{2}{3}n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{3Dz^{\frac{11}{3}n}}{11nf} - \frac{3Dez^{\frac{8}{3}n}}{8nff} + \frac{3Deez^{\frac{5}{3}n}}{5nf^3} - \frac{3De^3z^{\frac{2}{3}n}}{2nf^4} + \frac{3De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{3Dz^{\frac{8}{3}n}}{8nf} - \frac{3Dez^{\frac{5}{3}n}}{5nff} + \frac{3Deez^{\frac{2}{3}n}}{2nf^3} - \frac{3De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{3Dz^{\frac{5}{3}n}}{5nf} - \frac{3Dez^{\frac{2}{3}n}}{2nff} + \frac{3Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{3Dz^{\frac{2}{3}n}}{2nf} - \frac{3De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{3D}{nf}$ (I) Voyez fig. 29.
— 1.	$\frac{-3D}{ne z^{\frac{1}{3}n}} - \frac{3D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-3D}{4nez^{\frac{4}{3}n}} + \frac{3Df}{nee z^{\frac{1}{3}n}} + \frac{3Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-3D}{7nez^{\frac{7}{3}n}} + \frac{3Df}{4neez^{\frac{4}{3}n}} - \frac{3Dff}{ne^3z^{\frac{1}{3}n}} - \frac{3Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-3D}{10nez^{\frac{10}{3}n}} + \frac{3Df}{7neez^{\frac{7}{3}n}} - \frac{3Dff}{4ne^3z^{\frac{4}{3}n}} + \frac{3Df^3}{ne^4z^{\frac{1}{3}n}} + \frac{3Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{e}{f}}$;

$(I) = \frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{f}{e}}x + \beta(BP:BO) - (DP:DO) + \downarrow(PBO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{-e}{f}}$;

$(I) = \frac{-1}{3}\sqrt[3]{\frac{-f}{e}}x - (AP:AO) + \beta(CP:CO) - \downarrow(PCO)$

θ	FORME V. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{4Dz^{\frac{13}{4}n}}{13nf}-\frac{4Dez^{\frac{9}{4}n}}{9nff}+\frac{4Deez^{\frac{5}{4}n}}{5nf^3}-\frac{4De^3z^{\frac{1}{4}n}}{nf^4}+\frac{4De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{+Dz^{\frac{9}{4}n}}{9nf}-\frac{4Dez^{\frac{5}{4}n}}{5nff}+\frac{4Deez^{\frac{1}{4}n}}{nf^3}-\frac{4De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{4Dz^{\frac{5}{4}n}}{5nf}-\frac{4Dez^{\frac{1}{4}n}}{nff}+\frac{4Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{4Dz^{\frac{1}{4}n}}{nf}-\frac{4De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{4D}{nf}$ (I) Voyez fig. 30.
— 1.	$\frac{-4D}{3nez^{\frac{3}{4}n}}-\frac{4D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-4D}{7nez^{\frac{7}{4}n}}+\frac{4Df}{3neez^{\frac{3}{4}n}}+\frac{4Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-4D}{11nez^{\frac{11}{4}n}}+\frac{4Df}{7neez^{\frac{7}{4}n}}-\frac{4Dff}{3ne^3z^{\frac{3}{4}n}}+\frac{4Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-4D}{15nez^{\frac{15}{4}n}}+\frac{4Df}{11neez^{\frac{11}{4}n}}-\frac{4Dff}{7ne^3z^{\frac{7}{4}n}}+\frac{4Df^3}{3ne^4z^{\frac{3}{4}n}}+\frac{4Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{f^3}{e^3}} \times -B(BP:BO)+\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{4}\sqrt[4]{\frac{-f^3}{e^3}} \times -(AP:AO)+(EP:EO)+\chi(PCO)$

θ	FORME VI. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{4Dz^{\frac{15}{4}n}}{15nf} - \frac{4Dez^{\frac{11}{4}n}}{11nff} + \frac{4Deez^{\frac{7}{4}n}}{7nf^3} - \frac{4De^3z^{\frac{3}{4}n}}{3nf^4} + \frac{4De^4}{nf^5}$ (I).
3.	$\frac{4Dz^{\frac{11}{4}n}}{11nf} - \frac{4Dez^{\frac{7}{4}n}}{7nff} + \frac{4Deez^{\frac{3}{4}n}}{3nf^3} - \frac{4De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{4Dz^{\frac{7}{4}n}}{7nf} - \frac{4Dez^{\frac{3}{4}n}}{3nff} + \frac{4Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{4Dz^{\frac{3}{4}n}}{3nf} - \frac{4De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{4D}{nf}$ (II) Voyez fig. 30.
— 1.	$\frac{-4D}{nez^{\frac{1}{4}n}} - \frac{4D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-4D}{5nez^{\frac{1}{4}n}} + \frac{4Df}{nee z^{\frac{1}{4}n}} + \frac{4Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-4D}{9nez^{\frac{2}{4}n}} + \frac{4Df}{5nee z^{\frac{1}{4}n}} - \frac{4Dff}{ne^3z^{\frac{1}{4}n}} - \frac{4Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-4D}{13nez^{\frac{13}{4}n}} + \frac{4Df}{9nee z^{\frac{9}{4}n}} - \frac{4Dff}{5ne^3z^{\frac{5}{4}n}} + \frac{4Df^3}{ne^4z^{\frac{1}{4}n}} + \frac{4Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[4]{z^n}$: $\sqrt[4]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{f}{e}}\,x + \beta\,(BP:BO) - \beta\,(DP:DO) + \psi\,(PBO) + \psi\,(PDO)$

2. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[4]{z^n}$: $\sqrt[4]{-\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{4}\sqrt[4]{\frac{-f}{e}}\,x - (AP:AO) + (EP:EO) - \chi\,(PCO)$

θ	FORME VII. $\frac{Dz^{\frac{1}{5}n+\frac{1}{5}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{5Dz^{\frac{16}{5}n}}{16nf} - \frac{5Dez^{\frac{11}{5}n}}{11nff} + \frac{5Deez^{\frac{6}{5}n}}{6nf^3} - \frac{5De^3z^{\frac{1}{5}n}}{nf^4} + \frac{5De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{5Dz^{\frac{11}{5}n}}{11nf} - \frac{5Dez^{\frac{6}{5}n}}{6nff} + \frac{5Deez^{\frac{1}{5}n}}{nf^3} - \frac{5De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{5Dz^{\frac{6}{5}n}}{6nf} - \frac{5Dez^{\frac{1}{5}n}}{nff} + \frac{5Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{5Dz^{\frac{1}{5}n}}{nf} - \frac{5De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{5D}{nf}$ (I) Voyez fig. 31.
— 1.	$\frac{-5D}{4nez^{\frac{4}{5}n}} - \frac{5D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-5D}{9nez^{\frac{9}{5}n}} + \frac{5Df}{4neez^{\frac{4}{5}n}} + \frac{5Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-5D}{14nez^{\frac{14}{5}n}} + \frac{5Df}{9neez^{\frac{9}{5}n}} - \frac{5Dff}{4ne^3z^{\frac{4}{5}n}} - \frac{5Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-5D}{19nez^{\frac{19}{5}n}} + \frac{5Df}{14neez^{\frac{14}{5}n}} - \frac{5Dff}{9ne^3z^{\frac{9}{5}n}} + \frac{5Df^3}{4ne^4z^{\frac{4}{5}n}} + \frac{5Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{5}\sqrt[5]{\frac{f^4}{e^4}} \times -\beta\,(BP:BO) + \gamma\,(DP:DO) + (FP:FO) + \downarrow$ (PBO) $+ \chi$ (PDO)

2. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{5}\sqrt[5]{\frac{f^4}{e^4}} \times -(AP:AO) - \gamma\,(CP:CO) + \beta\,(EP:EO) +$ χ (PCO) $+ \downarrow$ (PEO)

θ	FORME VIII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{4}{5}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{5Dz^{\frac{19}{5}n}}{19nf} - \frac{5Dez^{\frac{14}{5}n}}{14nff} + \frac{5Dee z^{\frac{9}{5}n}}{9nf^3} - \frac{5De^3z^{\frac{4}{5}n}}{4nf^4} + \frac{5De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{5Dz^{\frac{14}{5}n}}{14nf} - \frac{5Dez^{\frac{9}{5}n}}{9nff} + \frac{5Dee z^{\frac{4}{5}n}}{4nf^3} - \frac{5De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{5Dz^{\frac{9}{5}n}}{9nf} - \frac{5Dez^{\frac{4}{5}n}}{4nff} + \frac{5Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{5Dz^{\frac{4}{5}n}}{4nf} - \frac{5De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{5D}{nf}$ (I) Voyez fig. 31.
— 1.	$\frac{-5D}{nez^{\frac{1}{5}n}} - \frac{5D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-5D}{6nez^{\frac{6}{5}n}} + \frac{5Df}{neez^{\frac{1}{5}n}} + \frac{5Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-5D}{11nez^{\frac{11}{5}n}} + \frac{5Df}{6neez^{\frac{6}{5}n}} - \frac{5Dff}{ne^3z^{\frac{1}{5}n}} - \frac{5Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-5D}{16nez^{\frac{16}{5}n}} + \frac{5Df}{11neez^{\frac{11}{5}n}} - \frac{5Dff}{6ne^3z^{\frac{6}{5}n}} + \frac{5Df^3}{ne^4z^{\frac{1}{5}n}} + \frac{5Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{5}\sqrt[5]{\frac{f}{e}}\,x + \beta\,(BP:BO) - \gamma\,(DP:DO) - (FP:FO) + \downarrow(PBO) + \chi(PDO)$

2. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{5}\sqrt[5]{\frac{-f}{e}}\,x - (AP:AO) - \gamma\,(CP:CO) + \beta\,(EP:EO) - \chi\,(PCO) - \downarrow(PEO)$

θ	FORME IX. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{5}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{5Dz^{\frac{17}{5}n}}{17nf} - \frac{5Dez^{\frac{12}{5}n}}{12nff} + \frac{5Deez^{\frac{7}{5}n}}{7nf^3} - \frac{5De^3z^{\frac{2}{5}n}}{2nf^4} + \frac{5De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{5Dz^{\frac{12}{5}n}}{12nf} - \frac{5Dez^{\frac{7}{5}n}}{7nff} + \frac{5Deez^{\frac{2}{5}n}}{2nf^3} - \frac{5De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{5Dz^{\frac{7}{5}n}}{7nf} - \frac{5Dez^{\frac{2}{5}n}}{2nff} + \frac{5Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{5Dz^{\frac{2}{5}n}}{2nf} - \frac{5De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{5D}{nf}$ (I) Voyez fig. 31.
— 1.	$\frac{-5D}{3nez^{\frac{3}{5}n}} - \frac{5D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-5D}{8nez^{\frac{8}{5}n}} + \frac{5Df}{3neez^{\frac{3}{5}n}} + \frac{5Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-5D}{13nez^{\frac{13}{5}n}} + \frac{5Df}{8neez^{\frac{8}{5}n}} - \frac{5Dff}{3ne^3z^{\frac{3}{5}n}} - \frac{5Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-5D}{18nez^{\frac{18}{5}n}} + \frac{5Df}{13neez^{\frac{13}{5}n}} - \frac{5Dff}{8ne^3z^{\frac{8}{5}n}} + \frac{5Df^3}{3ne^4z^{\frac{3}{5}n}} + \frac{5Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{5}\sqrt[5]{\frac{f^3}{e^3}} \times - \gamma (BP : BO) + \beta \{DP : DO) - (FP : FO) + \chi (PBO) - \downarrow (PDO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{5}\sqrt[5]{\frac{-f^3}{e^3}} \times - (AP : AO) + \beta (CP : CO) - \gamma (EP : EO) + \downarrow (PCO) - \chi (PEO)$

θ	FORME X. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{3}{5}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{5Dz^{\frac{18}{5}n}}{18nf} - \frac{5Dez^{\frac{13}{5}n}}{13nff} + \frac{5Deez^{\frac{8}{5}n}}{8nf^3} - \frac{5De^3z^{\frac{3}{5}n}}{3nf^4} + \frac{5De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{5Dz^{\frac{13}{5}n}}{13nf} - \frac{5Dez^{\frac{8}{5}n}}{8nff} + \frac{5Deez^{\frac{3}{5}n}}{3nf^3} - \frac{5De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{5Dz^{\frac{8}{5}n}}{8nf} - \frac{5Dez^{\frac{3}{5}n}}{3nff} + \frac{5Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{5Dz^{\frac{3}{5}n}}{3nf} - \frac{5De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{5D}{nf}$ (I) Voyez fig. 312.
— 1.	$\frac{-5D}{2nez^{\frac{2}{5}n}} - \frac{5D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-5D}{7nez^{\frac{7}{5}n}} + \frac{5Df}{2neez^{\frac{2}{5}n}} + \frac{5Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-5D}{12nez^{\frac{12}{5}n}} + \frac{5Df}{7neez^{\frac{7}{5}n}} - \frac{5Dff}{2ne^3z^{\frac{2}{5}n}} - \frac{5Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-5D}{17nez^{\frac{17}{5}n}} + \frac{5Df}{12neez^{\frac{12}{5}n}} - \frac{5Dff}{7ne^3z^{\frac{7}{5}n}} + \frac{5Df^3}{2ne^4z^{\frac{2}{5}n}} + \frac{5Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{5}\sqrt[5]{\frac{ff}{ee}} \times + \gamma(BP:BO) - \beta(DP:DO) + (FP:FO) + \chi(PBO) - \downarrow(PDO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[5]{z^n} : \sqrt[5]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= -\frac{1}{5}\sqrt[5]{\frac{ff}{ee}} \times - (AP:AO) + \beta(CP:CO) - \gamma(EP:EO) - \downarrow(PCO) + \chi(PEO)$

θ	FORME XI. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{6}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{6Dz^{\frac{19}{6}n}}{19nf} - \frac{6Dez^{\frac{13}{6}n}}{13nff} + \frac{6Deez^{\frac{7}{6}n}}{7nf^3} - \frac{6De^3z^{\frac{1}{6}n}}{nf^4} + \frac{6De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{6Dz^{\frac{13}{6}n}}{13nf} - \frac{6Dez^{\frac{7}{6}n}}{7nff} + \frac{6Deez^{\frac{1}{6}n}}{nf^3} - \frac{6De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{6Dz^{\frac{7}{6}n}}{6nf} - \frac{6Dez^{\frac{1}{6}n}}{nff} + \frac{6Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{6Dz^{\frac{1}{6}n}}{nf} - \frac{6De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{6D}{nf}$ (I) Voyez fig. 32.
— 1.	$\frac{-6D}{5nez^{\frac{5}{6}n}} - \frac{6D}{ne.}$ (I)
— 2.	$\frac{-6D}{11nez^{\frac{11}{6}n}} + \frac{6Df}{5neez^{\frac{5}{6}n}} + \frac{6Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-6D}{17nez^{\frac{17}{6}n}} + \frac{6Df}{11neez^{\frac{11}{6}n}} - \frac{6Dff}{5ne^3z^{\frac{5}{6}n}} - \frac{6Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-6D}{23nez^{\frac{23}{6}n}} + \frac{6Df}{17neez^{\frac{17}{6}n}} - \frac{6Dff}{11ne^3z^{\frac{11}{6}n}} + \frac{6Df^3}{5ne^4z^{\frac{5}{6}n}} + \frac{6Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[6]{z^n} : \sqrt[6]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{6}\sqrt[6]{\frac{f^5}{e^5}} \times -\beta\,(BP:BO) + \beta\,(FP:FO) + \downarrow(PBO) + \phi(PDO) + \downarrow(PFO)$

2. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[6]{z^n} : \sqrt[6]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{6}\sqrt[6]{\frac{-f^5}{e^5}} \times -(AP:AO) - \gamma\,(CP:CO) + \gamma\,(EP:EO) + (GP:GO) + \chi\,(PCO) + \chi\,(PEO)$

FORME

FORME XII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{5}{6}n-1}dz}{e+fz^n}$

θ	
&c.	
4.	$\frac{6Dz^{\frac{23}{6}n}}{23nf} - \frac{6Dez^{\frac{17}{6}n}}{17nff} + \frac{6Deez^{\frac{11}{6}n}}{11nf^3} - \frac{6De^3z^{\frac{5}{6}n}}{5nf^4} + \frac{6De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{6Dz^{\frac{17}{6}n}}{17nf} - \frac{6Dez^{\frac{11}{6}n}}{11nff} + \frac{6Deez^{\frac{5}{6}n}}{5nf^3} - \frac{6De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{6Dz^{\frac{11}{6}n}}{11nf} - \frac{6Dez^{\frac{5}{6}n}}{5nff} + \frac{6Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{6Dz^{\frac{5}{6}n}}{5nf} - \frac{6De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{6D}{nf}$ (I) Voyez fig. 32.
— 1.	$\frac{-6D}{nez^{\frac{1}{6}n}} - \frac{6D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-6D}{7nez^{\frac{7}{6}n}} + \frac{6Df}{neez^{\frac{1}{6}n}} + \frac{6Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-6D}{13nez^{\frac{13}{6}n}} + \frac{6Df}{7neez^{\frac{7}{6}n}} - \frac{6Dff}{ne^3z^{\frac{1}{6}n}} - \frac{6Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-6D}{19nez^{\frac{19}{6}n}} + \frac{6Df}{13neez^{\frac{13}{6}n}} - \frac{6Dff}{7ne^3z^{\frac{7}{6}n}} + \frac{6Df^3}{ne^4z^{\frac{1}{6}n}} + \frac{6Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[6]{z^n} : \sqrt[6]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{6}\sqrt[6]{\frac{f}{e}} \times + \beta\,(BP : BO) - \beta\,(FP : FO) + \downarrow(PBO) + \phi\,(PDO) + \downarrow(PFO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[6]{z^n} : \sqrt[6]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{6}\sqrt[6]{\frac{-f}{e}} \times - (AP : AO) - \gamma\,(CP : CO) + \gamma\,(EP : EO) + (GP : GO) - \chi\,(PCO) - \chi\,(PEO)$

θ	FORME XIII. $\frac{Dz^{\frac{1}{7}n+\frac{1}{7}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{7Dz^{\frac{22}{7}n}}{22nf} - \frac{7Dez^{\frac{15}{7}n}}{15nff} + \frac{7Dee z^{\frac{8}{7}n}}{8nf^3} - \frac{7De^3z^{\frac{1}{7}n}}{nf^4} + \frac{7De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{7Dz^{\frac{15}{7}n}}{15nf} - \frac{7Dez^{\frac{8}{7}n}}{8nff} + \frac{7Dee z^{\frac{1}{7}n}}{nf^3} - \frac{7De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{7Dz^{\frac{8}{7}n}}{8nf} - \frac{7Dez^{\frac{1}{7}n}}{nff} + \frac{7Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{7Dz^{\frac{1}{7}n}}{nf} - \frac{7De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{7D}{nf}$ (I) Voyez fig. 33.
— 1.	$\frac{-7D}{6nez^{\frac{6}{7}n}} - \frac{7D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-7D}{13nez^{\frac{13}{7}n}} + \frac{7Df}{6neez^{\frac{6}{7}n}} + \frac{7Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-7D}{20nez^{\frac{20}{7}n}} + \frac{7Df}{13neez^{\frac{13}{7}n}} - \frac{7Dff}{6ne^3z^{\frac{6}{7}n}} - \frac{7Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-7D}{27nez^{\frac{27}{7}n}} + \frac{7Df}{20neez^{\frac{20}{7}n}} - \frac{7Dff}{13ne^3z^{\frac{13}{7}n}} + \frac{7Df^3}{6ne^4z^{\frac{6}{7}n}} + \frac{7Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[7]{z^n} : \sqrt[7]{\frac{e}{f}}$;

$$(I) = \tfrac{1}{7}\sqrt[7]{\frac{f^6}{e^6}}x - \beta\,(BP:BO) - \delta\,(DP:DO) + \gamma\,(FP:FO) + (HP:HO) + \downarrow(PBO) + \varphi(PDO) + \chi(PFO)$$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[7]{z^n} : \sqrt[7]{\frac{-e}{f}}$;

$$(I) = \tfrac{-1}{7}\sqrt[7]{\frac{f^6}{e^6}}x - (AP:AO) - \gamma\,(CP:CO) + \delta\,(EP:EO) + \beta\,(GP:GO) + \chi(PCO) + \varphi(PEO) + \downarrow(PGO)$$

θ	FORME XIV. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{6}{7}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{7Dz^{\frac{27}{7}n}}{27nf} - \frac{7Dez^{\frac{20}{7}n}}{20nff} + \frac{7Dcez^{\frac{13}{7}n}}{13nf^3} - \frac{7De^3z^{\frac{6}{7}n}}{6nf^4} + \frac{7De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{7Dz^{\frac{20}{7}n}}{20nf} - \frac{7Dez^{\frac{13}{7}n}}{13nff} + \frac{7Deez^{\frac{6}{7}n}}{6nf^3} - \frac{7De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{7Dz^{\frac{13}{7}n}}{13nf} - \frac{7Dez^{\frac{6}{7}n}}{6nff} + \frac{7Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{7Dz^{\frac{6}{7}n}}{6nf} - \frac{7De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{7D}{nf}$ (I) Voyez fig. 33.
— 1.	$\frac{-7D}{nez^{\frac{1}{7}n}} - \frac{7D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-7D}{8nez^{\frac{8}{7}n}} + \frac{7Df}{neez^{\frac{1}{7}n}} + \frac{7Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-7D}{15nez^{\frac{15}{7}n}} + \frac{7Df}{8neez^{\frac{8}{7}n}} - \frac{7Dff}{ne^3z^{\frac{1}{7}n}} - \frac{7Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-7D}{22nez^{\frac{22}{7}n}} + \frac{7Df}{15neez^{\frac{15}{7}n}} - \frac{7Dff}{8ne^3z^{\frac{8}{7}n}} + \frac{7Df^3}{ne^4z^{\frac{1}{7}n}} + \frac{7Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[7]{z^n}$: $\sqrt[7]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{7}\sqrt[7]{\frac{f}{e}}\,x + \beta\,(BP:BO) + \delta\,(DP:DO) - \gamma\,(FP:FO) - (HP:HO) + \psi\,(PBO) + \varphi\,(PDO) + \chi\,(PFO)$

2. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[7]{z^n}$: $\sqrt[7]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{7}\sqrt[7]{\frac{-f}{e}}\,x - (AP:AO) - \gamma\,(CP:CO) + \delta\,(EP:EO) + \beta\,(GP:GO) - \chi\,(PCO) - \varphi\,(PEO) - \psi\,(PGO)$

θ	FORME XV. $\frac{Dz^{\frac{2}{7}n+\frac{2}{7}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{7Dz^{\frac{23}{7}n}}{23nf} - \frac{7Dez^{\frac{16}{7}n}}{16nff} + \frac{7Deez^{\frac{9}{7}n}}{9nf^3} - \frac{7De^3z^{\frac{2}{7}n}}{2nf^4} + \frac{7De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{7Dz^{\frac{16}{7}n}}{16nf} - \frac{7Dez^{\frac{9}{7}n}}{9nff} + \frac{7Deez^{\frac{2}{7}n}}{2nf^3} - \frac{7De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{7Dz^{\frac{9}{7}n}}{9nf} - \frac{7Dez^{\frac{2}{7}n}}{2nff} + \frac{7Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{7Dz^{\frac{2}{7}n}}{2nf} - \frac{7De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{7D}{nf}$ (I) Voyez fig. 33.
— 1.	$\frac{-7D}{5nez^{\frac{5}{7}n}} - \frac{7D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-7D}{12nez^{\frac{12}{7}n}} + \frac{7Df}{5neez^{\frac{5}{7}n}} + \frac{7Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-7D}{19nez^{\frac{19}{7}n}} + \frac{7Df}{12nez^{\frac{12}{7}n}} - \frac{7Dff}{5ne^3z^{\frac{5}{7}n}} - \frac{7Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-7D}{26nez^{\frac{26}{7}n}} + \frac{7Df}{19neez^{\frac{19}{7}n}} - \frac{7Dff}{12ne^3z^{\frac{12}{7}n}} + \frac{7Df^3}{5ne^4z^{\frac{5}{7}n}} + \frac{7Df^5}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[7]{z^n} : \sqrt[7]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{7}\sqrt[7]{\frac{f^5}{e^5}} \times - \gamma\,(BP : BO) + \beta\,(DP : DO) + \delta\,(FP : FO) - (HP : HO) + \chi\,(PBO) + \downarrow\,(PDO) - \varphi\,(PFO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[7]{z^n} : \sqrt[7]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{7}\sqrt[7]{\frac{-f^5}{e^5}} \times - (AP : AO) + \delta\,(CP : CO) + \beta\,(EP : EO) - \gamma\,(GP : GO) + \varphi\,(PCO) - \downarrow\,(PEO) - \chi\,(PGO)$.

FORME XVI. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{5}{7}n-1}dz}{e+fz^n}$

θ	
&c.	
4.	$\frac{7Dz^{\frac{26}{7}n}}{26nf} - \frac{7Dez^{\frac{19}{7}n}}{19nff} + \frac{7Deez^{\frac{12}{7}n}}{12nf^3} - \frac{7De^3z^{\frac{5}{7}n}}{5nf^4} + \frac{7De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{7Dz^{\frac{19}{7}n}}{19nf} - \frac{7Dez^{\frac{12}{7}n}}{12nff} + \frac{7Deez^{\frac{5}{7}n}}{5nf^3} - \frac{7De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{7Dz^{\frac{12}{7}n}}{12nf} - \frac{7Dez^{\frac{5}{7}n}}{5nff} + \frac{7Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{7Dz^{\frac{5}{7}n}}{5nf} - \frac{7De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{7D}{nf}$ (I) Voyez fig. 33.
— 1.	$\frac{-7D}{2nez^{\frac{2}{7}n}} - \frac{7D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-7D}{9nez^{\frac{9}{7}n}} + \frac{7Df}{2neez^{\frac{2}{7}n}} + \frac{7Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-7D}{16nez^{\frac{16}{7}n}} + \frac{7Df}{9neez^{\frac{9}{7}n}} - \frac{7Dff}{2ne^3z^{\frac{2}{7}n}} - \frac{7Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-7D}{23nez^{\frac{23}{7}n}} + \frac{7Df}{16neez^{\frac{16}{7}n}} - \frac{7Dff}{9ne^3z^{\frac{9}{7}n}} + \frac{7Df^3}{2ne^4z^{\frac{2}{7}n}} + \frac{7Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[7]{z^n} : \sqrt[7]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{7}\sqrt[7]{\frac{ff}{ee}} \times + \gamma(BP:BO) - \beta(DP:DO) - \delta(FP:FO) +$ $(HP:HO) + \chi(PBO) + \downarrow(PDO) - \varphi(PFO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[7]{z^n} : \sqrt[7]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{7}\sqrt[7]{\frac{ff}{ee}} \times - (AP:AO) + \delta(CP:CO) + \beta(EP:EO) -$ $\gamma(GP:GO) - \varphi(PCO) + \downarrow(PEO) + \chi(PGO)$

θ	FORME XVII. $\frac{Dz^{\frac{1}{7}n+\frac{1}{7}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{7Dz^{\frac{24}{7}n}}{24nf} - \frac{7Dez^{\frac{17}{7}n}}{17nff} + \frac{7Deez^{\frac{10}{7}n}}{10nf^3} - \frac{7De^3z^{\frac{3}{7}n}}{3nf^4} + \frac{7De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{7Dz^{\frac{17}{7}n}}{17nf} - \frac{7Dez^{\frac{10}{7}n}}{10nff} + \frac{7Deez^{\frac{3}{7}n}}{3nf^3} - \frac{7De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{7Dz^{\frac{10}{7}n}}{10nf} - \frac{7Dez^{\frac{3}{7}n}}{3nff} + \frac{7Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{7Dz^{\frac{3}{7}n}}{3nf} - \frac{7De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{7D}{nf}$ (I) Voyez fig. 33.
— 1.	$\frac{-7D}{4nez^{\frac{4}{7}n}} - \frac{7D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-7D}{11nez^{\frac{11}{7}n}} + \frac{7Df}{4neez^{\frac{4}{7}n}} + \frac{7Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-7D}{18nez^{\frac{18}{7}n}} + \frac{7Df}{11neez^{\frac{11}{7}n}} - \frac{7Dff}{4ne^3z^{\frac{4}{7}n}} - \frac{7Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-7D}{25nez^{\frac{25}{7}n}} + \frac{7Df}{18neez^{\frac{18}{7}n}} - \frac{7Dff}{11ne^3z^{\frac{11}{7}n}} + \frac{7Df^3}{4ne^4z^{\frac{4}{7}n}} + \frac{7Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[7]{z^n} : \sqrt[7]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{7}\sqrt[7]{\frac{f^4}{e^4}} \times - \delta\,(BP : BO) + \gamma\,(DP : DO) - \beta\,(FP : FO) + (HP : HO) + \varphi\,(PBO) - \chi\,(PDO) + \downarrow\,(PFO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[7]{z^n} : \sqrt[7]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{7}\sqrt[7]{\frac{f^4}{e^4}} \times - (AP : AO) + \beta\,(CP : CO) - \gamma\,(EP : EO) + \delta\,(GP : GO) + \downarrow\,(PCO) - \chi\,(PEO) + \varphi\,(PGO)$

θ	FORME XVIII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{4}{7}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{7Dz^{\frac{25}{7}n}}{25nf} - \frac{7Dez^{\frac{18}{7}n}}{18nff} + \frac{7Deez^{\frac{11}{7}n}}{11nf^3} - \frac{7De^3z^{\frac{4}{7}n}}{4nf^4} + \frac{7De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{7Dz^{\frac{18}{7}n}}{18nf} - \frac{7Dez^{\frac{11}{7}n}}{11nff} + \frac{7Deez^{\frac{4}{7}n}}{4nf^3} - \frac{7De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{7Dz^{\frac{11}{7}n}}{11nf} - \frac{7Dez^{\frac{4}{7}n}}{4nff} + \frac{7Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{7Dz^{\frac{4}{7}n}}{4nf} - \frac{7De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{7D}{nf}$ (I) Voyez fig. 33.
1.	$\frac{-7D}{3nez^{\frac{3}{7}n}} - \frac{7D}{ne}$ (I)
2.	$\frac{-7D}{10nez^{\frac{10}{7}n}} + \frac{7Df}{3neez^{\frac{3}{7}n}} + \frac{7Df}{nee}$ (I)
3.	$\frac{-7D}{17nez^{\frac{17}{7}n}} + \frac{7Df}{10neez^{\frac{10}{7}n}} - \frac{7Dff}{3ne^3z^{\frac{3}{7}n}} - \frac{7Dff}{ne^3}$ (I)
4.	$\frac{-7D}{24nez^{\frac{24}{7}n}} + \frac{7Df}{17neez^{\frac{17}{7}n}} - \frac{7Dff}{10ne^3z^{\frac{10}{7}n}} + \frac{7Df^3}{3ne^4z^{\frac{3}{7}n}} + \frac{7Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[7]{z^n} : \sqrt[7]{\frac{e}{f}}$;

$(I) = \frac{1}{7}\sqrt[7]{\frac{f^3}{e^3}} \times + \delta\,(BP : BO) - \gamma\,(DP : DO) + \beta(FP : FO) - (HP : HO) + \varphi\,(PBO) - \chi\,(PDO) + \psi\,(PFO)$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[7]{z^n} : \sqrt[7]{\frac{-e}{f}}$;

$(I) = \frac{-1}{7}\sqrt[7]{\frac{-f^3}{e^3}} \times - (AP : AO) + \beta\,(CP : CO) - \gamma\,(EP : EO) + \delta\,(GP : GO) - \psi\,(PCO) + \chi\,(PEO) - \varphi\,(PGO)$.

θ	FORME XIX. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{8}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{8Dz^{\frac{25}{8}n}}{25nf} - \frac{8Dez^{\frac{17}{8}n}}{17nff} + \frac{8Deez^{\frac{9}{8}n}}{9nf^3} - \frac{8De^3z^{\frac{1}{8}n}}{nf^4} + \frac{8De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{8Dz^{\frac{17}{8}n}}{17nf} - \frac{8Dez^{\frac{9}{8}n}}{9nff} + \frac{8Deez^{\frac{1}{8}n}}{nf^3} - \frac{8De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{8Dz^{\frac{9}{8}n}}{9nf} - \frac{8Dez^{\frac{1}{8}n}}{nff} + \frac{8Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{8Dz^{\frac{1}{8}n}}{nf} - \frac{8De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{8D}{nf}$ (I) Voyez fig. 34.
— 1.	$\frac{-8D}{7nez^{\frac{7}{8}n}} - \frac{8D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-8D}{15nez^{\frac{15}{8}n}} + \frac{8Df}{7neez^{\frac{7}{8}n}} + \frac{8Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-8D}{23nez^{\frac{23}{8}n}} + \frac{8Df}{15neez^{\frac{15}{8}n}} - \frac{8Dff}{7ne^3z^{\frac{7}{8}n}} - \frac{8Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-8D}{31nez^{\frac{31}{8}n}} + \frac{8Df}{23neez^{\frac{23}{8}n}} - \frac{8Dff}{15ne^3z^{\frac{15}{8}n}} + \frac{8Df^3}{7ne^4z^{\frac{7}{8}n}} + \frac{8Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[8]{z^n} : \sqrt[8]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{8}\sqrt[8]{\frac{f^7}{e^7}} \times -\beta(BP:BO) - \delta(DP:DO) + \delta(FP:FO) + \beta(HP:HO) + \downarrow(PBO) + \varphi(PDO) + \varphi(PFO) + \blacklozenge(PHO)$

2. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[8]{z^n} : \sqrt[8]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= = \frac{1}{8}\sqrt[8]{\frac{-f^7}{e^7}} \times -(AP:AO) - \gamma(CP:CO) + \gamma(GP:GO) + (IP:IO) + \chi(PCO) + \upsilon(PEO) + \chi(PGO)$

FORME

FORME XX. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{7}{8}n-1}dz}{e+fz^n}$

θ	
&c.	
4.	$\frac{8Dz^{\frac{31}{8}n}}{31nf} - \frac{8Dez^{\frac{23}{8}n}}{23nff} + \frac{8Deez^{\frac{15}{8}n}}{15nf^3} - \frac{8De^3z^{\frac{7}{8}n}}{7nf^4} + \frac{8De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{8Dz^{\frac{23}{8}n}}{23nf} - \frac{8Dez^{\frac{15}{8}n}}{15nff} + \frac{8Deez^{\frac{7}{8}n}}{7nf^3} - \frac{8De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{8Dz^{\frac{15}{8}n}}{15nf} - \frac{8Dez^{\frac{7}{8}n}}{7nff} + \frac{8Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{8Dz^{\frac{7}{8}n}}{7nf} - \frac{8De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{8D}{nf}$ (I) Voyez fig. 34.
— 1.	$\frac{-8D}{ne z^{\frac{1}{8}n}} - \frac{8D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-8D}{9ne z^{\frac{9}{8}n}} + \frac{8Df}{neez^{\frac{1}{8}n}} + \frac{8Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-8D}{17ne z^{\frac{17}{8}n}} + \frac{8Df}{9neez^{\frac{9}{8}n}} - \frac{8Dff}{ne^3z^{\frac{1}{8}n}} - \frac{8Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-8D}{25ne z^{\frac{25}{8}n}} + \frac{8Df}{17neez^{\frac{17}{8}n}} - \frac{8Dff}{9ne^3z^{\frac{9}{8}n}} + \frac{8Df^3}{ne^4z^{\frac{1}{8}n}} + \frac{8Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[8]{z^n} : \sqrt[8]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{8}\sqrt[8]{\frac{f}{e}} \times + \beta\,(BP:BO) + \delta\,(DP:DO) - \delta\,(FP:FO) - \beta\,(HP:HO) + \downarrow\,(PBO) + \varphi\,(PDO) + \varphi\,(PFO) + \downarrow\,(PHO)$

2. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[8]{z^n} : \sqrt[8]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{8}\sqrt[8]{\frac{-f}{e}} \times - (AP:AO) - \gamma\,(CP:CO) + \gamma\,(GP:GO) + (IP:IO) - \chi\,(PCO) - \upsilon\,(PEO) - \chi\,(PGO)$

S

θ	FORME XXI. $\frac{Dz^{\frac{1}{8}n+\frac{1}{8}n-1}dz}{e+fz^n}$
&c.	
4.	$\frac{8Dz^{\frac{27}{8}n}}{27nf} - \frac{8Dez^{\frac{19}{8}n}}{19nff} + \frac{8Dee z^{\frac{11}{8}n}}{11nf^3} - \frac{8De^3z^{\frac{3}{8}n}}{3nf^4} + \frac{8De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{8Dz^{\frac{19}{8}n}}{19nf} - \frac{8Dez^{\frac{11}{8}n}}{11nff} + \frac{8Dee z^{\frac{3}{8}n}}{3nf^3} - \frac{8De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{8Dz^{\frac{11}{8}n}}{11nf} - \frac{8Dez^{\frac{3}{8}n}}{3nff} + \frac{8Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{8Dz^{\frac{3}{8}n}}{3nf} - \frac{8De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{8D}{nf}$ (I) Voyez fig. 34.
— 1.	$\frac{-8D}{5nez^{\frac{5}{8}n}} - \frac{8D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-8D}{13nez^{\frac{13}{8}n}} + \frac{8Df}{5neez^{\frac{5}{8}n}} + \frac{8Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-8D}{21nez^{\frac{21}{8}n}} + \frac{8Df}{13neez^{\frac{13}{8}n}} - \frac{8Dff}{5ne^2z^{\frac{5}{8}n}} - \frac{8Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-8D}{29nez^{\frac{29}{8}n}} + \frac{8Df}{21neez^{\frac{21}{8}n}} - \frac{8Dff}{13ne^2z^{\frac{13}{8}n}} + \frac{8Df^3}{5ne^4z^{\frac{5}{8}n}} + \frac{8Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[8]{z^n} : \sqrt[8]{\frac{e}{f}}$;

$$(I) = \tfrac{1}{8}\sqrt[8]{\tfrac{f^5}{e^5}} \times - \delta\,(BP : BO) + \beta\,(DP : DO) - \beta\,(FP : FO) + \delta\,(HP : HO) + \phi\,(PBO) - \downarrow\,(PDO) - \downarrow\,(PFQ) + \phi\,(PHO)$$

2. *Cas.* $OP : OA :: \sqrt[8]{z^n} : \sqrt[8]{\frac{-e}{f}}$;

$$(I) = \tfrac{-1}{8}\sqrt[8]{\tfrac{-f^5}{e^5}} \times - (AP : AO) + \gamma\,(CP : CO) - \gamma\,(GP : GO) + (IP : IO) + \chi\,(PCO) - \nu\,(PEQ) + \chi\,(PGQ)$$

FORME XXII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{5}{8}n-1}dz}{e+fz^n}$

θ	
&c.	
4.	$\frac{8Dz^{\frac{29}{8}n}}{29nf} - \frac{8Dez^{\frac{21}{8}n}}{21nff} + \frac{8Deez^{\frac{13}{8}n}}{13nf^3} - \frac{8De^3z^{\frac{5}{8}n}}{5nf^4} + \frac{8De^4}{nf^5}$ (I)
3.	$\frac{8Dz^{\frac{21}{8}n}}{21nf} - \frac{8Dez^{\frac{13}{8}n}}{13nff} + \frac{8Deez^{\frac{5}{8}n}}{5nf^3} - \frac{8De^3}{nf^4}$ (I)
2.	$\frac{8Dz^{\frac{13}{8}n}}{13nf} - \frac{8Dez^{\frac{5}{8}n}}{5nff} + \frac{8Dee}{nf^3}$ (I)
1.	$\frac{8Dz^{\frac{5}{8}n}}{5nf} - \frac{8De}{nff}$ (I)
0.	$\frac{8D}{nf}$ (I) Voyez fig. 34.
— 1.	$\frac{-8D}{3ne\,z^{\frac{3}{8}n}} - \frac{8D}{ne}$ (I)
— 2.	$\frac{-8D}{11ne\,z^{\frac{11}{8}n}} + \frac{8Df}{3neez^{\frac{3}{8}n}} + \frac{8Df}{nee}$ (I)
— 3.	$\frac{-8D}{19ne\,z^{\frac{19}{8}n}} + \frac{8Df}{11neez^{\frac{11}{8}n}} - \frac{8Dff}{3ne^3z^{\frac{3}{8}n}} - \frac{8Dff}{ne^3}$ (I)
— 4.	$\frac{-8D}{27ne\,z^{\frac{27}{8}n}} + \frac{8Df}{19neez^{\frac{19}{8}n}} - \frac{8Dff}{11ne^3z^{\frac{11}{8}n}} + \frac{8Df^3}{3ne^4z^{\frac{3}{8}n}} + \frac{8Df^3}{ne^4}$ (I)
&c.	

1. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[8]{z^n}$: $\sqrt[8]{\frac{e}{f}}$;

(I) $= \frac{1}{8}\sqrt[8]{\frac{f^3}{e^3}} \times + \mathfrak{z}\,(BP:BO) - \beta\,(DP:DO) + \beta\,(FP:FO) - \mathfrak{z}\,(HP:HO) + \varphi\,(PBO) - \downarrow\,(PDO) - \downarrow\,(PFO) + \varphi\,(PHO)$

2. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[8]{z^n}$: $\sqrt[8]{\frac{-e}{f}}$;

(I) $= \frac{-1}{8}\sqrt[8]{\frac{-f^3}{e^3}} \times - (AP:AO) + \gamma\,(CP:CO) - \gamma\,(GP:GO) + (IP:IO) - \chi\,(PCO) + \upsilon\,(PEO) - \chi\,(PGO)$

θ	FORME XXIII. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n \times g+hz^n}$
&c.	
4.	$\frac{Dz^{2n}}{2nfh} + \frac{-Dehz^n - Dfgz^n}{nffhh} - \frac{De^3}{nf^3}①+\frac{Dg^3}{nh^3}②$
3.	$\frac{Dz^n}{nfh}+\frac{Dee}{nff}①-\frac{Dgg}{nhh}②$
2.	$\frac{-De}{nf}①+\frac{Dg}{nh}②$
1.	$\frac{D}{n}①-\frac{D}{n}②$ Voyez fig. 27.
0.	$\frac{-Df}{ne}③+\frac{Dh}{ng}④$
— 1.	$\frac{-D}{negz^n}+\frac{Dff}{nee}③-\frac{Dhh}{ngg}④$
— 2.	$\frac{-D}{2negz^{2n}}+\frac{+Deh+Dfg}{neeggz^n}-\frac{Df^3}{ne^3}③+\frac{Dh^3}{ng^3}④$
&c.	

$p = fg - eh$

1. *Cas.*

$\text{OP} : \text{OA} :: z^n : \frac{e}{f}$; ① $= \frac{1}{p}$ (BP : BO)

$\text{OP} : \text{OA} :: z^n : \frac{g}{h}$; ② $= \frac{1}{p}$ (BP : BO)

$\text{OP} : \text{OA} :: \frac{1}{z^n} : \frac{f}{e}$; ③ $= \frac{1}{p}$ (BP : BO)

$\text{OP} : \text{OA} :: \frac{1}{z^n} : \frac{h}{g}$; ④ $= \frac{1}{p}$ (BP : BO)

2. *Cas.*

$\text{OP} : \text{OA} :: z^n : \frac{-e}{f}$; ① $= \frac{1}{p}$ (AP : AO)

$\text{OP} : \text{OA} :: z^n : \frac{-g}{h}$; ② $= \frac{1}{p}$ (AP : AO)

$\text{OP} : \text{OA} :: \frac{1}{z^n} : \frac{-f}{e}$; ③ $= \frac{1}{p}$ (AP : AO)

$\text{OP} : \text{OA} :: \frac{1}{z^n} : \frac{-h}{g}$; ④ $= \frac{1}{p}$ (AP : AO)

FORME XXIV. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n \times g+hz^n}$

θ	
&c.	
3.	$\frac{2Dz^{\frac{1}{2}n}}{3nfh} - \frac{+2Dfgz^{\frac{1}{2}n} \; +2Dehz^{\frac{1}{2}n}}{nffhh} - \frac{2De^3}{nf^3}$ ① $+ \frac{2Dg^3}{nh^3}$ ②
2.	$\frac{2Dz^{\frac{1}{2}n}}{nfh} + \frac{2Dee}{nff}$ ① $- \frac{2Dgg}{nhh}$ ②
1.	$\frac{-2De}{nf}$ ① $+ \frac{2Dg}{nh}$ ②
0.	$\frac{+2D}{n}$ ① $- \frac{2D}{n}$ ②
— 1.	$\frac{-2D}{negz^{\frac{1}{2}n}} - \frac{2Df}{ne}$ ① $+ \frac{2Dh}{ng}$ ②
— 2.	$\frac{-2D}{3negz^{\frac{3}{2}n}} + \frac{+2Dfg \; +2Deh}{neeggz^{\frac{1}{2}n}} + \frac{2Dff}{nee}$ ① $- \frac{2Dhh}{ngg}$ ②
&c.	

Voyez fig. 28.

$p = fg - eh$

1. *Cas.*
$\begin{cases} OP : OA :: \sqrt[2]{z^n} : \sqrt[2]{\frac{e}{f}}; & ① = \frac{1}{2p}\sqrt[2]{\frac{f}{e}} \times \downarrow (PBO). \\ OP : OA :: \sqrt[2]{z^n} : \sqrt[2]{\frac{g}{h}}; & ② = \frac{1}{2p}\sqrt[2]{\frac{h}{g}} \times \downarrow (PBO). \end{cases}$

2. *Cas.*
$\begin{cases} OP : OA :: \sqrt[2]{z^n} : \sqrt[2]{-\frac{e}{f}}; & ① = \frac{-1}{2p}\sqrt[2]{-\frac{f}{e}} \times -(AP : AO) \\ \quad + (CP : CO). \\ OP : OA :: \sqrt[2]{z^n} : \sqrt[2]{-\frac{g}{h}}; & ② = \frac{-1}{2p}\sqrt[2]{-\frac{h}{g}} \times +(AP : AO) \\ \quad + (CP : CO). \end{cases}$

θ	FORME XXV. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{\overline{e+fz^n}\times\overline{g+hz^n}}$
&c.	
3.	$\frac{3Dz^{\frac{4}{3}n}}{4nfh} \frac{+3Dehz^{\frac{1}{3}n}}{-3Dfgz^{\frac{1}{3}n}} \frac{-3De^3}{nf^3}\textcircled{1} + \frac{3Dg^3}{nb^3}\textcircled{2}$
2.	$\frac{3Dz^{\frac{1}{3}n}}{nfh} + \frac{3Dee}{nff}\textcircled{1} - \frac{3Dgg}{nbb}\textcircled{2}$
2.	$\frac{-3De}{nf}\textcircled{1} + \frac{3Dg}{nb}\textcircled{2}$
0.	$\frac{+3D}{n}\textcircled{1} - \frac{3D}{n}\textcircled{2}$ Voyez fig. 29.
— 1.	$\frac{-3D}{2negz^{\frac{2}{3}n}} - \frac{3Df}{ne}\textcircled{1} + \frac{3Dh}{ng}\textcircled{2}$
— 2.	$\frac{-3D}{5negz^{\frac{1}{3}n}} + \frac{+3Deh}{+3Dfg} + \frac{3Dff}{2neegg z^{\frac{2}{3}n}}\textcircled{1} - \frac{3Dhh}{ngg}\textcircled{2}$
&c.	

$$p = fg - eh$$

1. *Cas.*

$$\left\{\begin{array}{l} OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{e}{f}};\ \textcircled{1} = \frac{1}{3p}\sqrt[3]{\frac{ff}{ee}}\times -\beta(BP:BO) \\ \quad +(DP:DO)+\downarrow(PBO). \\ OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{g}{h}};\ \textcircled{2} = \frac{1}{3p}\sqrt[3]{\frac{hh}{gg}}\times -\beta(BP:BO) \\ \quad +(DP:DO)+\downarrow(PBO). \end{array}\right.$$

2. *Cas.*

$$\left\{\begin{array}{l} OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{-e}{f}};\ \textcircled{1} = \frac{-1}{3p}\sqrt[3]{\frac{ff}{ee}}\times -(AP:AO) \\ \quad +\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO). \\ OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{-g}{h}};\ \textcircled{2} = \frac{-1}{3p}\sqrt[3]{\frac{hh}{gg}}\times -(AP:AO) \\ \quad +\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO). \end{array}\right.$$

FORME XXVI. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n \times g+hz^n}$

θ	
&c.	
3.	$+3Dfgz^{\frac{2}{3}n}$ $\frac{3Dz^{\frac{5}{3}n}}{5nfh} \frac{+3Dehz^{\frac{2}{3}n}}{2nffhh} \frac{3De^3}{nf^3}$ ① $+\frac{3Dg^3}{nh^3}$ ②
2.	$\frac{3Dz^{\frac{2}{3}n}}{2nfh} + \frac{3Dee}{nff}$ ① $- \frac{3Dgg}{nhh}$ ②
1.	$\frac{-3De}{nf}$ ① $+\frac{3Dg}{nh}$ ②
0.	$\frac{+3D}{n}$ ① $-\frac{3D}{n}$ ② Voyez fig. 29.
1.	$\frac{-3D}{negz^{\frac{1}{3}n}} - \frac{3Df}{ne}$ ① $+\frac{3Dh}{ng}$ ②
2.	$+3Dfg$ $\frac{-3D}{4negz^{\frac{4}{3}n}} \frac{+3Deh}{neegg z^{\frac{1}{3}n}} + \frac{3Dff}{nee}$ ① $-\frac{3Dbb}{ngg}$ ②
&c.	

$$p = fg - eh$$

1. Cas.

$OP : OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{e}{f}}$; ① $= \frac{1}{3p}\sqrt[3]{\frac{f}{e}} \times \beta(BP : BO)$
$- (DP : DO) + \downarrow (PBO)$.

$OP : OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{g}{h}}$; ② $= \frac{1}{3p}\sqrt[3]{\frac{h}{g}} \times \beta(BP : BO)$
$- (DP : DO) + \downarrow (PBO)$.

2. Cas.

$OP : OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{e}{f}}$; ① $= \frac{1}{3p}\sqrt[3]{\frac{f}{e}} \times -(AP : AO)$
$+ \beta(CP : CO) - \downarrow (PCO)$.

$OP : OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{g}{h}}$; ② $= \frac{1}{3p}\sqrt[3]{\frac{h}{g}} \times -(AP : AO)$
$+ \beta(CP : CO) - \downarrow (PCO)$.

θ	FORME XXVII. $\frac{Dz^{n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n \times g+hz^n}$
&c.	
3.	$\frac{4Dz^{\frac{5}{4}n}}{5nfh} - \frac{+4Dehz^{\frac{1}{4}n} \; +4Dfgz^{\frac{1}{4}n}}{nffhh} - \frac{4De^3}{nf^3}$ ① $+ \frac{4Dg^3}{nh^3}$ ②
2.	$\frac{4Dz^{\frac{1}{4}n}}{nfh} + \frac{4Dee}{nff}$ ① $- \frac{4Dgg}{nhh}$ ②
2.	$\frac{-4De}{nf}$ ① $+ \frac{4Dg}{nh}$ ②
0.	$\frac{+4D}{n}$ ① $- \frac{4D}{n}$ ② Voyez fig. 30.
— 1.	$\frac{-4D}{3negz^{\frac{1}{4}n}} - \frac{4Df}{ne}$ ① $+ \frac{4Dh}{ng}$ ②
— 2.	$\frac{-4D}{7negz^{\frac{7}{4}n}} + \frac{+4Deb \; +4Dfg}{3neegg z^{\frac{3}{4}n}} + \frac{4Dff}{nee}$ ① $- \frac{4Dhh}{ngg}$ ②
&c.	

$$p = fg - eh$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP : OA :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{e}{f}}; \; ① = \frac{1}{4p}\sqrt[4]{\frac{f^3}{e^3}} \times -\beta(BP:BO) \\ \quad +\beta(DP:DO) + \downarrow(PBO) + \downarrow(PDO) \\ OP : OA :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{g}{h}}; \; ② = \frac{1}{4p}\sqrt[4]{\frac{h^3}{g^3}} \times -\beta(BP:BO) \\ \quad +\beta(DP:DO) + \downarrow(PBO) + \downarrow(PDO). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP : OA :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{-e}{f}}; \; ① = \frac{-1}{4p}\sqrt[4]{\frac{-f^3}{e^3}} \times -(AP:AO) \\ \quad +(EP:EO) + \chi(PCO). \\ OP : OA :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{-g}{h}}; \; ② = \frac{-1}{4p}\sqrt[4]{\frac{-h^3}{g^3}} \times -(AP:AO) \\ \quad +(EP:EO) + \chi(PCO). \end{cases}$$

FORME

θ	FORME XXVIII. $\frac{Dz^{\frac{1}{4}n+\frac{3}{4}n-1}dz}{e+fz^n \times g+hz^n}$
&c.	
3.	$\frac{4Dz^{\frac{7}{4}n}}{7nfh} - \frac{+4Dehz^{\frac{3}{4}n} +4Dfgz^{\frac{3}{4}n}}{3nffhh} - \frac{4De^3}{nf^3}$ ① $+ \frac{4Dg^3}{nh^3}$ ②
2.	$\frac{4Dz^{\frac{3}{4}n}}{3nfh} + \frac{4Dee}{nff}$ ① $- \frac{4Dgg}{nhh}$ ②
1.	$\frac{-4De}{nf}$ ① $+ \frac{4Dg}{nh}$ ②
0.	$\frac{+4D}{n}$ ① $- \frac{4D}{n}$ ② Voyez fig. 30.
— 1.	$\frac{-4D}{negz^{\frac{1}{4}n}} - \frac{4Df}{ne}$ ① $+ \frac{4Dh}{ng}$ ②
— 2.	$\frac{-4D}{5negz^{\frac{1}{4}n}} + \frac{+4Dfg +4Deh}{neegg z^{\frac{1}{4}n}} + \frac{4Dff}{nee}$ ① $- \frac{4Dhh}{ngg}$ ②
&c.	

$$p = fg - eh$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP : OA :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{e}{f}}; \quad ① = \frac{1}{4p}\sqrt[4]{\frac{f}{e}} \times \beta(BP:BO) \\ \quad -\beta(DP:DO) + \downarrow(PBO) + \downarrow(PDO). \\ OP : OA :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{g}{h}}; \quad ② = \frac{1}{4p}\sqrt[4]{\frac{h}{g}} \times \beta(BP:BO) \\ \quad -\beta(DP:DO) + \downarrow(PBO) + \downarrow(PDO). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP : OA :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{-e}{f}}; \quad ① = \frac{-1}{4p}\sqrt[4]{\frac{-f}{e}} \times -(AP:AO) \\ \quad +(EP:EO) - \chi(PCO). \\ OP : OA :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{-g}{h}}; \quad ② = \frac{-1}{4p}\sqrt[4]{\frac{-h}{g}} \times -(AP:AO) \\ \quad +(EP:EO) - \chi(PCO). \end{cases}$$

FORME XXIX. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$

θ	
&c.	
4.	$\frac{Dz^{2n}}{2ng} - \frac{Dfz^n}{ngg} + \frac{+Dff - Deg}{2ng^3}M + \frac{-Df^3 + 3Defg}{2ng^3}$ (I)
3.	$\frac{Dz^n}{ng} - \frac{Df}{2ngg}M + \frac{+Dff - 2Deg}{2ngg}$ (I)
2.	$\frac{D}{2ng}M - \frac{Df}{2ng}$ (I)
1.	$\frac{D}{n}$ (I) Voyez fig. 28.
0.	$\frac{-D}{2ne}m - \frac{Df}{2ne}$ (I)
-1.	$\frac{-D}{nez^n} + \frac{Df}{2nee}m + \frac{+Dff - 2Deg}{2nee}$ (I)
-2.	$\frac{-D}{2nez^{2n}} + \frac{Df}{nez^n} + \frac{+Dff - Deg}{2ne^3}m + \frac{-Df^3 + 3Defg}{2ne^3}$ (I)
&c.	

$M = 1\,(e+fz^n+gz^{2n} : e)$. $m = 1\,(e+fz^n+gz^{2n} : gz^{2n})$.

1. *Cas.* OP : OA :: $\frac{1}{2}f+gz$: $\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}$;

(I) $= \frac{-1}{2}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ff-eg}} \times$ (CP : AP).

2. *Cas.* OP : OA :: $\frac{1}{2}f+gz^n$: $\sqrt{eg-\frac{1}{4}ff}$;

(I) $= \frac{+1}{2}\sqrt{\frac{1}{eg-\frac{1}{4}ff}} \times \downarrow$ (PBO).

θ	FORME XXX. $\frac{Dz^{\frac{1}{2}n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^{n}+gz^{2n}}$ 1. *Cas.*
&c.	
4.	$\frac{2Dz^{\frac{5}{2}n}}{5ng} - \frac{2Dfz^{\frac{3}{2}n}}{3ngg} + \frac{+Dff-2Deg}{ng^{3}}z^{\frac{1}{2}n} - \frac{2Dp^{4}}{ng^{4}}\textcircled{1} + \frac{2Dq^{4}}{ng^{4}}\textcircled{2}$
3.	$\frac{2Dz^{\frac{3}{2}n}}{3ng} - \frac{2Dfz^{\frac{1}{2}n}}{ngg} + \frac{2Dp^{3}}{ng^{3}}\textcircled{1} - \frac{2Dq^{3}}{ng^{3}}\textcircled{2}$
2.	$\frac{2Dz^{\frac{1}{2}n}}{ng} - \frac{2Dpp}{ngg}\textcircled{1} + \frac{2Dqq}{ngg}\textcircled{2}$
1.	$\frac{2Dp}{ng}\textcircled{1} - \frac{2Dq}{ng}\textcircled{2}$
0.	$\frac{-2D}{n}\textcircled{1} + \frac{2D}{n}\textcircled{2}$ Voyez fig. 28.
— 1.	$\frac{-2D}{nez^{\frac{1}{2}n}} + \frac{2Dg}{np}\textcircled{1} - \frac{2Dg}{nq}\textcircled{2}$
— 2.	$\frac{-2D}{3nez^{\frac{3}{2}n}} + \frac{2Df}{neez^{\frac{1}{2}n}} - \frac{2Dgg}{npp}\textcircled{1} + \frac{2Dgg}{nqq}\textcircled{2}$
— 3.	$\frac{-2D}{5nez^{\frac{5}{2}n}} + \frac{2Df}{3neez^{\frac{3}{2}n}} - \frac{+2Dff-2Deg}{ne^{3}z^{\frac{1}{2}n}} + \frac{2Dg^{3}}{np^{3}}\textcircled{1} - \frac{2Dg^{3}}{nq^{3}}\textcircled{2}$
&c.	

$a = \sqrt{ff-4eg}$; $p = \frac{1}{2}f + \frac{1}{2}a$; $q = \frac{1}{2}f - \frac{1}{2}a$.

1. *Cas.* $\begin{cases} OP : OA :: \sqrt[2]{z^{n}} : \sqrt[2]{\frac{p}{g}}; & \textcircled{1} = \frac{1}{2a}\sqrt[2]{\frac{g}{p}} \times \downarrow (PBO). \\ OP : OA :: \sqrt[2]{z^{n}} : \sqrt[2]{\frac{q}{g}}; & \textcircled{2} = \frac{1}{2a}\sqrt[2]{\frac{g}{q}} \times \downarrow (PBO). \end{cases}$

2. *Cas.* $\begin{cases} OP : OA :: \sqrt[2]{z^{n}} : \sqrt[2]{\frac{-p}{g}}; & \textcircled{1} = \frac{-1}{2a}\sqrt[2]{\frac{-g}{p}} \times (CP : AP) \\ OP : OA :: \sqrt[2]{z^{n}} : \sqrt[2]{\frac{-q}{g}}; & \textcircled{2} = \frac{-1}{2a}\sqrt[2]{\frac{-g}{q}} \times (CP : AP) \end{cases}$

θ	FORME XXX. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 2. Cas.
&c.	
3.	$\frac{2Dz^{\frac{3}{2}n}}{3ng}-\frac{2Dfz^{\frac{1}{2}n}}{ngg}+\frac{\overline{r-f},f+eg}{2ngg}DM+\frac{\overline{r+f},f-eg}{2ngg}Dx\,①+②$
2.	$\frac{2Dz^{\frac{1}{2}n}}{ng}+\frac{f-r}{2ng}DM-\frac{+f+r}{2ng}Dx\,①+②$
1.	$\frac{-1}{2n}DM+\frac{1}{2n}Dx\,①+②$
0.	$\frac{g}{2nr}DM+\frac{g}{2nr}Dx\,①+②$ Voyez fig. 28.
1.	$\frac{-2D}{nez^{\frac{1}{2}n}}+\frac{r-f}{2ner}gDM-\frac{+r+f}{2ner}gDx\,①+②$
2.	$\frac{-2D}{3nez^{\frac{3}{2}n}}+\frac{2Df}{neez^{\frac{1}{2}n}}+\frac{\overline{f-r},f-eg}{2neer}gDM+\frac{\overline{f+r},f-eg}{2neer}gDx\,①+②$
&c.	

$r=\sqrt{eg}$, $s=\sqrt{-fg+2\sqrt{eg}}$, $M=\frac{1}{r}(r+sz^{\frac{1}{2}n}+gz^n:r-sz^{\frac{1}{2}n}+gz^n)$.

1. Cas.

OP : OA :: $\pm\frac{1}{2}s+gz^{\frac{1}{2}n}:\sqrt{\frac{1}{4}ss-gr}$; ① $=\mp\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ss-gr}}\times$ (CP : AP).

OP : OA : $\mp\frac{1}{2}s+gz^{\frac{1}{2}n}:\sqrt{\frac{1}{4}ss-gr}$; ② $=\mp\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ss-gr}}\times$ (CP : AP).

2. Cas.

OP : OA :: $\pm\frac{1}{2}s+gz^{\frac{1}{2}n}:\sqrt{gr-\frac{1}{4}ss}$; ① $=\pm\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{gr-\frac{1}{4}ss}}\times$ ↓(PBO).

OP : OA :: $\mp\frac{1}{2}s+gz^{\frac{1}{2}n}:\sqrt{gr-\frac{1}{4}ss}$; ② $=\pm\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{gr-\frac{1}{4}ss}}\times$ ↓(PBO).

θ	FORME XXXI. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 1. *Cas.*
&c.	
3.	$\frac{3Dz^{\frac{4}{3}n}}{4ng} - \frac{3Dfz^{\frac{1}{3}n}}{ngg} + \frac{3Dp^3}{ng^3}\,①\, - \frac{3Dq^3}{ng^3}\,②$
2.	$\frac{3Dz^{\frac{1}{3}n}}{ng} - \frac{3Dpp}{ngg}\,①\, + \frac{3Dqq}{ngg}\,②$
1.	$\frac{3Dp}{ng}\,①\, - \frac{3Dq}{ng}\,②$
0.	$\frac{-3D}{n}\,①\, + \frac{3D}{n}\,②$ Voyez fig. 29.
−1.	$\frac{-3D}{2nez^{\frac{2}{3}n}} + \frac{3Dg}{np}\,①\, - \frac{3Dg}{nq}\,②$
−2.	$\frac{-3D}{5nez^{\frac{1}{3}n}} + \frac{3Df}{2nezz^{\frac{2}{3}n}} - \frac{3Dgg}{npp}\,①\, + \frac{3Dgg}{nqq}\,②$
&c.	

$a = \sqrt{ff - 4eg}$; $p = \frac{1}{2}f + \frac{1}{2}a$; $q = \frac{1}{2}f - \frac{1}{2}a$.

1. *Cas.*
$$\begin{cases} \text{OP} : \text{OA} :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{p}{g}}\,; \quad ① = \frac{1}{3a}\sqrt[3]{\frac{gg}{pp}} \times -\beta\,(\text{BP} : \text{BO}) \\ \quad + (\text{DP} : \text{DO}) + \downarrow (\text{PBO}). \\ \text{OP} : \text{OA} :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{q}{g}}\,; \quad ② = \frac{1}{3a}\sqrt[3]{\frac{gg}{qq}} \times -\beta\,(\text{BP} : \text{BO}) \\ \quad + (\text{DP} : \text{DO}) + \downarrow (\text{PBO}). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} \text{OP} : \text{OA} :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{-p}{g}}\,; \quad ① = \frac{-1}{3a}\sqrt[3]{\frac{gg}{pp}} \times -(\text{AP} : \text{AO}) \\ \quad + \beta\,(\text{CP} : \text{CO}) + \downarrow (\text{PCO}). \\ \text{OP} : \text{OA} :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{-q}{g}}\,; \quad ② = \frac{-1}{3a}\sqrt[3]{\frac{gg}{qq}} \times -(\text{AP} : \text{AO}) \\ \quad + \beta\,(\text{CP} : \text{CO}) + \downarrow (\text{PCO}). \end{cases}$$

θ	FORME XXXII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 1. Cas.
&c.	
3.	$\frac{3Dz^{\frac{5}{3}n}}{5ng} - \frac{3Dfz^{\frac{2}{3}n}}{2ngg} + \frac{3Dp^3}{ng^3}$ ① $- \frac{3Dq^3}{ng^3}$ ②
2.	$\frac{3Dz^{\frac{2}{3}n}}{2ng} - \frac{3Dpp}{ngg}$ ① $+ \frac{3Dqq}{ngg}$ ②
1.	$\frac{3Dp}{ng}$ ① $- \frac{3Dq}{ng}$ ②
0.	$\frac{-3D}{n}$ ① $+ \frac{3D}{n}$ ② Voyez fig. 29.
−1.	$\frac{-3D}{nez^{\frac{1}{3}n}} + \frac{3Dg}{np}$ ① $- \frac{3Dg}{nq}$ ②
−2.	$\frac{-3D}{4nez^{\frac{4}{3}n}} + \frac{3Df}{neez^{\frac{1}{3}n}} - \frac{3Dgg}{npp}$ ① $+ \frac{3Dgg}{nqq}$ ②
&c.	

$a = \sqrt{ff - 4eg}$; $p = \frac{1}{2}f + \frac{1}{2}a$; $q = \frac{1}{2}f - \frac{1}{2}a$.

1. Cas.
- OP : OA :: $\sqrt[3]{z^n}$: $\sqrt[3]{\frac{p}{g}}$; ① $= \frac{1}{3a}\sqrt[3]{\frac{g}{p}} \times \beta$ (BP : BO) $-$ (DP : DO) $+ \downarrow$ (PBO).
- OP : OA :: $\sqrt[3]{z^n}$: $\sqrt[3]{\frac{q}{g}}$; ② $= \frac{1}{3a}\sqrt[3]{\frac{g}{q}} \times \beta$ (BP : BO) $-$ (DP : DO) $+ \downarrow$ (PBO).

2. Cas.
- OP : OA :: $\sqrt[3]{z^n}$: $\sqrt[3]{\frac{-p}{g}}$; ① $= \frac{-1}{3a}\sqrt[3]{\frac{-g}{p}} \times -$ (AP : AO) $+ \beta$ (CP : CO) $- \downarrow$ (PCO).
- OP : OA :: $\sqrt[3]{z^n}$: $\sqrt[3]{\frac{-q}{g}}$; ② $= \frac{-1}{3a}\sqrt[3]{\frac{-g}{q}} \times -$ (AP : AO) $+ \beta$ (CP : CO) $- \downarrow$ (PCO).

θ	FORME XXXIII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 1. *Cas.*
&c.	
3.	$\frac{4Dz^{\frac{5}{4}n}}{5ng} - \frac{4Dfz^{\frac{1}{4}n}}{ngg} + \frac{4Dp^3}{ng^3}①ⓘ - \frac{4Dq^3}{ng^3}②$
2.	$\frac{4Dz^{\frac{1}{4}n}}{ng} - \frac{4Dpp}{ngg}①ⓘ + \frac{4Dqq}{ngg}②$
1.	$\frac{4Dp}{ng}①ⓘ - \frac{4Dq}{ng}②$
0.	$\frac{-4D}{n}①ⓘ + \frac{4D}{n}②$ Voyez fig. 30.
— 1.	$\frac{-4D}{3nez^{\frac{3}{4}n}} + \frac{4Dg}{np}①ⓘ - \frac{4Dg}{nq}②$
— 2.	$\frac{-4D}{7nez^{\frac{7}{4}n}} + \frac{4Df}{3neez^{\frac{3}{4}n}} - \frac{4Dgg}{npp}①ⓘ + \frac{4Dgg}{nqq}②$
&c.	

$$a = \sqrt{ff - 4eg}\,;\quad p = \tfrac{1}{2}f + \tfrac{1}{2}a\,;\quad q = \tfrac{1}{2}f - \tfrac{1}{2}a.$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} \text{OP} : \text{OA} :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{p}{g}}\,;\quad ① = \frac{1}{4a}\sqrt[4]{\frac{g^3}{p^3}} \times -\beta\,(\text{BP} : \text{BO}) \\ \quad + \beta\,(\text{DP} : \text{DO}) + \downarrow(\text{PBO}) + \downarrow(\text{PDO}). \\ \text{OP} : \text{OA} :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{q}{g}}\,;\quad ② = \frac{1}{4a}\sqrt[4]{\frac{g^3}{q^3}} \times -\beta\,(\text{BP} : \text{BO}) \\ \quad + \beta\,(\text{DP} : \text{DO}) + \downarrow(\text{PBO}) + \downarrow(\text{PDO}). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} \text{OP} : \text{OA} :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{-p}{g}}\,;\quad ① = \frac{-1}{4a}\sqrt[4]{\frac{-g^3}{p^3}} \times -(\text{AP} : \text{AO}) \\ \quad + (\text{EP} : \text{EO}) + \chi(\text{PCO}). \\ \text{OP} : \text{OA} :: \sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{-q}{g}}\,;\quad ② = \frac{-1}{4a}\sqrt[4]{\frac{-g^3}{q^3}} \times -(\text{AP} : \text{AO}) \\ \quad + (\text{EP} : \text{EO}) + \chi(\text{PCO}). \end{cases}$$

FORME

θ	FORME XXXIV. $\frac{Dz^{\frac{1}{4}n+\frac{3}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 1. *Cas.*
&c.	
3.	$\frac{4Dz^{\frac{7}{4}n}}{7ng} - \frac{4Dfz^{\frac{3}{4}n}}{3ngg} + \frac{4Dp^3}{ng^3}$ ① $- \frac{4Dq^3}{ng^3}$ ②
2.	$\frac{4Dz^{\frac{3}{4}n}}{3ng} - \frac{4Dpp}{ngg}$ ① $+ \frac{4Dqq}{ngg}$ ②
1.	$\frac{4Dp}{ng}$ ① $- \frac{4Dq}{ng}$ ②
0.	$\frac{-4D}{n}$ ① $+ \frac{4D}{n}$ ② Voyez fig. 30.
−1.	$\frac{-4D}{nez^{\frac{1}{4}n}} + \frac{4Dg}{\cdot np}$ ① $- \frac{4Dg}{nq}$ ②
−2.	$\frac{-4D}{5nez^{\frac{1}{4}n}} + \frac{4Df}{neez^{\frac{1}{4}n}} - \frac{4Dgg}{npp}$ ① $+ \frac{4Dgg}{nqq}$ ②
&c.	

$a = \sqrt{ff - 4eg}$; $p = \frac{1}{2}f + \frac{1}{2}a$; $q = \frac{1}{2}f - \frac{1}{2}a$.

1. *Cas.*

OP : OA :: $\sqrt[4]{z^n}$: $\sqrt[4]{\frac{p}{g}}$; ① $= \frac{1}{4a}\sqrt[4]{\frac{g}{p}} \times + \beta$ (BP : BO) $- \beta$ (DP : DO) $+ \downarrow$ (PBQ) $+ \downarrow$ (PDO).

OP : OA :: $\sqrt[4]{z^n}$: $\sqrt[4]{\frac{q}{g}}$; ② $= \frac{1}{4a}\sqrt[4]{\frac{g}{q}} \times + \beta$ (BP : BO) $- \beta$ (DP : DO) $+ \downarrow$ (PBO) $+ \downarrow$ (PDO).

2. *Cas.*

OP : OA :: $\sqrt[4]{z^n}$: $\sqrt[4]{\frac{-p}{g}}$; ① $= \frac{-1}{4a}\sqrt[4]{\frac{-g}{p}} \times -$ (AP : AO) $+$ (EP : EO) $- \chi$ (PCO).

OP : OA :: $\sqrt[4]{z^n}$: $\sqrt[4]{\frac{-q}{g}}$; ② $= \frac{-1}{4a}\sqrt[4]{\frac{-g}{q}} \times -$ (AP : AO) $+$ (EP : EO) $- \chi$ (PCO).

θ	FORME XXXIII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^{n}+gz^{2n}}$ 2. Cas.
&c.	
2.	$\frac{4Dz^{\frac{1}{4}n}}{ng}+\frac{fg-as-gr}{2ngs}D\times①+②+M;+\frac{gr-as-fg}{2ngs}D\times③+④+N.$
1.	$\frac{-g}{2ns}D\times①+②+M;+\frac{g}{2ns}D\times③+④+N.$ Voyez fig. 28.
0.	$\frac{as+gr}{2nes}D\times①+②+M;+\frac{as-gr}{2nes}D\times③+④+N.$
— 1.	$\frac{-4D}{3nez^{\frac{3}{4}n}}+\frac{egg-afs-fgr}{2nees}D\times①+②+M;+\frac{fgr-afs-egg}{2nees}D\times③+④+N.$
&c.	

$$r=\sqrt{eg};\quad s=\sqrt{-fg+2\sqrt{eg^3}};\quad a=\sqrt[4]{eg^3};$$

$$b=\sqrt{+\sqrt{-fg^3+2\sqrt{eg^7}}+2\sqrt[4]{eg^7}};\quad c=\sqrt{-\sqrt{-fg^3+2\sqrt{eg^7}}+2\sqrt[4]{eg^7}}.$$

1. Cas.

OP : OA :: $\pm\frac{1}{2}c+gz^{\frac{1}{4}n}:\sqrt{\frac{1}{4}cc-ag}$; ① $=\pm\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}cc-ag}}\times$ (CP : AP).

OP : OA :: $\mp\frac{1}{2}c+gz^{\frac{1}{4}n}:\sqrt{\frac{1}{4}cc-ag}$; ② $=\mp\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}cc-ag}}\times$ (CP : AP).

OP : OA :: $\pm\frac{1}{2}b+gz^{\frac{1}{4}n}:\sqrt{\frac{1}{4}bb-ag}$; ③ $=-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}bb-ag}}\times$ (CP : AP).

OP : OA :: $-\frac{1}{2}b+gz^{\frac{1}{4}n}:\sqrt{\frac{1}{4}bb-ag}$; ④ $=-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}bb-ag}}\times$ (CP : AP).

2. Cas.

OP : OA :: $+\frac{1}{2}c+gz^{\frac{1}{4}n}:\sqrt{ag-\frac{1}{4}cc}$; ① $=+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{ag-\frac{1}{4}cc}}\times$ ↓ (PBO).

OP : OA :: $-\frac{1}{2}c+gz^{\frac{1}{4}n}:\sqrt{ag-\frac{1}{4}cc}$; ② $=+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{ag-\frac{1}{4}cc}}\times$ ↓ (PBO).

OP : OA :: $+\frac{1}{2}b+gz^{\frac{1}{4}n}:\sqrt{ag-\frac{1}{4}bb}$; ③ $=+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{ag-\frac{1}{4}bb}}\times$ ↓ (PBO).

OP : OA :: $-\frac{1}{2}b+gz^{\frac{1}{4}n}:\sqrt{ag-\frac{1}{4}bb}$; ④ $=+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{ag-\frac{1}{4}bb}}\times$ ↓ (PBO).

θ	FORME XXXIV. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 2. Cas.
&c.	
2.	$\frac{4Dz^{\frac{3}{4}n}}{3ng}+\frac{ar-fs-af}{2ngs}D\times①+②-M;+\frac{af-fs-ar}{2ngs}D\times③+④-N.$
1.	$\frac{s+a}{2ns}D\times①+②-M;+\frac{s-a}{2ns}D\times③+④-N.$ V. fig. 28.
0.	$\frac{-ar}{2nes}D\times①+②-M;+\frac{ar}{2nes}D\times③+④-N.$
— 1.	$\frac{-4D}{ne z^{\frac{1}{4}n}}+\frac{afr-egs-aeg}{2nees}D\times①+②-M;+\frac{aeg-egs-afr}{2nees}D\times③+④-N.$
&c.	

$M=\frac{1}{e}(a+cz^{\frac{1}{4}n}+gz^{\frac{1}{2}n}:a-cz^{\frac{1}{4}n}+gz^{\frac{1}{2}n}).$
$N=\frac{1}{b}(a+bz^{\frac{1}{4}n}+gz^{\frac{1}{2}n}:a-bz^{\frac{1}{4}n}+gz^{\frac{1}{2}n}).$

Les valeurs des quantités, $r, s, a, b, c, ①, ②, ③, ④, M, N,$ sont les mêmes pour les deux formes.

θ	FORME XXXV. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\times k+lz^n}$
&c.	
4.	$\frac{Dz^n}{ngl}-\frac{+fl}{+gk}{}_{2nggll}DM+\frac{Dk^3}{2nll}N+\frac{+effl-f^3k}{-2eegl+3efgk}{}_{2ngg}D\,(1)$
3.	$\frac{D}{2ngl}M-\frac{Dkk}{2nl}N+\frac{ffk-2egk-efl}{2ng}D\,(1)$
2.	$\frac{Dk}{2n}N+\frac{2el-fk}{2n}D\,(1)$
1.	$\frac{-Dl}{2n}N+\frac{2gk-fl}{2n}D\,(1)$ Voyez fig. 28.
0.	$\frac{-D}{2nek}m+\frac{Dll}{2nk}N+\frac{ffl-2egl-fgk}{2ne}D\,(1)$
−1.	$\frac{-D}{nekz^n}+\frac{+el}{+fk}{}_{2neekk}Dm-\frac{Dl^3}{2nkk}N+\frac{+ffgk-f^3l}{-2eggk+3efgl}{}_{2nee}D\,(1)$
&c.	

$M=1\,(e+fz^n+gz^{2n}:e)$. $m=1\,(e+fz^n+gz^{2n}:gz^{2n})$.

$s=ell-fkl+gkk$; $N=\frac{1}{s}(e+fz^n+gz^{2n}:\overline{k+lz^n}|^2)$.

1. *Cas.* OP : OA :: $\frac{1}{2}f+gz^n:\sqrt{\frac{1}{4}ff-eg}$; $(1)=\frac{-1}{2s}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ff-eg}}\times$ (CP : AP).

2. *Cas.* OP : OA :: $\frac{1}{2}f+gz^n:\sqrt{eg-\frac{1}{4}ff}$; $(1)=\frac{+1}{2s}\sqrt{\frac{1}{eg+\frac{1}{4}ff}}\times$ ⏚ (PBO).

θ	FORME XXXVI. $\frac{Dz^{\frac{1}{2}n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}, k+lz^n}$ 1. Cas.
&c.	
3.	$\frac{2Dz^{\frac{1}{2}n}}{ngl} - \frac{2Dk^3}{nll}①+\frac{2kp^3-2elpp}{ngg}D②+\frac{2elqq-2kq^3}{ngg}D③$
2.	$\frac{2Dkk}{nl}①+\frac{2elp-2kpp}{ng}D②+\frac{2kqq-2elq}{ng}D③$
1.	$\frac{-2Dk}{n}①+\frac{2kp-2el}{n}D②+\frac{2el-2kq}{n}D③$ Voyez fig. 28.
0.	$\frac{2Dl}{n}①+\frac{2lq-2gk}{n}D②+\frac{2gk-2lp}{n}D③$
−1.	$\frac{-2D}{nekz^{\frac{1}{2}n}} - \frac{2Dll}{nk}①+\frac{2ggk-2glq}{np}D②+\frac{2glp-2ggk}{nq}D③$
&c.	

$a=\sqrt{ff-4eg}$; $p=\frac{1}{2}f+\frac{1}{2}a$; $q=\frac{1}{2}f-\frac{1}{2}a$; $t=ell-fkl+gkk$;

1. Cas.
$$\begin{cases} OP:OA::\sqrt[2]{z^n}:\sqrt[2]{\frac{k}{l}}; & ①=\frac{1}{2t}\sqrt[2]{\frac{l}{k}}\times\downarrow(PBO). \\ OP:OA::\sqrt[2]{z^n}:\sqrt[2]{\frac{p}{g}}; & ②=\frac{1}{2at}\sqrt[2]{\frac{g}{p}}\times\downarrow(PBO). \\ OP:OA::\sqrt[2]{z^n}:\sqrt[2]{\frac{q}{g}}; & ③=\frac{1}{2at}\sqrt[2]{\frac{g}{q}}\times\downarrow(PBO). \end{cases}$$

2. Cas.
$$\begin{cases} OP:OA::\sqrt[2]{z^n}:\sqrt[2]{\frac{-k}{l}}; & ①=\frac{-1}{2t}\sqrt[2]{\frac{-l}{k}}\times(CP:AP) \\ OP:OA::\sqrt[2]{z^n}:\sqrt[2]{\frac{-p}{g}}; & ②=\frac{-1}{2at}\sqrt[2]{\frac{-g}{p}}\times(CP:AP) \\ OP:OA::\sqrt[2]{z^n}:\sqrt[2]{\frac{-q}{g}}; & ③=\frac{-1}{2at}\sqrt[2]{\frac{-g}{q}}\times(CP:AP). \end{cases}$$

θ	FORME XXXVI. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\times k+lz^n}$ 2. Cas.
&c.	
3.	$\frac{2Dz^{\frac{1}{2}n}}{ngl}-\frac{2k^3}{nll}D①+\frac{+egk}{2ng}DM+\frac{+egk}{2ng}\overline{\frac{el-fk}{f-r},\frac{el-fk}{f+r}}D\times②+③$
2.	$\frac{2kk}{nl}D①+\frac{-el+k}{2n},\overline{\frac{f-r}{f+r}}DM+\frac{-el+k}{2n},\overline{\frac{f+r}{f+r}}D\times②+③$
1.	$\frac{-2k}{n}D①+\frac{rl-gk}{2n}DM-\frac{+rl+gk}{2n}D\times②+③$ Voy. fig. 28.
0.	$\frac{2l}{n}D①+\frac{ggk-gl}{2nr},\overline{\frac{f-r}{f+r}}DM+\frac{-ggk+gl}{2nr},\overline{\frac{f+r}{f+r}}D\times②+③$
— 1.	$\frac{-2D}{nekz^{\frac{1}{2}n}}-\frac{2ll}{nk}D①+\frac{-egg l}{2ner}\overline{\frac{fgl-ggk}{f-r}}DM+\frac{+egg l}{2ner}\overline{\frac{ggk-fgl}{f+r}}D\times②+③$
&c.	

$r=\sqrt{eg}$. $s=\sqrt{-fg+2\sqrt{eg^3}}$. $t=ell-fkl+gkk$.

$M=\frac{1}{st}(r+sz^{\frac{1}{2}n}+gz^n:r-sz^{\frac{1}{2}n}+gz^n)$.

1. Cas.

OP : OA :: $\sqrt[2]{z^n}:\sqrt[2]{\frac{k}{l}}$; . . . ① $=\frac{+1}{2t}\sqrt[2]{\frac{l}{k}}\times\downarrow$(PBO).

OP : OA :: $\pm\frac{1}{2}s+gz^{\frac{1}{2}n}:\sqrt{\frac{1}{4}ss-gr}$; ② $=\frac{\pm1}{2t}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ss-gr}}\times$ (CP : AP).

OP : OA : $-\frac{1}{2}s+gz^{\frac{1}{2}n}:\sqrt{\frac{1}{4}ss-gr}$; ③ $=\frac{\pm1}{2t}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ss-gr}}\times$ (CP : AP).

2. Cas.

OP : OA :: $\sqrt[2]{z^n}:\sqrt[2]{\frac{-k}{l}}$; . . . ① $=\frac{-1}{2s}\sqrt[2]{\frac{-l}{k}}\times$ (CP : AP).

OP : OA :: $\pm\frac{1}{2}s+gz^{\frac{1}{2}n}:\sqrt{gr-\frac{1}{4}ss}$; ② $=\frac{-1}{2t}\sqrt{\frac{1}{gr-\frac{1}{4}ss}}\times\downarrow$(PBO).

OP : OA :: $-\frac{1}{2}s+gz^{\frac{1}{2}n}:\sqrt{gr-\frac{1}{4}ss}$; ③ $=\frac{-1}{2t}\sqrt{\frac{1}{gr-\frac{1}{4}ss}}\times\downarrow$(PBO).

θ	FORME XXXVII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}, k+lz^n}$ 1.*Cas.*
&c.	
3.	$\frac{3Dz^{\frac{1}{3}n}}{ngl} - \frac{3Dk^3}{nll}\textcircled{1} + \frac{3kp^3-3elpp}{ngg}D\textcircled{2} + \frac{3elqq-3kq^3}{ngg}D\textcircled{3}$
2.	$\frac{3Dkk}{nl}\textcircled{1} + \frac{3elp-3kpp}{ng}D\textcircled{2} + \frac{3kqq-3elq}{ng}D\textcircled{3}$
1.	$\frac{-3Dk}{n}\textcircled{1} + \frac{3kp-3el}{n}D\textcircled{2} + \frac{3el-3kq}{n}D\textcircled{3}$ Voyez fig. 29.
0.	$\frac{3Dl}{n}\textcircled{1} + \frac{3lq-3gk}{n}D\textcircled{2} + \frac{3gk-3lp}{n}D\textcircled{3}$
1.	$\frac{-3D}{2nekz^{\frac{2}{3}n}} - \frac{3Dll}{nk}\textcircled{1} + \frac{3ggk-3glq}{np}D\textcircled{2} + \frac{3glp-3ggk}{nq}D\textcircled{3}$
&c.	

$a = \sqrt{ff-4eg}$; $p = \frac{1}{2}f+\frac{1}{2}a$; $q = \frac{1}{2}f-\frac{1}{2}a$; $t = ell-fkl+gkk$;

1. *Cas.*

$OP:OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{k}{l}}$; $\textcircled{1} = \frac{1}{3t}\sqrt[3]{\frac{ll}{kk}} \times -\beta\,(BP:BO) + (DP:DO) + \downarrow(PBO)$.

$OP:OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{p}{g}}$; $\textcircled{2} = \frac{1}{3at}\sqrt[3]{\frac{gg}{pp}} \times -\beta\,(BP:BO) + (DP:DO) + \downarrow(PBO)$.

$OP:OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{q}{g}}$; $\textcircled{3} = \frac{1}{3at}\sqrt[3]{\frac{gg}{qq}} \times -\beta\,(BP:BO) + (DP:DO) + \downarrow(PBO)$.

2. *Cas.*

$OP:OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{-k}{l}}$; $\textcircled{1} = \frac{-1}{3t}\sqrt[3]{\frac{ll}{kk}} \times -(AP:AO) + \beta\,(CP:CO) + \downarrow(PCO)$.

$OP:OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{-p}{g}}$; $\textcircled{2} = \frac{-1}{3at}\sqrt[3]{\frac{gg}{pp}} \times -(AP:AO) + \beta\,(CP:CO) + \downarrow(PCO)$.

$OP:OA :: \sqrt[3]{z^n} : \sqrt[3]{\frac{-q}{g}}$; $\textcircled{3} = \frac{-1}{3at}\sqrt[3]{\frac{gg}{qq}} \times -(AP:AO) + \beta\,(CP:CO) + \downarrow(PCO)$.

FORME

θ	FORME XXXVIII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\times k+lz^n}$ 1.*Cas.*
&c.	
3.	$\frac{3Dz^{\frac{2}{3}n}}{2ngl}-\frac{3Dk^3}{nll}①+\frac{3kp^3-3elpp}{ngg}D②+\frac{3elqq-3kq^3}{ngg}D③$
2.	$\frac{3Dkk}{nl}①+\frac{3elp-3kpp}{ng}D②+\frac{3kqq-3elq}{ng}D③$
1.	$\frac{-3Dk}{n}①+\frac{3kp-3el}{n}D②+\frac{3el-3kq}{n}D③$ Voyez fig. 29.
0.	$\frac{3Dl}{n}①+\frac{3lq-3gk}{n}D②+\frac{3gk-3lp}{n}D③$
— 1.	$\frac{-3D}{nekz^{\frac{1}{3}n}}-\frac{3Dll}{nk}①+\frac{3ggk-3glq}{np}D②+\frac{3glp-3ggk}{nq}D③$
&c.	

$\alpha=\sqrt{ff-4eg}$; $p=\frac{1}{2}f+\frac{1}{2}\alpha$; $q=\frac{1}{2}f-\frac{1}{2}\alpha$; $t=ell-fkl+gkk$;

1. *Cas.*

OP : OA :: $\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{k}{l}}$; ① $=\frac{1}{3t}\sqrt[3]{\frac{l}{k}}\times\beta$ (BP : BO) — (DP : DO) + $\downarrow$ (PBO).

OP : OA :: $\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{p}{g}}$; ② $=\frac{1}{3\alpha t}\sqrt[3]{\frac{g}{p}}\times\beta$ (BP : BO) — (DP : DO) + $\downarrow$ (PBO).

OP : OA :: $\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{q}{g}}$; ③ $=\frac{1}{3\alpha t}\sqrt[3]{\frac{g}{q}}\times\beta$ (BP : BO) — (DP : DO) + $\downarrow$ (PBO).

2. *Cas.*

OP : OA :: $\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{-k}{l}}$; ① $=\frac{-1}{3t}\sqrt[3]{\frac{-l}{k}}\times-$ (AP : AO) + β (CP : CO) — $\downarrow$ (PCO).

OP : OA :: $\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{-p}{g}}$; ② $=\frac{-1}{3\alpha t}\sqrt[3]{\frac{-g}{p}}\times-$ (AP : AO) + β (CP : CO) — $\downarrow$ (PCO).

OP : OA :: $\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{-q}{g}}$; ③ $=\frac{-1}{3\alpha t}\sqrt[3]{\frac{-g}{q}}\times-$ (AP : AO) + β (CP : CO) — $\downarrow$ (PCO).

θ	FORME XXXIX. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\times k+lz^n}$ 1. *Cas.*
&c.	
2.	$\frac{4Dkk}{nl}$ ① $+\frac{4elp-4kpp}{ng}$ D ② $+\frac{4kqq-4elq}{ng}$ D ③
1.	$\frac{-4Dk}{n}$ ① $+\frac{4kp-4el}{n}$ D ② $+\frac{4el-4kq}{n}$ D ③ Voy. fig. 30.
0.	$\frac{4Dl}{n}$ ① $+\frac{4lq-4gk}{n}$ D ② $+\frac{4gk-4lp}{n}$ D ③
&c.	

$a=\sqrt{ff-4eg}$, $p=\frac{1}{2}f+\frac{1}{2}a$, $q=\frac{1}{2}f-\frac{1}{2}a$, $t=ell-fkl+gkk$.

1. *Cas.*

$OP:OA::\sqrt[4]{z^n}::\sqrt[4]{\frac{k}{l}}$; ① $=\frac{1}{4t}\sqrt[4]{\frac{l^3}{k^3}}\times-\beta(BP:BO)+\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO)$.

$OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{p}{g}}$; ② $=\frac{1}{4at}\sqrt[4]{\frac{g^3}{p^3}}\times-\beta(BP:BO)+\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO)$.

$OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{q}{g}}$; ③ $=\frac{1}{4at}\sqrt[4]{\frac{g^3}{q^3}}\times-\beta(BP:BO)+\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO)$.

2. *Cas.*

$OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{-k}{l}}$; ① $=\frac{-1}{4t}\sqrt[4]{\frac{-l^3}{k^3}}\times-(AP:AO)+(EP:EO)+\chi(PCO)$.

$OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{-p}{g}}$; ② $=\frac{-1}{4at}\sqrt[4]{\frac{-g^3}{p^3}}\times-(AP:AO)+(EP:EO)+\chi(PCO)$.

$OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{-q}{g}}$; ③ $=\frac{-1}{4at}\sqrt[4]{\frac{-g^3}{q^3}}\times-(AP:AO)+(EP:EO)+\chi(PCO)$.

θ	FORME XL. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{3}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\times k+lz^n}$ 1. *Cas.*
&c.	
2.	$\frac{4Dkk}{nl}$ ① $+\frac{4elp-4kpp}{ng}$ D ② $+\frac{4kqq-4elq}{ng}$ D ③
1.	$\frac{-4Dk}{n}$ ① $+\frac{4kp-4el}{n}$ D ② $+\frac{4el-4kq}{n}$ D ③. Voyez fig. 30.
0.	$\frac{4Dl}{n}$ ① $+\frac{4lq-4gk}{n}$ D ② $+\frac{4gk-4lp}{n}$ D ③
&c.	

$a=\sqrt{ff-4eg}$; $p=\frac{1}{2}f+\frac{1}{2}a$, $q=\frac{1}{2}f-\frac{1}{2}a$, $t=ell-fkl+gkk$.

1. *Cas.*

$\left\{\begin{array}{l} OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{k}{l}};\quad ①=\frac{1}{4t}\sqrt[4]{\frac{l}{k}}\times+\beta(BP:BO) \\ \quad -\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO). \\ OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{p}{g}};\quad ②=\frac{1}{4at}\sqrt[4]{\frac{g}{p}}\times+\beta(BP:BO) \\ \quad -\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO). \\ OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{q}{g}};\quad ③=\frac{1}{4at}\sqrt[4]{\frac{g}{q}}\times+\beta(BP:BO) \\ \quad -\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO). \end{array}\right.$

2. *Cas.*

$\left\{\begin{array}{l} OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{-k}{l}};\quad ①=\frac{-1}{4t}\sqrt[4]{\frac{-l}{k}}\times-(AP:AO) \\ \quad +(EP:EO)-\chi(PCO). \\ OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{-p}{g}};\quad ②=\frac{-1}{4at}\sqrt[4]{\frac{-g}{p}}\times-(AP:AO) \\ \quad +(EP:EO)-\chi(PCO). \\ OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{-q}{g}};\quad ③=\frac{-1}{4at}\sqrt[4]{\frac{-g}{q}}\times-(AP:AO) \\ \quad +(EP:EO)-\chi(PCO). \end{array}\right.$

θ	FORME XXXIX. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\times k+lz^n}$ 2. Cas.
&c.	
2.	$\frac{4Dkk}{nl}$ ① $+\frac{\overline{-k,as+gr}\ +g,\overline{fk-el}}{2ns}$ D × ② + ③ + M ; $+\frac{\overline{-k,as-gr}\ -g,\overline{fk-el}}{2ns}$ D × ④ + ⑤ + N.
1.	$\frac{-4Dk}{n}$ ① $+\frac{\overline{+l,as+gr}\ -ggk}{2ns}$ D × ② + ③ + M ; $+\frac{\overline{+l,as-gr}\ +ggk}{2ns}$ D × ④ + ⑤ + N. Voyez fig. 30. $\overline{gk-fl,as+gr}$ $\overline{gk-fl,as-gr}$
0.	$\frac{4Dl}{n}$ ① $+\frac{+eggl}{2nes}$ D × ② + ③ + M ; $+\frac{-eggl}{2nes}$ D × ④ + ⑤ + N.
&c.	

Les valeurs des quantités r, s, t, a, b, c, M, N, se trouvent dans la pag. suiv.

1. *Cas.*

OP : OA :: $\sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{k}{l}}$; ① $= \frac{+1}{4^t}\sqrt[4]{\frac{l^3}{k^3}} \times -\beta(BP:BO)+\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO)$.

OP : OA :: $\pm\frac{1}{2}c + gz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{\frac{1}{4}cc-ag}$; ② $= \frac{-1}{2t}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}cc-ag}} \times (EP:AP)$.

OP : OA :: $\mp\frac{1}{2}c + gz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{\frac{1}{4}cc-ag}$; ③ $= \frac{-1}{2t}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}cc-ag}} \times (EP:AP)$.

OP : OA :: $\pm\frac{1}{2}b + gz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{\frac{1}{4}bb-ag}$; ④ $= \frac{-1}{2t}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}bb-ag}} \times (EP:AP)$.

OP : OA :: $-\frac{1}{2}b + gz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{\frac{1}{4}bb-ag}$; ⑤ $= \frac{-1}{2t}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}bb-ag}} \times (EP:AP)$.

2. *Cas.*

OP : OA :: $\sqrt[4]{z^n} : \sqrt[4]{\frac{-k}{l}}$; ① $= \frac{-1}{4^t}\sqrt[4]{\frac{-l^3}{k^3}} \times -(AP:AO)+(EP:EO)+\chi(PCO)$.

OP : OA :: $+\frac{1}{2}c + gz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{ag-\frac{1}{4}cc}$; ② $= \frac{+1}{2t}\sqrt{\frac{1}{ag-\frac{1}{4}cc}} \times \chi(PCO)$.

OP : OA :: $-\frac{1}{2}c + gz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{ag-\frac{1}{4}cc}$; ③ $= \frac{+1}{2t}\sqrt{\frac{1}{ag-\frac{1}{4}cc}} \times \chi(PCO)$.

OP : OA :: $+\frac{1}{2}b + gz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{ag-\frac{1}{4}bb}$; ④ $= \frac{+1}{2t}\sqrt{\frac{1}{ag-\frac{1}{4}bb}} \times \chi(PCO)$.

OP : OA :: $-\frac{1}{2}b + gz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{ag-\frac{1}{4}bb}$; ⑤ $= \frac{+1}{2t}\sqrt{\frac{1}{ag-\frac{1}{4}bb}} \times \chi(PCO)$.

θ | FORME XL. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\times k+lz^n}$ 2. *Cas.*

&c.

2. $\frac{4Dkk}{nl}$ ① $+\frac{\overline{el-fk},\overline{s+a}\ +akr}{2nrs}$ D × ② + ③ − M; $+\frac{\overline{el-fk},\overline{s-a}\ -akr}{2nrs}$ D × ④ + ⑤ − N.

1. $\frac{-4Dk}{n}$ ① $+\frac{+gk,\overline{s+a}\ -alr}{2nrs}$ D × ② + ③ − M; $+\frac{+gk,\overline{s-a}\ +alr}{2nrs}$ D × ④ + ⑤ − N.

Voyez fig. 30.

0. $\frac{4Dl}{n}$ ① $+\frac{-egl,\overline{s+a}\ -ar,\overline{gk-fl}}{2nes}$ D × ② + ③ − M; $+\frac{-egl,\overline{s-a}\ +ar,\overline{gk-fl}}{2nes}$ D × ④ + ⑤ − N.

&c.

$r=\sqrt{eg}$, $s=\sqrt{-fg+2\sqrt{eg^3}}$, $t=ell-fkl+gkk$; $a=\sqrt[4]{eg^3}$,

$b=\sqrt{+\sqrt{-fg^3+2\sqrt{eg^7}}+2\sqrt[4]{eg^7}}$; $c=\sqrt{-\sqrt{-fg^3+2\sqrt{eg^7}}+2\sqrt[4]{eg^7}}$.

$M=\frac{1}{ct}(a+cz^{\frac{1}{4}n}+gz^{\frac{1}{2}n}:a-cz^{\frac{1}{4}n}+gz^{\frac{1}{2}n})$.

$N=\frac{1}{bt}(a+bz^{\frac{1}{4}n}+gz^{\frac{1}{2}n}:a-bz^{\frac{1}{4}n}+gz^{\frac{1}{2}n})$.

1. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{k}{l}}$; ① $=\frac{+1}{4t}\sqrt[4]{\frac{l}{k}}\times\beta(BP:BO)-\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO)$.

2. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{-k}{l}}$; ① $=\frac{-1}{4t}\sqrt[4]{\frac{-l}{k}}\times-(AP:AO)+(EP:EO)-\chi(PCO)$.

Les valeurs des quantités, ②, ③, ④, ⑤, se trouvent dans la page précédente.

	FORME XLI. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$
&c.	
4.	$\frac{Dz^n}{nh}+\frac{+hk\ -lq}{2nbbl}DM-\frac{Dk^3}{2nl}N+\frac{+llpqq+klq^3\ -2hllpp+3ehllq}{2nbb}D\,(I)$
3.	$\frac{D}{2nh}M-\frac{Dkk}{2n}N-\frac{+klqq+2ehll+llpq}{2nb}D\,(I)$
2.	$\frac{-Dkl}{2n}N+\frac{2llp+klq}{2n}D\,(I)$
1.	$\frac{-Dll}{2n}N+\frac{-2hkl-llq}{2n}D\,(I)$ Voyez fig. 28.
0.	$\frac{-D}{2ne}m-\frac{Dl^3}{nk}N+\frac{llqq-2hllp+hklq}{2np}D\,(I)$
1.	$\frac{-D}{ne}\frac{}{z^n}+\frac{+lp\ -kq}{2neel}Dm-\frac{Dl^4}{2nkk}N-\frac{+hklqq+llq^3\ +2ehhll-3hllpq}{2npp}D\,(I)$
&c.	

Si l'équation $e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}=0$ a une racine réelle $\frac{k}{l}$ qui ſoit la valeur de z^n, ſoit que les autres racines ſoient réelles ou imaginaires, on ſuppoſera, $p=-e\frac{l}{k}$, $q=-e\frac{ll}{kk}-f\frac{l}{k}$; ou $p=f+g\frac{k}{l}+h\frac{kk}{ll}$, $q=g+h\frac{k}{l}$;

$M=1\,(p+qz^n+hz^{2n}:p)$. $m=1\,(p+qz^n+hz^{2n}:hz^{2n})$.

$s=pll+qkl+hkk$; $N=\frac{1}{s}(p+qz^n+hz^{2n}:\overline{lz^n-k}|^2)$;

1. *Cas.* OP : OA :: $\frac{1}{2}q+hz^n:\sqrt[2]{\frac{1}{4}qq-hp}$; $(I)=\frac{-1}{2s}\sqrt[2]{\frac{1}{\frac{1}{4}qq-hp}}\times$ (CP : AP).

2. *Cas.* OP : OA :: $\frac{1}{2}q+hz^n:\sqrt[2]{hp-\frac{1}{4}qq}$; $(I)=\frac{+1}{2s}\sqrt[2]{\frac{1}{hp-\frac{1}{4}qq}}\times$ ↓ (PBO).

θ	FORME XLI. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$ *autre Cas.*
&c.	
4.	$\frac{Dz^n}{nh}+\frac{Dk^3}{n\varkappa\varkappa}①-\frac{Dl^3}{n\lambda\lambda}②+\frac{Dm^3}{n\mu\mu}③$
3.	$\frac{Dkk}{n\varkappa}①-\frac{Dll}{n\lambda}②+\frac{Dm^2}{n\mu}③$
2.	$\frac{Dk}{n}①-\frac{Dl}{n}②+\frac{Dm}{n}③$
1.	$\frac{D\varkappa}{n}①-\frac{D\lambda}{n}②+\frac{D\mu}{n}③$
0	$\frac{D\varkappa\varkappa}{nk}◎-\frac{D\lambda\lambda}{nl}④+\frac{D\mu\mu}{nm}⑤$
−1.	$\frac{-D}{ne z^n}+\frac{D\varkappa^3}{nkk}◎-\frac{D\lambda^3}{nll}④+\frac{D\mu^3}{nm^2}⑤$
&c.	

Si l'équation $e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}=0$ a trois racines réelles $\frac{k}{\varkappa}$, $\frac{l}{\lambda}$, $\frac{m}{\mu}$, qui ſoient les valeurs de z^n, on ſuppoſera $p=k\lambda-\varkappa l$; $q=k\mu-\varkappa m$; $r=l\mu-\lambda m$;

$$①=\frac{1}{pq}(\varkappa z^n-k:k);\quad ②=\frac{1}{pr}(\lambda z^n-l:l);\quad ③=\frac{1}{qr}(\mu z^n-m:m);$$

$$◎=\frac{1}{pq}(\varkappa z^n-k:\varkappa z^n);\quad ④=\frac{1}{pr}(\lambda z^n-l:\lambda z^n);$$

$$⑤=\frac{1}{qr}(\mu z^n-m:\mu z^n).$$

θ	FORME XLII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$ 1. *Cas.*
&c.	
3.	$\frac{2Dz^{\frac{1}{2}n}}{nh}+\frac{2Dk^3}{n\varkappa\varkappa}\,①-\frac{2Dl^3}{n\lambda\lambda}\,②+\frac{2Dm^3}{n\mu\mu}\,③$
2.	$\frac{2Dkk}{n\varkappa}\,①-\frac{2Dll}{n\lambda}\,②+\frac{2Dmm}{n\mu}\,③$
1.	$\frac{2Dk}{n}\,①-\frac{2Dl}{n}\,②+\frac{2Dm}{n}\,③$ Voyez fig. 28.
0.	$\frac{2D\varkappa}{n}\,①-\frac{2D\lambda}{n}\,②+\frac{2D\mu}{n}\,③$
— 1.	$\frac{-2D}{ne\,z^{\frac{1}{2}n}}+\frac{2D\varkappa\varkappa}{nk}\,①-\frac{2D\lambda\lambda}{nl}\,②+\frac{2D\mu\mu}{nm}\,③$
&c.	

Si l'équation $e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}=0$ a trois racines réelles $\frac{k}{\varkappa}$, $\frac{l}{\lambda}$, $\frac{m}{\mu}$, qui ſoient les valeurs de z^n, on ſuppoſera $p=k\lambda-\varkappa l$; $q=k\mu-\varkappa m$; $r=l\mu-\lambda m$;

1. *Cas.*

$$\left\{\begin{array}{l} OP:OA::\sqrt[2]{z^n}:\sqrt[2]{\frac{k}{\varkappa}};\quad ①=\frac{-1}{2pq}\sqrt[2]{\frac{\varkappa}{k}}\times(CP:AP)\\ OP:OA::\sqrt[2]{z^n}:\sqrt[2]{\frac{l}{\lambda}};\quad ②=\frac{-1}{2pr}\sqrt[2]{\frac{\lambda}{l}}\times(CP:AP)\\ OP:OA::\sqrt[2]{z^n}:\sqrt[2]{\frac{m}{\mu}};\quad ③=\frac{-1}{2qr}\sqrt[2]{\frac{\mu}{m}}\times(CP:AP)\end{array}\right.$$

2. *Cas.*

$$\left\{\begin{array}{l} OP:OA::\sqrt[2]{z^n}:\sqrt[2]{\frac{-k}{\varkappa}};\quad ①=\frac{+1}{2pq}\sqrt[2]{\frac{-\varkappa}{k}}\times\downarrow(PBO)\\ OP:OA::\sqrt[2]{z^n}:\sqrt[2]{\frac{-l}{\lambda}};\quad ②=\frac{+1}{2pr}\sqrt[2]{\frac{-\lambda}{l}}\times\downarrow(PBO)\\ OP:OA::\sqrt[2]{z^n}:\sqrt[2]{\frac{-m}{\mu}};\quad ③=\frac{+1}{2qr}\sqrt[2]{\frac{-\mu}{m}}\times\downarrow(PBO)\end{array}\right.$$

FORME

θ	FORME XLII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$ 2. *Cas.*
&c.	
3.	$\frac{2Dz^{\frac{1}{2}n}}{nh}+\frac{2Dk^3}{nll}\textcircled{1}+\frac{-hkp}{2nh}DM+\frac{+khp}{2nh}D\times\textcircled{2}+\textcircled{3}$ $\overline{kq+lp,q-r}$ $\overline{-kq-lp,q+r}$
2.	$\frac{2Dkk}{nl}\textcircled{1}+\frac{kr-kq-lp}{2n}DM+\frac{kr+kq+lp}{2n}D\times\textcircled{2}+\textcircled{3}$
1.	$\frac{2Dk}{n}\textcircled{1}+\frac{lr+hk}{2n}DM+\frac{lr-hk}{2n}D\times\textcircled{2}+\textcircled{3}$ Voy. fig. 28.
0.	$\frac{2Dl}{n}\textcircled{1}+\frac{hlp-hkr-lqr}{2np}DM+\frac{-hlp-hkr-lqr}{2np}D\times\textcircled{2}+\textcircled{3}$ $\overline{hk+lq,qr-hp}$ $\overline{hk+lq,qr+hp}$
— 1.	$\frac{-2D}{ne\,z^{\frac{1}{2}n}}+\frac{2Dll}{nk}\textcircled{1}+\frac{-hlpr}{2npp}DM+\frac{-hlpr}{2npp}D\times\textcircled{2}+\textcircled{3}$
&c.	

Si l'équation $e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}=0$ n'a qu'une racine réelle $\frac{k}{l}$, les deux autres racines étant imaginaires, on ſuppoſera, $p=-e\frac{l}{k}$, $q=-e\frac{ll}{kk}-f\frac{l}{k}$; ou $p=f+g\frac{k}{l}+h\frac{kk}{ll}$, $q=g+h\frac{k}{l}$; $r=\sqrt{hp}$, $s=\sqrt{-hp+2\sqrt{h^3p}}$, $t=pll+qkl+hkk$;

$$M=\tfrac{l}{st}(r+sz^{\frac{1}{2}n}+hz^n:r-sz^{\frac{1}{2}n}+hz^n).$$

1. *Cas.*

OP : OA :: $\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{k}{l}}$; . . . $\textcircled{1}=\frac{-l}{2t}\sqrt[3]{\frac{l}{k}}\times$ (CP : AP).

OP : OA :: $\frac{+1}{2}s+hz^{\frac{1}{2}n}:\sqrt{\frac{1}{4}ss-hr}$; $\textcircled{2}=\frac{-l}{2t}\sqrt[3]{\frac{1}{\frac{1}{4}ss-hr}}\times$ (CP : AP).

OP : OA : $-\frac{1}{2}s+hz^{\frac{1}{2}n}:\sqrt{\frac{1}{4}ss-hr}$; $\textcircled{3}=\frac{-l}{2t}\sqrt[3]{\frac{1}{\frac{1}{4}ss-hr}}\times$ (CP : AP).

2. *Cas.*

OP : OA :: $\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{-k}{l}}$; . . . $\textcircled{1}=\frac{+l}{2t}\sqrt[3]{\frac{-l}{k}}\times\downarrow$ (PBO).

OP : OA :: $\frac{+1}{2}s+hz^{\frac{1}{2}n}:\sqrt{hr-\frac{1}{4}ss}$; $\textcircled{2}=\frac{+l}{2t}\sqrt[3]{\frac{1}{hr-\frac{1}{4}ss}}\times\downarrow$ (PBO).

OP : OA :: $-\frac{1}{2}s+hz^{\frac{1}{2}n}:\sqrt{hr-\frac{1}{4}ss}$; $\textcircled{3}=\frac{+l}{2t}\sqrt[3]{\frac{1}{hr-\frac{1}{4}ss}}\times\downarrow$ (PBO).

θ	FORME XLIII. $\frac{Dz^{\frac{1}{3}n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$ 1. *Cas.*
&c.	
3.	$\frac{3Dz^{\frac{1}{3}n}}{nb}+\frac{3Dk^3}{n\varkappa\varkappa}$ ① $-\frac{3Dl^3}{n\lambda\lambda}$ ② $+\frac{3Dm^3}{n\mu\mu}$ ③
2.	$\frac{3Dkk}{n\varkappa}$ ① $-\frac{3Dll}{n\lambda}$ ② $+\frac{3Dmm}{n\mu}$ ③
1.	$\frac{3Dk}{n}$ ① $-\frac{3Dl}{n}$ ② $+\frac{3Dm}{n}$ ③ Voyez fig. 29.
0.	$\frac{3D\varkappa}{n}$ ① $-\frac{3D\lambda}{n}$ ② $+\frac{3D\mu}{n}$ ③
−1.	$\frac{-3D}{ne z^{\frac{1}{3}n}}+\frac{3D\varkappa\varkappa}{nk}$ ① $-\frac{3D\lambda\lambda}{nl}$ ② $+\frac{3D\mu\mu}{nm}$ ③
&c.	

Si l'équation $e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}=0$ a trois racines réelles $\frac{k}{\varkappa}$, $\frac{l}{\lambda}$, $\frac{m}{\mu}$, qui ſoient les valeurs de z^n, on ſuppoſera $p=k\lambda-\varkappa l$; $q=k\mu-\varkappa m$; $r=l\mu-\lambda m$;

1. *Cas.*

$$\left\{\begin{array}{l} OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{k}{\varkappa}};\quad ①=\frac{-1}{3pq}\sqrt[3]{\frac{\varkappa\varkappa}{kk}}x-(AP:AO) \\ \quad+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO). \\ OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{l}{\lambda}};\quad ②=\frac{-1}{3pr}\sqrt[3]{\frac{\lambda\lambda}{ll}}x-(AP:AO) \\ \quad+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO). \\ OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{m}{\mu}};\quad ③=\frac{-1}{3qr}\sqrt[3]{\frac{\mu\mu}{mm}}x-(AP:AO) \\ \quad+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO). \end{array}\right.$$

2. *Cas.*

$$\left\{\begin{array}{l} OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{-k}{\varkappa}};\quad ①=\frac{1}{3pq}\sqrt[3]{\frac{\varkappa\varkappa}{kk}}x-\beta(BP:BO) \\ \quad+(DP:DO)+\downarrow(PBO). \\ OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{-l}{\lambda}};\quad ②=\frac{1}{3pr}\sqrt[3]{\frac{\lambda\lambda}{ll}}x-\beta(BP:BO) \\ \quad+(DP:DO)+\downarrow(PBO). \\ OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{-m}{\mu}};\quad ③=\frac{1}{3qr}\sqrt[3]{\frac{\mu\mu}{mm}}x-\beta(BP:BO) \\ \quad+(DP:DO)+\downarrow(PBO). \end{array}\right.$$

θ	FORME XLIV. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$ 1. *Cas.*
&c.	
3.	$\frac{3Dz^{\frac{2}{3}n}}{2nh}+\frac{3Dk^3}{nxx^*}\textcircled{1}-\frac{3Dl^3}{n\lambda\lambda}\textcircled{2}+\frac{3Dm^3}{n\mu\mu}\textcircled{3}$
2.	$\frac{3Dkk}{nx}\textcircled{1}-\frac{3Dll}{n\lambda}\textcircled{2}+\frac{3Dmm}{n\mu}\textcircled{3}$
1.	$\frac{3Dk}{n}\textcircled{1}-\frac{4Dl}{n}\textcircled{2}+\frac{3Dm}{n}\textcircled{3}$ Voyez. fig. 29.
0.	$\frac{3Dx}{n}\textcircled{1}-\frac{3D\lambda}{n}\textcircled{2}+\frac{3D\mu}{n}\textcircled{3}$
— 1.	$\frac{-3D}{2nez^{\frac{2}{3}n}}+\frac{3Dxx}{nk}\textcircled{1}-\frac{3D\lambda\lambda}{nl}\textcircled{2}+\frac{3D\mu\mu}{nm}\textcircled{3}$
&c.	

Si l'équation $e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}=0$ a trois racines réelles $\frac{k}{x}$, $\frac{l}{\lambda}$, $\frac{m}{\mu}$, qui ſoient les valeurs de z^n, on ſuppoſera $p=k\lambda-xl$, $q=k\mu-xm$, $r=l\mu-\lambda m$;

1. *Cas.*

$OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{k}{x}}$; $\textcircled{1}=\frac{-1}{3pq}\sqrt[3]{\frac{x}{k}}\times-(AP:AO)+\beta(CP:CO)-\downarrow(PCO)$.

$OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{l}{\lambda}}$; $\textcircled{2}=\frac{-1}{3pr}\sqrt[3]{\frac{\lambda}{l}}\times-(AP:AO)+\beta(CP:CO)-\downarrow(PCO)$.

$OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{m}{\mu}}$; $\textcircled{3}=\frac{-1}{3qr}\sqrt[3]{\frac{\mu}{m}}\times-(AP:AO)+\beta(GP:CO)-\chi(PCO)$.

2. *Cas.*

$OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{-k}{x}}$; $\textcircled{1}=\frac{1}{3pq}\sqrt[3]{\frac{-x}{k}}\times\beta(BP:BO)-(DP:DO)+\downarrow(PBO)$.

$OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{-l}{\lambda}}$; $\textcircled{2}=\frac{1}{3pr}\sqrt[3]{\frac{-\lambda}{l}}\times\beta(BP:BO)-(DP:DO)+\downarrow(PBO)$.

$OP:OA::\sqrt[3]{z^n}:\sqrt[3]{\frac{-m}{\mu}}$; $\textcircled{3}=\frac{1}{3qr}\sqrt[3]{\frac{-\mu}{m}}\times\beta(BP:BO)-(DP:DO)+\downarrow(PBO)$.

θ	FORME XLV. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$ 1. *Cas.*
&c.	
2.	$\frac{4Dkk}{n\varkappa}$ ① $-\frac{4Dll}{n\lambda}$ ② $+\frac{4Dmm}{n\mu}$ ③ . .
1.	$\frac{4Dk}{n}$ ① $-\frac{4Dl}{n}$ ② $+\frac{4Dm}{n}$ ③ Voyez fig. 30.
0.	$\frac{4D\varkappa}{n}$ ① $-\frac{4D\lambda}{n}$ ② $+\frac{4D\mu}{n}$ ③
&c.	

Si l'équation $e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}=0$ a trois racines réelles $\frac{k}{\varkappa}$, $\frac{l}{\lambda}$, $\frac{m}{\mu}$, qui soient les valeurs de z^n, on supposera $p=k\lambda-\varkappa l$; $q=k\mu-\varkappa m$; $r=l\mu-\lambda m$;

1. *Cas.*

$$\begin{cases} OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{k}{\varkappa}}; \quad ①=\frac{-1}{4pq}\sqrt[4]{\frac{z^3}{k^3}}\varkappa-(AP:AO) \\ \quad +(EP:EO)+\chi(PCO). \\ OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{l}{\lambda}}; \quad ②=\frac{-1}{4pr}\sqrt[4]{\frac{\lambda^3}{l^3}}\varkappa-(AP:AO) \\ \quad +(EP:EO)+\chi(PCO). \\ OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{m}{\mu}}; \quad ③=\frac{-1}{4qr}\sqrt[4]{\frac{\mu^3}{m^3}}\varkappa-(AP:AO) \\ \quad +(EP:EO)+\chi(PCO). \end{cases}$$

2. *Cas.*

$$\begin{cases} OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{-k}{\varkappa}}; \quad ①=\frac{1}{4p}\sqrt[4]{\frac{-z^3}{k^3}}\varkappa-\beta(BP:BO) \\ \quad +\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO). \\ OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{-l}{\lambda}}; \quad ②=\frac{1}{4qr}\sqrt[4]{\frac{-\lambda^3}{l^3}}\varkappa-\beta(BP:BO) \\ \quad +\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO). \\ OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{-m}{\mu}}; \quad ③=\frac{1}{4qr}\sqrt[4]{\frac{-\mu^3}{m^3}}\varkappa-\beta(BP:BO) \\ \quad +\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO). \end{cases}$$

0	FORME XLVI. $\frac{Dz^{\frac{1}{4}n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$ 1. Cas.	
&c.		
2.	$\frac{4Dkk}{nx}$ ① $-\frac{4Dll}{n\lambda}$ ② $+\frac{4Dmm}{n\mu}$ ③	
1.	$\frac{4Dk}{n}$ ① $-\frac{4Dl}{n}$ ② $+\frac{4Dm}{n}$ ③	Voyez. fig. 30.
0.	$\frac{4Dx}{n}$ ① $-\frac{4D\lambda}{n}$ ② $+\frac{4D\mu}{n}$ ③	
&c.		

Si l'équation $e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}=0$ a trois racines réelles $\frac{k}{x}, \frac{l}{\lambda}, \frac{m}{\mu}$, qui soient les valeurs de z^n, on suppose $p=k\lambda-xl$, $q=k\mu-xm$, $r=l\mu-\lambda m$;

1. Cas.
- $OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{k}{x}}$; ① $=\frac{-1}{4pq}\sqrt[4]{\frac{l}{k}}\times-(AP:AO)+(EP:EO)-\chi(PCO)$.
- $OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{l}{\lambda}}$; ② $=\frac{-1}{4pr}\sqrt[4]{\frac{\lambda}{l}}\times-(AP:AO)+(EP:EO)-\chi(PCO)$.
- $OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{m}{\mu}}$; ③ $=\frac{-1}{4qr}\sqrt[4]{\frac{\mu}{m}}\times-(AP:AO)+(EP:EO)-\chi(PCO)$.

2. Cas.
- $OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{-k}{x}}$; ① $=\frac{+1}{4pq}\sqrt[4]{\frac{-x}{k}}\times\beta(BP:BO)-\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO)$.
- $OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{-l}{\lambda}}$; ② $=\frac{+1}{4pr}\sqrt[4]{\frac{-\lambda}{l}}\times\beta(BP:BO)-\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO)$.
- $OP:OA::\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{-m}{\mu}}$; ③ $=\frac{+1}{4qr}\sqrt[4]{\frac{-\mu}{m}}\times\beta(BP:BO)-\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO)$.

θ **FORME XLV.** $\frac{\cdot Dz^{n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^{n}+gz^{1\frac{1}{2}n}+hz^{1\frac{3}{4}n}}$ 2. *Cas.*

&c.

2. $\frac{4Dkk}{nl}$ ① $+\frac{\overset{+k,\overline{as+hr}}{-h,\overline{kq+lp}}}{2ns}$ D × ② + ③ + M ; $+\frac{\overset{+k,\overline{as-hr}}{+h,\overline{kq+lp}}}{2ns}$ D × ④ + ⑤ + N.

1. $-\frac{4Dk}{n}$ ① $+\frac{\overset{+l,\overline{as+hr}}{+hhk}}{2ns}$ D × ② + ③ + M ; $+\frac{\overset{+l,\overline{as-hr}}{-hhk}}{2ns}$ D × ④ + ⑤ + N.

Voyez fig. 30.

0. $\frac{4Dl}{n}$ ① $+\frac{+hhlp}{2nps}$ D × ② + ③ + M ; $+\frac{-hhlp}{2nps}$ D × ④ + ⑤ + N.

&c.

Les valeurs des quantités $k, l, p, q, r, s, t, a, b, c$, M, N, se trouvent dans la pag. suiv.

1. *Cas.*

OP : OA :: $\sqrt[4]{z^{n}} : \sqrt[4]{\frac{k}{l}}$; ① $= \frac{-l}{4t}\sqrt[4]{\frac{l^{3}}{k^{3}}} \times -$ (AP : AO) + (EP : EO) + χ (PCO).

OP : OA :: $\pm\frac{1}{2}c + hz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{\frac{1}{4}cc - ah}$; ② $= \frac{-l}{2t}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}cc-ah}} \times$ (EP : AP).

OP : OA :: $-\frac{1}{2}c + hz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{\frac{1}{4}cc - ah}$; ③ $= \frac{-l}{2t}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}cc-ah}} \times$ (EP : AP).

OP : OA :: $\pm\frac{1}{2}b + hz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{\frac{1}{4}bb - ah}$; ④ $= \frac{-l}{2t}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}bb-ah}} \times$ (EP : AP).

OP : OA :: $-\frac{1}{2}b + hz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{\frac{1}{4}bb - ah}$; ⑤ $= \frac{-l}{2t}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}bb-ah}} \times$ (EP : AP).

2. *Cas.*

OP : OA :: $\sqrt[4]{z^{n}} : \sqrt[4]{\frac{-k}{l}}$; ① $= \frac{+l}{4t}\sqrt[4]{\frac{-l^{3}}{k^{3}}} \times -$ β(BP : BO) + β(DP : DO) + ↓ (PBO) + ↓ (PDO)

OP : OA :: $+\frac{1}{2}c + hz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{ah - \frac{1}{4}cc}$; ② $= \frac{+l}{2t}\sqrt{\frac{1}{ah-\frac{1}{4}cc}} \times$ χ (PCO).

OP : OA :: $-\frac{1}{2}c + hz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{ah - \frac{1}{4}cc}$; ③ $= \frac{+l}{2t}\sqrt{\frac{1}{ah-\frac{1}{4}cc}} \times$ χ (PCO).

OP : OA :: $+\frac{1}{2}b + hz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{ah - \frac{1}{4}bb}$; ④ $= \frac{+l}{2t}\sqrt{\frac{1}{ah-\frac{1}{4}bb}} \times$ χ (PCO).

OP : OA :: $-\frac{1}{2}b + hz^{\frac{1}{4}n} : \sqrt{ah - \frac{1}{4}bb}$; ⑤ $= \frac{+l}{2t}\sqrt{\frac{1}{ah-\frac{1}{4}bb}} \times$ χ (PCO).

θ	FORME XLVI. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$ 2. *Cas.*
&c.	
2.	$\frac{4Dkk}{nl}$ ① $+\frac{\overline{lp+kq},\overline{s+a}\cdot -akr}{2ns}$ D × ② + ③ − M ; $+\frac{\overline{lp+kq},\overline{s-a}\cdot +akr}{2ns}$ D × ④ + ⑤ − N.
1.	$\frac{4Dk}{n}$ ① $+\frac{-hk,\overline{s+a}\cdot -alr}{2ns}$ D × ② + ③ − M ; $+\frac{-hk,\overline{s-a}\cdot +alr}{2ns}$ D × ④ + ⑤ − N. Voyez fig. 30.
0.	$\frac{4Dl}{n}$ ① $+\frac{-hlp,\overline{s+a}\cdot +ar,\overline{hk+lq}}{2nps}$ D × ② + ③ − M ; $+\frac{-hlp,\overline{s-a}\cdot -ar,\overline{hk+lq}}{2nps}$ D × ④ + ⑤ − N.
&c.	

Si l'équation $e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}=0$ n'a qu'une racine réelle $\frac{k}{l}$ qui ſoit la valeur de z^n, les deux autres racines étant imaginaires, on ſuppoſera, $p=-e\frac{l}{k}$, $q=-.e\frac{ll}{kk}-f\frac{l}{k}$; ou $p=f+g\frac{k}{l}+h\frac{kk}{ll}$, $q=g+h\frac{k}{l}$;

$r=\sqrt{hp}$, $s=\sqrt{-hq+2\sqrt{h^3p}}$, $t=pll+qkl+hkk$; $a=\sqrt[4]{h^3p}$,

$b=\sqrt{+\sqrt{-h^3q+2\sqrt{h^7p}}+2\sqrt[4]{h^7p}}$; $c=\sqrt{-\sqrt{-h^3q+2\sqrt{h^7p}}+2\sqrt[4]{h^7p}}$.

$M=\frac{l}{ct}(a+cz^{\frac{1}{4}n}+hz^{\frac{1}{2}n}:a-cz^{\frac{1}{4}n}+hz^{\frac{1}{2}n})$.

$N=\frac{l}{bt}(a+bz^{\frac{1}{4}n}+hz^{\frac{1}{2}n}:a-bz^{\frac{1}{4}n}+hz^{\frac{1}{2}n})$.

1. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{k}{l}}$; ① $=\frac{-l}{4t}\sqrt[4]{\frac{l}{k}}\times$ − (AP : AO) + (EP : EO) − χ (PCO).

2. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[4]{z^n}:\sqrt[4]{\frac{-k}{l}}$; ①* $=\frac{+l}{4t}\sqrt[4]{\frac{-l}{k}}\times$ β (BP : BO) − β (DP : DO) + ↓ (PBO) + ↓ (PDO).

Les valeurs des quantités, ②, ③, ④, ⑤, ſe trouvent dans la page précédente.

θ	FORME XLVII. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\sqrt[n]{e+fz^n}}$	
&c.		
4.	$\frac{-96e^3+48eefz^n-36effz^{2n}+30f^3z^{3n}}{105nf^4}DP.$	
3.	$\frac{+16ee-8efz^n+6ffz^{2n}}{15nf^3}DP.$	
2.	$\frac{-4e+2fz^n}{3nff}DP.$	
1.	$\frac{+2}{nf}DP.$	
0.	$\frac{+2}{n}D\textcircled{1}$	Voyez fig. 28.
— 1.	$\frac{-1}{nez^n}DP-\frac{f}{ne}D\textcircled{1}.$	
— 2.	$\frac{-2e+3fz^n}{4neez^{2n}}DP+\frac{3ff}{4nee}D\textcircled{1}$	
— 3.	$\frac{-8ee+10efz^n-15ffz^{2n}}{24ne^3z^{3n}}DP-\frac{5f^3}{8ne^3}D\textcircled{1};$	
&c.		

$$P=\sqrt[n]{e+fz^n}.$$

1. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[n]{e}$;

$$\textcircled{1}=\frac{-1}{n}\sqrt[n]{\frac{1}{e}}\times-(AP:AO)+(CP:CO).$$

2. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[n]{-e}$;

$$\textcircled{1}=\frac{+1}{n}\sqrt[n]{\frac{-1}{e}}\times\downarrow(PBQ).$$

FORME

θ	FORME XLVIII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{\sqrt[2]{e+fz^n}}$
&c.	
3.	$\frac{+15eez^n-10efz^{2n}+8ffz^{3n}}{24nf^3}DP+\frac{5e^3}{8nf^3}D①.$
2.	$\frac{-3ez^n+2fz^{2n}}{4nff}DP-\frac{3ee}{4nff}D①.$
1.	$\frac{+z^n}{nf}DP+\frac{e}{nf}D①.$
0.	$\frac{-2}{n}D①.$ Voyez fig. 28.
— 1.	$\frac{-2}{ne}DP.$
— 2.	$\frac{-2e+4fz^n}{3nee z^n}DP.$
— 3.	$\frac{-6ee+8efz^n-16ffz^{2n}}{15ne^3z^{2n}}DP.$
— 4.	$\frac{-30e^3+36eefz^n-48effz^{2n}+96f^3z^{3n}}{105ne^4z^{3n}}DP.$
&c.	

$$P=\sqrt[2]{\frac{e+fz^n}{z^n}}.$$

1. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[2]{f}$;

$$①=-\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{f}}\times-(AP:AO)+(CP:CO).$$

2. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[2]{-f}$;

$$①=+\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-1}{f}}\times\downarrow(PBO).$$

θ	FORME XLIX. $Dz^{\frac{1}{n}-1}dz\sqrt[2]{e+fz^n}$
&c.	
3.	$\frac{+16e^3-8eefz^n+6effz^{2n}+30f^3z^{3n}}{105nf^3}DP.$
2.	$\frac{-4ee+2efz^n+6ffz^{2n}}{15nff}DP.$
1.	$\frac{+2e+2fz^n}{3nf}DP.$
0.	$\frac{+2}{n}DP+\frac{2e}{n}D\textcircled{1}.$
— 1.	$\frac{-1}{nz^n}DP+\frac{f}{n}D\textcircled{1}.$
— 2.	$\frac{-2e-fz^n}{4nez^{2n}}DP-\frac{ff}{4ne}D\textcircled{1}.$
— 3.	$\frac{-8ee-2efz^n+3ffz^{2n}}{24neez^{3n}}DP+\frac{f^3}{8nee}D\textcircled{1}.$
&c.	

Voyez fig. 28.

$$P=\sqrt[2]{e+fz^n}.$$

1. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[2]{e}$;

$$\textcircled{1}=\tfrac{-1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{e}}\times-(AP:AO)+(CP:CO)\lambda$$

2. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[2]{-e}$;

$$\textcircled{1}=\tfrac{+1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{-1}{e}}\times\downarrow(PBO).$$

θ	FORME L. $Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz\sqrt[2]{e+fz^n}$
&c.	
2.	$\frac{-3eez^n+2efz^{2n}+8ffz^{3n}}{24nff}DP-\frac{e^3}{8nff}D\textcircled{1}.$
1.	$\frac{+ez^n+2fz^{2n}}{4nf}DP+\frac{ee}{4nf}D\textcircled{1}.$
0.	$\frac{+z^n}{n}DP-\frac{e}{n}D\textcircled{1}.$
— 1.	$\frac{-2}{n}DP-\frac{2f}{n}D\textcircled{1}.$ Voyez fig. 28.
— 2.	$\frac{-2e-2fz^n}{3nez^n}DP.$
— 3.	$\frac{-6ee-2efz^n+4ffz^{2n}}{15nez^{2n}}DP.$
— 4.	$\frac{-30e^3-6eefz^n+8effz^{2n}-16f^3z^{3n}}{105ne^3z^{3n}}DP.$
&c.	

$$P=\sqrt[2]{\frac{e+fz^n}{z^n}}.$$

1. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[2]{f}$;

$$\textcircled{1}=-\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{f}}\times -(AP:AO)+(CP:CO).$$

2. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[2]{-f}$;

$$\textcircled{1}=+\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-1}{f}}\times\text{Ang}(PBO).$$

θ	FORME LI. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\sqrt[3]{e+fz^n}}$
&c.	
4.	$\frac{-243e^3+162eefz^n-135effz^{2n}+120f^3z^{3n}}{440nf^4}$ DPP.
3.	$\frac{+27ee-18efz^n+15ffz^{2n}}{40nf^3}$ DPP.
2.	$\frac{-9e+6fz^n}{10nff}$ DPP.
1.	$\frac{+3}{2nf}$ DPP.
0.	$\frac{+3}{n}$ D ①. Voyez fig. 29.
— 1.	$\frac{-1}{nez^n}$ D PP $-\frac{f}{ne}$ D ①.
— 2.	$\frac{-3e+4fz^n}{6neez^{2n}}$ D PP $+\frac{2ff}{3nee}$ D ①.
— 3.	$\frac{-18ee+21efz^n-28ffz^{2n}}{54ne^3z^{3n}}$ DPP $-\frac{14f^3}{27ne^3}$ D ①.
&c.	

$$P = \sqrt[3]{e+fz^n}.$$

1. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[3]{e}$;

$$① = -\tfrac{1}{3}\sqrt[3]{\tfrac{1}{e}}\times -(AP:AO)+\beta(CP:CO)-\downarrow(PCO)$$

2. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[3]{-e}$;

$$① = +\tfrac{1}{3}\sqrt[3]{\tfrac{-1}{e}}\times +\beta(BP:BO)-(DP:DO)+\downarrow(PBO).$$

θ	FORME LII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{\sqrt[3]{e+fz^n}}$
&c.	
3.	$\frac{+28eez^n-21efz^{2n}+18ffz^{3n}}{54nf^3}DPP+\frac{14e^3}{27nf^3}D\textcircled{I}.$
2.	$\frac{-4ez^n+3fz^{2n}}{6nff}DPP-\frac{2ee}{3nff}D\textcircled{I}.$
1.	$\frac{+z^n}{nf}DPP+\frac{e}{nf}D\textcircled{I}.$
0.	$\frac{-3}{n}D\textcircled{I}.$ Voyez fig. 29.
— 1.	$\frac{-3}{2ne}DPP.$
— 2.	$\frac{-6e+9fz^n}{10neez^n}DPP.$
— 3.	$\frac{-15ee+18efz^n-27ffz^{2n}}{40ne^3z^{2n}}DPP.$
— 4.	$\frac{-120e^3+135eefz^n-162effz^{2n}+243f^3z^{3n}}{440ne^4z^{3n}}DPP.$
&c.	

$$P=\sqrt[3]{\frac{e+fz^n}{z^n}}$$

1. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[3]{f}$;

$$\textcircled{I}=-\tfrac{1}{3}\sqrt[3]{\tfrac{1}{f}}\alpha-(AP:AO)+\beta(CP:CO)-\downarrow(PCO).$$

2. *Cas.* ΘP : OA :: P : $\sqrt[3]{-f}$;

$$\textcircled{Y}=+\tfrac{1}{3}\sqrt[3]{\tfrac{-1}{f}}\alpha+\beta(BP:BO)-(DP:DO)+\downarrow(PBO).$$

θ	FORME LIII. $Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[3]{e+fz^n}$.
&c.	
3.	$\frac{+27e^3-9eefz^n+6effz^{2n}+42f^3z^{3n}}{140nf^3}DP.$
2.	$\frac{-9ee+3efz^n+12ffz^{2n}}{28nff}DP.$
1.	$\frac{+3e+3fz^n}{4nf}DP.$
0.	$\frac{+3}{n}DP+\frac{3e}{n}D①.$ Voyez fig. 29.
— 1.	$\frac{-1}{nz^n}DP+\frac{f}{n}D①.$
— 2.	$\frac{-3e-fz^n}{6nez^{2n}}DP-\frac{ff}{3ne}D①.$
— 3.	$\frac{-18ee-3efz^n+5ffz^{2n}}{54neez^{3n}}DP+\frac{5f^3}{27nee}D①.$
&c.	

$$P=\sqrt[3]{e+fz^n}.$$

1. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[3]{e}$.

$$①=-\tfrac{1}{3}\sqrt[3]{\tfrac{1}{ee}}x-\{AP:AO)+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO).$$

2. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[3]{-e}$;

$$①=+\tfrac{1}{3}\sqrt[3]{\tfrac{1}{ee}}x-\beta(BP:BO)+(DP:DO)+\downarrow(PBO).$$

θ	FORME LIV. $Dz^{\frac{1}{3}n+\frac{2}{3}n-1}dz\sqrt[3]{e+fz^n}$
&c.	
2.	$\frac{-5eez^n+3efz^{2n}+18ffz^{3n}}{54nff}DP-\frac{5e^3}{27nff}D\textcircled{1}.$
1.	$\frac{+ez^n+3fz^{2n}}{6nf}DP+\frac{ee}{3nf}D\textcircled{1}.$
0.	$\frac{+z^n}{n}DP-\frac{e}{n}D\textcircled{1}.$
— 1.	$\frac{-3}{n}DP-\frac{3f}{n}D\textcircled{1}.$ Voyez fig. 29.
— 2.	$\frac{-3e-3fz^n}{4nez^n}DP.$
— 3.	$\frac{-12ee-3efz^n+9ffz^{2n}}{28neez^{2n}}DP.$
— 4.	$\frac{-42e^3-6eefz^n+9effz^{2n}-27f^3z^{3n}}{140ne^3z^{3n}}DP.$
&c.	

$$P=\sqrt[3]{\frac{e+fz^n}{z^n}}.$$

1. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[3]{f}$;

$$\textcircled{1}=-\tfrac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{ff}}\times-(AP:AO)+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO).$$

2. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[3]{-f}$;

$$\textcircled{1}=+\tfrac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{ff}}\times-\beta(BP:BO)+(DP:DO)+\downarrow(PBO).$$

θ	FORME LV. $\frac{Dz^{\frac{1}{n}-1}dz}{\sqrt[4]{e+fz^n}}$
&c.	
4.	$\frac{-512e^3+384eefz^n-336effz^{2n}+308f^3z^{3n}}{1155nf^4}DP^3.$
3.	$\frac{+128ee-96efz^n+84ffz^{2n}}{231nfz^n}DP^3.$
2.	$\frac{-16e+12fz^n}{21nff}DP^3.$
1.	$\frac{+4}{3nf}DP^3.$ Voyez fig. 30.
0.	$\frac{+4}{n}D①.$
— 1.	$\frac{-1}{nez^n}DP^3-\frac{f}{ne}D①.$
— 2.	$\frac{-4e+5fz^n}{8neez^{2n}}DP^3+\frac{5ff}{8nee}D①.$
— 3.	$\frac{-32ee+36efz^n-45ffz^{2n}}{96ne^3z^{3n}}DP^3-\frac{15f^3}{32ne^3}D①.$
&c.	

$$P=\sqrt[4]{e+fz^n}.$$

1. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[4]{e}$.

$$①=-\tfrac{1}{4}\sqrt[4]{\tfrac{z}{e}}x-(AP:AO)+(EP:EO)-\chi(PCO).$$

2. *Cas.* OP : OA :: $\sqrt[4]{-e}$;

$$①=-\tfrac{1}{4}\sqrt[4]{\tfrac{-1}{e}}x+\beta(BP:BO)-\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO).$$

FORME

θ	FORME LVI. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{\sqrt[4]{e+fz^n}}$
&c.	
3.	$\frac{+45eez^n-36efz^{2n}+32ffz^{3n}}{96nf^3}DP^3+\frac{15e^3}{32nf^3}D\textcircled{I}.$
2.	$\frac{-5ez^n+4fz^{2n}}{8nff}DP^3-\frac{5ee}{8nff}D\textcircled{I}.$
1.	$\frac{+z^n}{nf}DP^3+\frac{e}{nf}D\textcircled{I}.$
0.	$\frac{-4}{n}D\textcircled{I}.$ Voyez fig. 30.
— 1.	$\frac{-4}{3ne}DP^1.$
— 2.	$\frac{-12e+16fz^n}{21neez^n}DP^1.$
— 3.	$\frac{-84ee+96efz^n-128ffz^{2n}}{231ne^2z^{2n}}DP^3.$
— 4.	$\frac{-308e^3+336eefz^n-384effz^{2n}+512f^3z^{3n}}{1155ne^4z^{3n}}DP^3.$
&c.	

$$P=\sqrt[4]{\frac{e+fz^n}{z^n}}.$$

1. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[4]{f}$

$$\textcircled{I}=-\tfrac{1}{4}\sqrt[4]{\tfrac{1}{f}}\times-(AP:AO)+(EP:EO)-\chi(PCQ).$$

2. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[4]{-f}$

$$\textcircled{I}=+\tfrac{1}{4}\sqrt[4]{\tfrac{-1}{f}}\times+\beta(BP:BO)-\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO).$$

θ	FORMULE LVII. $Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[4]{e+fz^n}$
&c.	
3.	$\frac{+128e^3-32eefz^n+20effz^{2n}+180f^3z^{3n}}{585nf^3}DP.$
2.	$\frac{-16ee+4efz^n+20ffz^{2n}}{45nff}DP.$
1.	$\frac{+4e+4fz^n}{5nf}DP.$
0.	$\frac{+4}{zn}DP+\frac{4e}{n}D\textcircled{1}.$ Voyez fig. 30.
— 1.	$\frac{-1}{nz^n}DP+\frac{f}{n}D\textcircled{1}.$
— 2.	$\frac{-4e-fz^n}{8nez^{2n}}DP-\frac{3ff}{8ne}D\textcircled{1}.$
— 3.	$\frac{-32ee-4efz^n+7ffz^{2n}}{96neez^{3n}}DP+\frac{7f^3}{32nee}D\textcircled{1}.$
&c.	

$$P=\sqrt[4]{e+fz^n}.$$

1. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[4]{e}$.

$$\textcircled{1}=-\tfrac{1}{4}\sqrt[4]{\tfrac{1}{e^3}}x-(AP:AO)+(EP:EO)+\chi(PCO).$$

2. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[4]{-e}$.

$$\textcircled{1}=+\tfrac{1}{4}\sqrt[4]{\tfrac{-1}{e^3}}x-\beta(BP:BO)+\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO).$$

θ	FORME LVIII. $Dz^{\frac{1}{4}n+\frac{1}{4}n-1}dz\sqrt[4]{e+fz^n}$
&c.	
2.	$\frac{-7eez^n+4efz^{2n}+32ffz^{3n}}{96nff}DP-\frac{7e^3}{32nf}D\textcircled{I}.$
1.	$\frac{+ez^n+4fz^{2n}}{8nf}DP+\frac{3ee}{8nf}D\textcircled{I}.$
0.	$\frac{+z^n}{n}DP-\frac{e}{n}D\textcircled{I}.$
— 1.	$\frac{-4}{n}DP-\frac{4f}{n}D\textcircled{I}.$ Voyez fig. 30.
— 2.	$\frac{-4e-4fz^n}{5nez^n}DP.$
— 3.	$\frac{-20ee-4efz^n+16ffz^{2n}}{45nez^{2n}}DP.$
— 4.	$\frac{-180e^3-20efz^n+32eeffz^{2n}-128f^3z^{3n}}{585ne^3z^{3n}}DP.$
&c.	

$$P=\sqrt[4]{\frac{e+fz^n}{z^n}}.$$

1. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[4]{f}$;

$$\textcircled{I}=-\tfrac{1}{4}\sqrt[4]{\tfrac{1}{f^3}}x-(AP:AO)+(EP:EO)+\chi(PCO).$$

2. *Cas.* OP : OA :: P : $\sqrt[4]{-f}$;

$$\textcircled{I}=+\tfrac{1}{4}\sqrt[4]{\tfrac{-1}{f^3}}x-\beta(BP:BO)+\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO).$$

θ	FORME LIX. $\frac{Dz^{n\theta-1}dz}{g+hz^n\sqrt[\theta]{e+fz^n}}$
&c.	
	$-6fg$
3.	$\frac{-4eh+2fhz^n}{3nffhh}DP+\frac{2gg}{nh^3}D①.$
2.	$\frac{+2}{nfh}DP-\frac{2g}{nhh}D①.$
1.	$\frac{+2}{nh}D①.$ Voyez fig. 28.
0.	$\frac{-2}{ng}D①-\frac{2}{ng}D②.$
—	$+fg$
1.	$\frac{-1}{negz^n}DP+\frac{2h}{ngg}D①+\frac{2eh}{negg}D②.$
&c.	

$$P=\sqrt[\theta]{e+fz^n},\quad p=fg-eh.$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[\theta]{\frac{p}{h}}; & ①=+\frac{1}{2}\sqrt[\theta]{\frac{h}{p}}\times\measuredangle(PBO). \\ OP:OA::P:\sqrt[\theta]{e}; & ②=+\frac{1}{2}\sqrt[\theta]{\frac{1}{e}}\times-(AP:AO)+ \\ & (CP:CO). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[\theta]{\frac{-p}{h}}; & ①=-\frac{1}{2}\sqrt[\theta]{\frac{-h}{p}}\times-(AP:AO)+ \\ & (CP:CO). \\ OP:OA::P:\sqrt[\theta]{-e}; & ②=-\frac{1}{2}\sqrt[\theta]{\frac{-1}{e}}\times\measuredangle(PBO). \end{cases}$$

θ	FORME LX. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{g+hz^n\sqrt[2]{e+fz^n}}$
&c.	
2.	$\frac{+z^n}{nfb}DP-\frac{2g}{nbb}D\textcircled{1}+\frac{-2fg}{nfbb}\overset{-eb}{}D\textcircled{2}.$
1.	$\frac{+2}{nb}D\textcircled{1}+\frac{2}{nb}D\textcircled{2}.$
0.	$\frac{-2}{ng}D\textcircled{1}.$ Voyez. fig. 28.
1.	$\frac{-2}{neg}DP+\frac{2b}{ngg}D\textcircled{1}.$
2.	$\frac{-2eg+4fgz^n}{3neeggz^n}\overset{+6ebz^n}{}DP-\frac{2bb}{ngg}D\textcircled{1}.$
&c.	

$$P=\sqrt[2]{\frac{e+fz^n}{z^n}}\qquad p=eb-fg.$$

1. Cas.
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{p}{g}}; & \textcircled{1}=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{g}{p}}\times\downarrow(PBO). \\ OP:OA::P:\sqrt[2]{f}; & \textcircled{2}=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{f}}\times-(AP:AO)+(CP:CO). \end{cases}$$

2. Cas.
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{p}{g}}; & \textcircled{1}=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{g}{p}}\times-(AP:AO)+(CP:CO). \\ OP:OA::P:\sqrt[2]{-f}; & \textcircled{2}=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{f}}\times\downarrow(PBO). \end{cases}$$

θ	FORME LXI. $\frac{D z^{n-1} dz \sqrt[2]{e+fz^n}}{g+hz^n}$
&c.	
2.	$\frac{-6fg+2eh+2fhz^n}{3nfhh} DP + \frac{2gp}{nh^3} D①.$
1.	$\frac{+2}{nb} DP - \frac{2p}{nhh} D①.$
	Voyez fig. 28.
0.	$\frac{+2p}{ngb} D① - \frac{2e}{ng} D②.$
— 1.	$\frac{-1}{ngz^n} DP - \frac{2p}{ngg} D① + \frac{-fg+2eh}{ngg} D②.$
&c.	

$$P = \sqrt[2]{e+fz^n}, \quad p = fg - eh.$$

1. Cas. $\begin{cases} OP : OA :: P : \sqrt[2]{\frac{p}{b}}; & ① = +\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{b}{p}} \times \downarrow (PBO). \\ OP : OA :: P : \sqrt[2]{e}; & ② = +\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{e}} \times -(AP : AO) + (CP : CO). \end{cases}$

2. Cas. $\begin{cases} OP : OA :: P : \sqrt[2]{\frac{-p}{b}}; & ① = -\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-b}{p}} \times -(AP : AO) + (CP : CO). \\ OP : OA :: P : \sqrt[2]{-e}; & ② = -\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-1}{e}} \times \downarrow (PBO). \end{cases}$

θ	FORME LXII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz\sqrt[z]{e+fz^n}}{g+bz^n}$
&c.	
1.	$\frac{+z^n}{nb}DP+\frac{2p}{nbb}D①-\frac{+2fg}{nbb}D②.$ (−eb)
0.	$\frac{-2p}{ngb}D①+\frac{2f}{nb}D②.$
	Voyez. fig. 28.
1.	$\frac{-2}{ng}DP+\frac{2p}{ngg}D①.$
2.	$\frac{-2eg-2fgz^n}{3neggz^n}DP-\frac{2bp}{ng^3}D①.$ (+6ebz^n)
&c.	

$$P=\sqrt[z]{\frac{e+fz^n}{z^n}}.\quad p=eb-fg.$$

1. *Cas.* $\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[z]{\frac{p}{g}}; & ①=+\frac{1}{2}\sqrt[z]{\frac{g}{p}}\times\downarrow(PBO). \\ OP:OA::P:\sqrt[z]{f}; & ②=+\frac{1}{2}\sqrt[z]{\frac{1}{f}}\times-(AP:AO)+(CP:CO). \end{cases}$

2. *Cas.* $\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[z]{\frac{-p}{g}}; & ①=-\frac{1}{2}\sqrt[z]{\frac{-g}{p}}\times-(AP:AO)+(CP:CO). \\ OP:OA::P:\sqrt[z]{-f}; & ②=-\frac{1}{2}\sqrt[z]{\frac{-1}{f}}\times\downarrow(PBO). \end{cases}$

θ	FORME LXIII. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{g+hz^n\sqrt[3]{e+fz^n}}$
&c.	
3.	$\frac{-15fg}{10nffbb}DPP+\frac{3gg}{nb^3}D①.$
2.	$\frac{+3}{2nfb}DPP-\frac{3z}{nnbb}D①.$
1.	$\frac{+3}{nb}D①.$ Voyez fig. 29.
0.	$\frac{-3}{ng}D①-\frac{3}{ng}D②.$
1.	$\frac{-1}{negz^n}DPP+\frac{3b}{ngg}D①+\frac{+fg}{\frac{3eb}{negg}}D②.$
&c.	

$$P=\sqrt[3]{e+fz^n}.\quad p=fg-eb.$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{p}{b}};\quad ①=\frac{+1}{3}\sqrt[3]{\frac{h}{p}}x+\beta(BP:BO)\\ \quad -(DP:DO)+\downarrow(PBO).\\ OP:OA::P:\sqrt[3]{e};\quad ②=\frac{+1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{e}}x'-(AP:AO)\\ \quad +\beta(CP:CO)-\downarrow(PCO). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{-p}{b}};\quad ③=\frac{-1}{3}\sqrt[3]{\frac{-h}{p}}x-(AP:AO)\\ \quad +\beta(CP:CO)-\downarrow(PCO).\\ OP:OA::P:\sqrt[3]{-e};\quad ②=\frac{-1}{3}\sqrt[3]{\frac{-1}{e}}x+\beta(BP:BO)\\ \quad -(DP:DO)+\downarrow(PBO). \end{cases}$$

FORME

θ	FORME LXIV. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{g+hz^n\sqrt[3]{e+fz^n}}$
&c.	
2.	$\frac{+z^n}{nfh}$ DPP $-\frac{3g}{nhh}$ D ① $+\frac{-3fg}{nfhh}$ D ②.
1.	$\frac{+3}{nh}$ D ① $+\frac{3}{nh}$ D ②.
0.	$\frac{-3}{ng}$ D ①. Voyez fig. 29.
— 1.	$\frac{-3}{2neg}$ DPP $+\frac{3h}{ngg}$ D ①.
— 2.	$\frac{+15ehz^n-6eg+9fgz^n}{10neeggz^n}$ DPP $-\frac{3hh}{ng^3}$ D ①.
&c.	

$$P=\sqrt[3]{\frac{e+fz^n}{z^n}}.\quad p=eh-fg.$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{p}{g}};\ ①=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{g}{p}}\times+\beta(BP:BO)\\ \quad-(DP:DO)+\downarrow(PBO).\\ OP:OA::P:\sqrt[3]{f};\ ②=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{f}}\times-(AP:AO)\\ \quad+\beta(CP:CO)-\downarrow(PCO). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{-p}{g}};\ ①=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{-g}{p}}\times-(AP:AO)\\ \quad+\beta(CP:CO)-\downarrow(PCO).\\ OP:OA::P:\sqrt[3]{-f};\ ②=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{-1}{f}}\times+\beta(BP:BO)\\ \quad-(DP:DO)+\downarrow(PBO). \end{cases}$$

θ	FORME LXV. $\frac{Dz^{\frac{1}{n}-1}\,dz\,\sqrt[3]{e+fz^n}}{g+bz^n}$
&c.	
2.	$\frac{-12fg+3eh+3fhz^n}{4nfhh}\,D\,P+\frac{3gp}{nh^3}\,D\,①.$
1.	$\frac{+3}{nh}\,D\,P-\frac{3p}{nhh}\,D\,①.$
	Voyez fig. 29.
0.	$\frac{+3p}{ngh}\,D\,①-\frac{3e}{ng}\,D\,②.$
1.	$\frac{-1}{ngz^n}\,D\,P-\frac{3p}{ngg}\,D\,①+\frac{-fg+3eh}{ngg}\,D\,②.$
&c.	

$$P=\sqrt[3]{e+fz^n}.\quad p=fg-eh.$$

1. *Cas.*

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{\frac{p}{h}}$; ① = $+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{hh}{pp}}\times-\beta$ (BP : BO) + (DP : DO) + ↓ (PBO).

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{e}$; ② = $+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{ee}}\times-$ (AP : AO) + β (CP : CO) + ↓ (PCO).

2. *Cas.*

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{-\frac{p}{h}}$; ① = $-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{hh}{pp}}\times-$ (AP : AO) + β (CP : CO) + ↓ (PCO).

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{-e}$; ② = $-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{ee}}\times-\beta$ (BP : BO) + (DP : DO) + ↓ (PBO).

θ	FORME LXVI. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz\sqrt[3]{e+fz^n}}{g+hz^n}$
&c.	
1.	$\frac{+z^n}{nh}DP+\frac{3p}{nhh}D①-\frac{-eh+3fg}{nbb}D②.$
0.	$\frac{-3p}{ngh}D①+\frac{3f}{nh}D②.$
	Voyez fig. 29.
— 1.	$\frac{-3}{ng}DP+\frac{3p}{ngg}D①.$
— 2.	$\frac{-3eg-3fgz^n}{4negg+12ehz^n}DP-\frac{3hp}{ng^3}D①.$
&c.	

$$P=\sqrt[3]{\frac{e+fz^n}{z^n}}.\quad p=eh-fg.$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{p}{g}};\ ①=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{gg}{pp}}x-\beta(BP:BO)\\ \quad+(DP:DO)+\downarrow(PBO).\\ OP:OA::P:\sqrt[3]{f};\ ②=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{ff}}x-(AP:AO)\\ \quad+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{-p}{g}};\ ①=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{gg}{pp}}x-(AP:AO)\\ \quad+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO).\\ OP:OA::P:\sqrt[3]{-f};\ ②=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{ff}}x-\beta(BP:BO)\\ \quad+(DP:DO)+\downarrow(PBO). \end{cases}$$

θ	FORME LXVII. $\frac{Dz^{n-1}dz}{g+hz^n\sqrt[4]{e+fz^n}}$	
&c.	$-28fg$	
3.	$\frac{-16eh+12fhz^n}{21nffhh}DP^3+\frac{4gg}{nh^3}D①.$	
2.	$\frac{+4}{3nfh}DP^3-\frac{4g}{nhh}D①.$	
1.	$\frac{+4}{nh}D①.$	Voyez fig. 30.
0.	$\frac{-4}{ng}D①-\frac{4}{ng}D②.$	
— 1. &c.	$\frac{-1}{negz^n}DP^3+\frac{4h}{ngg}D①+\frac{+fg}{\frac{4eh}{negg}}D②.$	

$$P=\sqrt[4]{e+fz^n},\quad p=fg-eh.$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{p}{h}};\quad ①=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{h}{p}}\,x+\beta(BP:BO)\\ \quad -\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO).\\ OP:OA::P:\sqrt[4]{e};\quad ②=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{1}{e}}\,x-(AP:AO)\\ \quad +(EP:EO)-\chi(PCO). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{-p}{h}};\quad ①=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-h}{p}}\,x+(AP:AO)\\ \quad +(EP:EO)-\chi(PCO).\\ OP:OA::P:\sqrt[4]{-e};\quad ②=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-1}{e}}\,x+\beta(BP:BO)\\ \quad -\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO). \end{cases}$$

θ	FORME LXVIII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{g+hz^n\sqrt[4]{e+fz^n}}$
&c.	
2.	$\frac{+z^n}{nfh}DP^3-\frac{4g}{nhh}D①+\frac{-4fg}{nhh}D②.$ (−eh)
1.	$\frac{+4}{nh}D①+\frac{4}{nh}D②.$
0.	$\frac{-4}{ng}D①.$ Voyez fig. 30.
1.	$\frac{-4}{3neg}DP^3+\frac{4h}{ngg}D①.$
2.	$\frac{-12eg+16fgz^n+28ehz^n}{21neeggz^n}DP^3-\frac{4hh}{ng^3}D①.$
&c.	

$$P=\sqrt[4]{\frac{e+fz^n}{z^n}}.\quad p=eh-fg.$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{p}{g}};\quad ①=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{g}{p}}\,x+\beta(BP:BO)\\ \quad -\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO).\\ OP:OA::P:\sqrt[4]{f};\quad ②=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{1}{f}}\,x-(AP:AO)\\ \quad +(EP:EO)-\chi(PCO). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{-p}{g}};\quad ①=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-g}{p}}\,x-(AP:AO)\\ \quad +(EP:EO)-\chi(PCO).\\ OP:OA::P:\sqrt[4]{-f};\quad ②=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-1}{f}}\,x+\beta(BP:BO)\\ \quad -\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO). \end{cases}$$

θ	FORME LXIX. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[4]{e+fz^n}}{g+hz^n}$
&c.	
2.	$\frac{-20fg+4eh+4fhz^n}{5nfbb}DP+\frac{4gp}{nb^3}D①.$
1.	$\frac{+4}{nb}DP-\frac{4p}{nbb}D①.$
0.	$\frac{+4p}{ngb}D①-\frac{4e}{ng}D②.$
— 1.	$\frac{-1}{ngz^n}DP-\frac{4p}{ngg}D①+\frac{-fg}{\frac{4eh}{ngg}}D②.$
&c.	

Voyez fig. 30.

$$P=\sqrt[4]{e+fz^n},\quad p=fg-eh.$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{p}{b}};\quad ①=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{b^3}{p^3}}\times-\beta(BP:BO)\\ \quad+\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO).\\ OP:OA::P:\sqrt[4]{e};\quad ②=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{1}{e^3}}\times-(AP:AO)\\ \quad+(EP:EO)+\chi(PCO). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{-p}{b}};\quad ①=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-b^3}{p^3}}\times-(AP:AO)\\ \quad+(EP:EO)+\chi(PCO).\\ OP:OA::P:\sqrt[4]{-e};\quad ②=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-1}{e^3}}\times-\beta(BP:BO)\\ \quad+\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO). \end{cases}$$

θ	FORME LXX. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{3}{4}n-1}dz\sqrt[4]{e+fz^n}}{g+hz^n}$
&c.	
1.	$\frac{+z^n}{nb}DP+\frac{4p}{nbb}D\textcircled{1}-\frac{+4fg}{nbb}D\textcircled{2}$.
0.	$\frac{-4p}{ngb}D\textcircled{1}+\frac{4f}{nb}D\textcircled{2}$.
	Voyez. fig. 30.
1.	$\frac{-4}{ng}DP+\frac{4p}{ngg}D\textcircled{1}$.
2.	$\frac{-4eg-4fgz^n}{5neggz^n}DP-\frac{4bp}{ng^3}D\textcircled{1}$.
&c.	

$$P=\sqrt[4]{\frac{e+fz^n}{z^n}}.\quad p=eb-fg.$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{p}{g}};\quad \textcircled{1}=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{g^3}{p^3}}\times-\beta(BP:BO)\\ \quad+\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO).\\ OP:OA::P:\sqrt[4]{f};\quad \textcircled{2}=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{1}{f^3}}\times-(AP:AO)\\ \quad+(EP:EO)+\chi(PCO). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{-p}{g}};\quad \textcircled{1}=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-g^3}{p^3}}\times-(AP:AO)\\ \quad+(EP:EO)+\chi(PCO). \\ OP:OA::P:\sqrt[4]{-f};\quad \textcircled{2}=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-1}{f^3}}\times-\beta(BP:BO)\\ \quad+\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO). \end{cases}$$

θ	FORME LXXI. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[2]{k+lz^n}}$ 1. *Cas.*
&c.	
3.	$\frac{2}{ngl}DP-\frac{+\overline{fl+a}^{|2}}{2nggla}D①+\frac{+\overline{fl-a}^{|2}}{2nggla}D②.$
2.	$\frac{a+fl}{nga}D①+\frac{a-fl}{nga}D②.$
	Voyez fig. 28.
1.	$\frac{-2l}{na}D①+\frac{2l}{na}D②.$
0.	$\frac{-2}{ne}D◎+\frac{fl-a}{nea}D①-\frac{+fl+a}{nea}D②.$
&c.	

$P=\sqrt[2]{k+lz^n}$. $a=\sqrt[2]{ffll-4egll}$. $p=\frac{1}{2}fl-gk+\frac{1}{2}a$.
$q=\frac{1}{2}fl-gk-\frac{1}{2}a$.

1. *Cas.*
- OP : OA : P :: $\sqrt[2]{k}$; ◎ $=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{k}}\times-$(AP : AO) + (CP : CO).
- OP : OA :: P : $\sqrt[2]{\frac{p}{g}}$; ① $=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{g}{p}}\times\downarrow$(PBO).
- OP : OA :: P : $\sqrt[2]{\frac{q}{g}}$; ② $=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{g}{q}}\times\downarrow$(PBO).

2. *Cas.*
- OP : OA :: P : $\sqrt[2]{-k}$; ◎ $=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-1}{k}}\times\downarrow$(PBO).
- OP : OA :: P : $\sqrt[2]{\frac{-p}{g}}$; ① $=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-g}{p}}\times-$(AP : AO) + (CP : CO).
- OP : OA :: P : $\sqrt[2]{\frac{-q}{g}}$; ② $=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-g}{q}}\times-$(AP : AO) (CP : CO).

FORME

θ	FORME LXXII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[2]{k+lz^n}}$ 1. *Cas.*
&c.	
2.	$\frac{+2}{ng}D\odot-\frac{+fk-a}{nga}D\textcircled{1}+\frac{fk+a}{nga}D\textcircled{2}.$
1.	$\frac{+2k}{na}D\textcircled{1}-\frac{2k}{na}D\textcircled{2}.$
0.	$-\frac{+fk+a}{nea}D\textcircled{1}+\frac{fk-a}{nea}D\textcircled{2}.$ Voyez fig. 28.
$\overline{1}$.	$\frac{2}{nek}DP+\frac{\overline{fk+a}\|^2}{2neeka}D\textcircled{1}-\frac{+\overline{fk-a}\|^2}{2neeka}D\textcircled{2}.$
&c.	

$$P=\sqrt[2]{\frac{k+lz^n}{z^n}}.\quad a=\sqrt[2]{ffkk-4egkk}.\quad p=\tfrac{1}{2}fk-el+\tfrac{1}{2}a.$$
$$q=\tfrac{1}{2}fk-el-\tfrac{1}{2}a.$$

1. *Cas.*
- $OP:OA::P:\sqrt[2]{l}$; $\odot=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{l}}\times-(AP:AO)+(CP:CO)$.
- $OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{p}{e}}$; $\textcircled{1}=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{e}{p}}\times\downarrow(PBO)$.
- $OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{q}{e}}$; $\textcircled{2}=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{e}{q}}\times\downarrow(PBO)$.

2. *Cas.*
- $OP:OA::P:\sqrt[2]{-l}$; $\odot=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-1}{l}}\times\downarrow(PBO)$.
- $OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{-p}{e}}$; $\textcircled{1}=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-e}{p}}\times-(AP:AO)+(CP:CO)$.
- $OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{-q}{e}}$; $\textcircled{2}=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-e}{q}}\times-(AP:AO)+(CP:CO)$.

θ	FORME LXXI. $\frac{Dz^{\frac{1}{n}-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[2]{k+lz^n}}$ 2. Cas.
&c.	
3.	$\frac{2}{ngl}DP+\frac{-egl}{2ngr}DM+\frac{+egl}{2ngr}Dx\,①+②.$
2.	$-\frac{+r+gk}{2nr}DM-\frac{+r-gk}{2nr}Dx\,①+②.$
	Voyez fig. 28.
1.	$\frac{+gl}{2nr}DM-\frac{gl}{2nr}Dx\,①+②.$
0.	$\frac{-2}{ne}D\,◎+\frac{+ggk}{2ner}DM+\frac{-ggk}{2ner}Dx\,①+②.$
&c.	

$P=\sqrt[2]{k+lz^n}$. $q=ell-fkl+gkk$. $r=\sqrt{gq}$.

$s=\sqrt{-fgl+2ggk+2\sqrt{g^3q}}$.

$M=\frac{1}{r}(r+sP+gPP:r-sP+gPP)$.

1. Cas.

$OP:OA::P:\sqrt[2]{k}$; ... $◎=^{+\frac{1}{2}}\sqrt[2]{\frac{1}{k}}\times(CP:AP)$.

$OP:OA::\pm\frac{1}{2}s+gP:\sqrt{\frac{1}{4}ss-gr}$; $①=^{+\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ss-gr}}\times(CP:AP)$.

$OP:OA::-\frac{1}{2}s+gP:\sqrt{\frac{1}{4}ss-gr}$; $②=^{+\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ss-gr}}\times(CP:AP)$.

2. Cas.

$OP:OA::P:\sqrt[2]{-k}$; ... $◎=^{-\frac{1}{2}}\sqrt[2]{\frac{-1}{k}}\times\downarrow(PBO)$.

$OP:OA::\pm\frac{1}{2}s+gP:\sqrt{gr-\frac{1}{4}ss}$; $①=^{-\frac{1}{2}}\sqrt[2]{\frac{1}{gr-\frac{1}{4}ss}}\times\downarrow(PBO)$.

$OP:OA::=\frac{1}{2}s+gP:\sqrt{gr-\frac{1}{4}ss}$; $②=^{-\frac{1}{2}}\sqrt[2]{\frac{1}{gr-\frac{1}{4}ss}}\times\downarrow(PBO)$.

θ	FORME LXXII. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[2]{k+lz^n}}$ 2. *Cas.*
&c.	
2.	$\frac{2}{ng}\,D\,⊙ + \frac{-e,\overline{r-fk}}{2ngr}\,D\,M + \frac{-e,\overline{r+fk}}{2ngr}\,D\,x\,① + ②.$
1.	$\frac{-ek}{2nr}\,D\,M + \frac{ek}{2nr}\,D\,x\,① + ②.$
	Voyez fig. 28.
0.	$\frac{r+el}{2nr}\,D\,M + \frac{r-el}{2nr}\,D\,x\,① + ②.$
$\frac{-}{1}$.	$\frac{-2}{nek}\,D\,P + \frac{-f,\overline{r+el}}{2ner}\,D\,M + \frac{-f,\overline{r-el}}{2ner}\,D\,x\,① + ②.$
&c.	

$$P = \sqrt[2]{\frac{k+lz^n}{z^n}}.\quad q = ell - fkl + gkk.\quad r = \sqrt{eq}.$$

$$s = \sqrt{-efk + 2eel + 2\sqrt{e^3q}}.$$

$$M = \tfrac{1}{r}\,(r + sP + ePP : r - sP + ePP).$$

1. *Cas.*

$$\begin{cases} OP : OA :: P : \sqrt[2]{l}; \ldots\ ⊙ = {}^{+\frac{1}{2}}\sqrt[2]{\frac{1}{l}} \times (CP : AP). \\ OP : OA :: {}^{+\frac{1}{2}}s + eP : \sqrt{\frac{1}{4}ss - er};\ ① = {}^{+\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ss - er}} \times (CP : AP). \\ OP : OA :: {}^{-\frac{1}{2}}s + eP : \sqrt{\frac{1}{4}ss - er};\ ② = {}^{+\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ss - er}} \times (CP : AP). \end{cases}$$

2. *Cas.*

$$\begin{cases} OP : OA :: P : \sqrt[2]{-l}; \ldots\ ⊙ = {}^{-\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{-1}{l}} \times \downarrow (PBO). \\ OP : OA :: {}^{+\frac{1}{2}}s + eP : \sqrt{er - \frac{1}{4}ss};\ ① = {}^{-\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{1}{er - \frac{1}{4}ss}} \times \downarrow (PBO). \\ OP : OA :: {}^{-\frac{1}{2}}s + eP : \sqrt{er - \frac{1}{4}ss};\ ② = {}^{-\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{1}{er - \frac{1}{4}ss}} \times \downarrow (PBO). \end{cases}$$

θ	FORME LXXIII. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[z]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 1. *Cas.*
&c.	$-6fl$
3.	$\frac{+2gk+2glz^n}{3ngg l}\,D\,P+\frac{p,\overline{fl+a}|^2}{2ng^3la}D\,①+\frac{-q,\overline{fl-a}|^2}{2ng^3la}D\,②.$
2.	$\frac{+2}{ng}\,D\,P+\frac{-p,\overline{fl+a}}{nggα}D\,①+\frac{q,\overline{fl-a}}{nggα}D\,②.$
1.	$\frac{+2pl}{ngα}D\,①-\frac{2ql}{ngα}D\,②.$ Voyez fig. 28.
0.	$\frac{-2k}{ne}D\,◎+\frac{+k,\overline{fl-a}\quad -2ell}{neα}D\,①+\frac{-k,\overline{fl+a}\quad +2ell}{neα}D\,②.$
&c.	

$P=\sqrt[z]{k+lz^n}$. $α=\sqrt[z]{ffll-4egll}$. $p=\frac{1}{2}fl-gk+\frac{1}{2}α$.

$q=\frac{1}{2}fl-gk-\frac{1}{2}α$.

1. *Cas.*

OP : OA :: P : $\sqrt[z]{k}$; ◎ = $+\frac{1}{2}\sqrt[z]{\frac{1}{k}}$ × — (AP : AO) + (CP : CO).

OP : OA :: P : $\sqrt[z]{\frac{p}{g}}$; ① = $+\frac{1}{2}\sqrt[z]{\frac{g}{p}}$ × ↓(PBO).

OP : OA :: P : $\sqrt[z]{\frac{q}{g}}$; ② = $+\frac{1}{2}\sqrt[z]{\frac{g}{q}}$ × ↓(PBO).

2. *Cas.*

OP : OA :: P : $\sqrt[z]{-k}$; ◎ = $-\frac{1}{2}\sqrt[z]{\frac{-1}{k}}$ × ↓(PBO).

OP : OA :: P : $\sqrt[z]{\frac{-p}{g}}$; ① = $-\frac{1}{2}\sqrt[z]{\frac{-g}{p}}$ × — (AP : AO) + (CP : CO).

OP : OA :: P : $\sqrt[z]{\frac{-q}{g}}$; ② = $-\frac{1}{2}\sqrt[z]{\frac{-g}{q}}$ × — (AP : AO) + (CP : CO).

θ	FORME LXXIV. $\frac{Dz^{\frac{1}{2}n+\frac{1}{2}n-1}dz\sqrt[2]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 1. *Cas.*
&c.	
1.	$\frac{+2l}{ng}D\odot+\frac{+2gkk}{nga}D\textcircled{1}+\frac{\overset{-l,\overline{fk-a}}{+2gkk}}{nga}D\textcircled{2}+\frac{\overset{+l,\overline{fl+a}}{-2gkk}}{nga}D\textcircled{2}.$
0.	$\frac{-2pk}{nea}D\textcircled{1}+\frac{2qk}{nea}D\textcircled{2}.$ Voyez fig. 28.
— 1.	$\frac{-2}{ne}DP+\frac{p,\overline{fk+a}}{neea}D\textcircled{1}+\frac{-q,\overline{fl+a}}{neea}D\textcircled{2}.$
— 2.	$\frac{-2ek-2elz^n+6fkz^n}{3neekz^n}DP+\frac{-p,\overline{fk+a}\,|^2}{2ne^3ka}D\textcircled{1}+\frac{+q,\overline{fk-a}\,|^2}{2ne^3ka}D\textcircled{2}.$
&c.	

$P=\sqrt[2]{\frac{k+lz^n}{z^n}}$. $a=\sqrt[2]{ffkk-4egkk}$. $p=\frac{1}{2}fk-el+\frac{1}{2}a$.

$q=\frac{1}{2}fk-el-\frac{1}{2}a$.

1. *Cas.*

OP : OA :: $P^{\frac{n}{2}}$: $\sqrt[2]{l}$; $\odot=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{l}}\times-$(AP : AO) + (CP : CO).

OP : OA :: P : $\sqrt[2]{\frac{p}{e}}$; $\textcircled{1}=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{e}{p}}\times\downarrow$(PBO).

OP : OA :: P : $\sqrt[2]{\frac{q}{e}}$; $\textcircled{2}=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{e}{q}}\times\downarrow$(PBO).

2. *Cas.*

OP : OA :: P : $\sqrt[2]{-l}$; $\odot=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{l}}\times\downarrow$(PBO).

OP : OA :: P : $\sqrt[2]{\frac{-p}{e}}$; $\textcircled{1}=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{e}{p}}\times-$(AP : AO) + (CP : CO).

OP : OA :: P : $\sqrt[2]{\frac{-q}{e}}$; $\textcircled{2}=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{e}{q}}\times-$(AP : AO) + (CP : CO).

θ	FORME LXXIII. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[2]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 2. *Cas.*
&c.	$-6fl \qquad +l,\overline{eg-ff} \qquad +l,\overline{eg-ff}$
3.	$\frac{+2gk+2glz^n}{3ngg^l}DP+\frac{f,\overline{r+gk}}{2ngg}DM+\frac{-f,\overline{r-gk}}{2ngg}Dx\textcircled{1}+\textcircled{2}.$
2.	$\frac{2}{ng}DP+\frac{fl-r-gk}{2ng}DM+\frac{fl+r-gk}{2ng}Dx\textcircled{1}+\textcircled{2}.$
	Voyez fig. 28.
1.	$\frac{-l}{2n}DM-\frac{l}{2n}Dx\textcircled{1}+\textcircled{2}.$
0.	$\frac{-2k}{ne}D^1\textcircled{\scriptsize 0}+\frac{r+gk}{2ne}DM-\frac{+r-gk}{2ne}Dx\textcircled{1}+\textcircled{2}.$
&c.	

$P=\sqrt[2]{k+lz^n}$. $q=ell-fkl+gkk$. $r=\sqrt{gq}$.

$s=\sqrt{-fgl+2ggk+2\sqrt{g^3q}}$.

$M=\frac{1}{r}(r+sP+gPP:r-sP+gPP)$.

1. *Cas.*

$OP:OA::P:\sqrt[2]{k}$;.... $\textcircled{0}=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{k}}\times(CP:AP)$.

$OP:OA::+\frac{1}{2}s+gP:\sqrt{\frac{1}{4}ss-gr}$; $\textcircled{1}=+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ss-gr}}\times(CP:AP)$.

$OP:OA::-\frac{1}{2}s+gP:\sqrt{\frac{1}{4}ss-gr}$; $\textcircled{2}=+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ss-gr}}\times(CP:AP)$.

2. *Cas.*

$OP:OA::P:\sqrt[2]{-k}$;.... $\textcircled{0}=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-1}{k}}\times\downarrow(PBO)$.

$OP:OA::+\frac{1}{2}s+gP:\sqrt{gr-\frac{1}{4}ss}$; $\textcircled{1}=-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{gr-\frac{1}{4}ss}}\times\downarrow(PBO)$.

$OP:OA::-\frac{1}{2}s+gP:\sqrt{gr-\frac{1}{4}ss}$; $\textcircled{2}=-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{gr-\frac{1}{4}ss}}\times\downarrow(PBO)$.

θ	FORME LXXIV. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz\sqrt[2]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 2. Cas.
&c.	
1.	$\frac{+2l}{ng}\,D\,\odot - \frac{+r+el}{2ng}\,DM + \frac{r-el}{2ng}\,D\times\textcircled{1}+\textcircled{2}.$
0.	$\frac{+k}{2n}\,DM + \frac{k}{2n}\,D\times\textcircled{1}+\textcircled{2}.$
	Voyez fig. 28.
1.	$\frac{-2}{ne}\,DP + \frac{r+el-fk}{2ne}\,DM - \frac{+r-el+fk}{2ne}\,D\times\textcircled{1}+\textcircled{2}.$
2.	$\frac{+6fkz^n \quad -2ek-2elz^n}{3neekz^n}\,DP + \frac{+k,\overline{ff-eg} \quad -f,r+el}{2nee}\,DM + \frac{+k,\overline{ff-eg} \quad f,r-el}{2nee}\,D\times\textcircled{1}+\textcircled{2}.$
&c.	

$$P = \sqrt[2]{\frac{k+lz^n}{z^n}}. \quad q = ell - fkl + gkk. \quad r = \sqrt{eq}.$$

$$s = \sqrt{-efk + 2eel + 2\sqrt{e^3q}}.$$

$$M = \tfrac{1}{s}(r+sP+ePP : r-sP+ePP.$$

1. Cas.
- $OP : OA :: P : \sqrt[2]{l}; \ldots \quad \odot = +\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{l}} \times (CP : AP).$
- $OP : OA :: +\frac{1}{2}s + eP : \sqrt{\frac{1}{4}ss - er}; \quad \textcircled{1} = +\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ss-er}} \times (CP : AP).$
- $OP : OA :: -\frac{1}{2}s + eP : \sqrt{\frac{1}{4}ss - er}; \quad \textcircled{2} = +\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4}ss-er}} \times (CP : AP).$

2. Cas.
- $OP : OA :: P : \sqrt[2]{-l}; \ldots \quad \odot = -\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-1}{l}} \times \downarrow(PBO).$
- $OP : OA :: \pm\frac{1}{2}s + eP : \sqrt{er - \frac{1}{4}ss}; \quad \textcircled{1} = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{er-\frac{1}{4}ss}} \times \downarrow(PBO).$
- $OP : OA :: -\frac{1}{2}s + eP : \sqrt{er - \frac{1}{4}ss}; \quad \textcircled{2} = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{er-\frac{1}{4}ss}} \times \downarrow(PBO).$

θ	FORME LXXV. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[3]{k+lz^n}}$ 1. *Cas.*
&c.	
3.	$\frac{3}{2ngl}$ D PP ÷ $3\times\frac{+\overline{fl+a}\,|^2}{4nggla}$ D ① + $3\times\frac{+\overline{fl-a}\,|^2}{4nggla}$ D ②.
2.	$\frac{3a+3fl}{2nga}$ D ① + $\frac{3a-3fl}{2nga}$ D ②.
1.	$\frac{-3l}{na}$ D ① + $\frac{3l}{na}$ D ②. Voyez fig. 29.
0.	$\frac{-3}{ne}$ D ◎ + $\frac{3fl-3a}{2nea}$ D ① − $\frac{+3fl+3a}{2nea}$ D ②.
&c.	

$P=\sqrt[3]{k+lz^n}$. $a=\sqrt[2]{ffll-4egll}$. $p=\frac{1}{2}fl-gk+\frac{1}{2}a$.
$q=\frac{1}{2}fl-gk-\frac{1}{2}a$.

1. *Cas.*

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{k}$; ◎ = $+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{k}}\times-$ (AP : AO) + β (CP : CO) − ↓ (PCO).

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{\frac{p}{g}}$; ① = $+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{g}{p}}\times\beta$ (BP : BO) − (DP : DO) + ↓ (PBO).

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{\frac{q}{g}}$; ② = $+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{g}{q}}\times\beta$ (BP : BO) − (DP : DO) + ↓ (PBO).

2. *Cas.*

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{-k}$; ◎ = $-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{-1}{k}}\times\beta$ (BP : BO) − (DP : DO) + ↓ (PBO).

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{\frac{-p}{g}}$; ① = $-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{-g}{p}}\times-$ (AP : AO) + β (CP : CO) − ↓ (PCO).

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{\frac{-q}{g}}$; ② = $-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{-g}{q}}\times-$ (AP : AO) + β (CP : CO) − ↓ (PCO).

FORME

θ	FORME LXXVI. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[3]{k+lz^n}}$ 1. *Cas.*
&c.	
2.	$+\frac{2}{ng}D\odot-\frac{+3fk-3a}{2ngq}D①+\frac{3fk+3a}{2ngq}D②.$
1.	$\frac{+3k}{na}D①-\frac{3k}{na}D②.$ Voyez fig. 29.
0.	$-\frac{+3fk+3a}{2nea}D①+\frac{3fk-3a}{2nea}D②.$
1.	$\frac{-3}{2nek}DPP+3\times\frac{\overline{fk+a}^2}{4neeka}D①-3\times\frac{+\overline{fk-a}^2}{4neeka}D②.$
&c.	

$$P=\sqrt[3]{\frac{k+lz^n}{z^n}}.\quad a=\sqrt[2]{ffkk-4eglk}.\quad p=\tfrac{1}{2}fk-el+\tfrac{1}{2}a.$$
$$q=\tfrac{1}{2}fk-el-\tfrac{1}{2}a.$$

1. *Cas.*
- $OP:OA::P:\sqrt[3]{l};\quad \odot=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{l}}\times-(AP:AO)+\beta(CP:CO)-\downarrow(PCO).$
- $OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{p}{e}};\quad ①=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{e}{p}}\times\beta(BP:BO)-(DP:DO)+\downarrow(PBO).$
- $OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{q}{e}};\quad ②=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{e}{q}}\times\beta(BP:BO)-(DP:DO)+\downarrow(PBO).$

2. *Cas.*
- $OP:OA::P:\sqrt[3]{-l};\quad \odot=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{-1}{l}}\times\beta(BP:BO)-(DP:DO)+\downarrow(PBO).$
- $OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{-p}{e}};\quad ①=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{-e}{p}}\times-(AP:AO)+\beta(CP:CO)-\downarrow(PCO).$
- $OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{-q}{e}};\quad ②=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{-e}{q}}\times-(AP:AO)+\beta(CP:CO)-\downarrow(PCO).$

θ	FORME LXXVII. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[3]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 1. *Cas.*
&c.	$-12fl$
3.	$\frac{+3gk+3glz^n}{4ngg}DP+\frac{3p,\overline{fl+a}^2}{4ng^3a}D①+\frac{-3q,\overline{fl-a}^2}{4ng^3a}D②.$
2.	$\frac{+3}{ng}DP+\frac{-3p,\overline{fl+a}}{2nggg}D①+\frac{3q,\overline{fl-a}}{2nggg}D②.$
1.	$\frac{+3pl}{nga}D①-\frac{3ql}{nga}D②.$ Voyez fig. 29.
0.	$\frac{-3k}{ne}D◎+\frac{+3k,\overline{fl-a}\ -6ell}{2nea}D①+\frac{-3k,\overline{fl+a}\ +6ell}{2nea}D②.$
&c.	

$P=\sqrt[3]{k+lz^n}$. $a=\sqrt[3]{ffll-4egll}$. $p=\frac{1}{2}fl-gk+\frac{1}{2}a$.

$q=\frac{1}{2}fl-gk-\frac{1}{2}a$.

1. *Cas.*

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{k}$; ◎ = $+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{kk}}x-$(AP : AO) $+\beta$(CP : CO) $+\downarrow$(PCO).

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{\frac{p}{g}}$; ① = $+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{gg}{pp}}x-\beta$(BP : BO) $+$(DP : DO) $+\downarrow$(PBO).

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{\frac{q}{g}}$; ② = $+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{gg}{qq}}x-\beta$(BP : BO) $+$(DP : DO) $+\downarrow$(PBO).

2. *Cas.*

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{-k}$; ◎ = $-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{kk}}x-\beta$(BP : BO) $+$(DP : DO) $+\downarrow$(PBO).

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{\frac{-p}{g}}$; ① = $+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{gg}{pp}}x-$(AP : AQ) $+\beta$(CP : CO) $+\downarrow$(PCO).

OP : OA :: P : $\sqrt[3]{\frac{-q}{g}}$; ② = $-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{gg}{qq}}x-$(AP : AO) $+\beta$(CP : CO) $+\downarrow$(PCO).

θ	FORME LXXVIII. $\frac{Dz^{\frac{1}{3}n+\frac{2}{3}n-1}dz\sqrt[3]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 1. Cas.
&c.	
1.	$\frac{+3l}{ng}D\odot+\frac{-3l,\overline{fk-a}}{2ngq}D①+\frac{+3l,\overline{fk+a}}{2ngq}D②.$
0.	$\frac{-3pk}{nea}D①+\frac{3qk}{nea}D②.$ Voyez fig. 29.
— 1.	$\frac{-3}{ne}DP+\frac{3p,\overline{fk+a}}{2nee}D①+\frac{-3q,\overline{fk-a}}{2nee}D②.$
— 2.	$\frac{-3ek-3elz^n+12fkz^n}{4neekz^n}DP+\frac{-3p,\overline{fk+a}\|^2}{4ne^3ka}D①+\frac{+3q,\overline{fk-a}\|^2}{4ne^3ka}D②.$
&c.	

$P=\sqrt[3]{\frac{k+lz^n}{z^n}}$. $q=\frac{1}{2}fk-el-\frac{1}{2}a$. $p=\frac{1}{2}fk-el+\frac{1}{2}a$. $a=\sqrt[3]{ffkk-4egkk}$.

1. Cas.
- $OP:OA::P:\sqrt[3]{l}$; $\odot=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{ll}}\times-(AP:AO)+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO)$.
- $OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{p}{e}}$; $①=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{ee}{pp}}\times-\beta(BP:BO)+(DP:DO)+\downarrow(PBO)$.
- $OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{q}{e}}$; $②=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{ee}{qq}}\times-\beta(BP:BO)+(DP:DO)+\downarrow(PBO)$.

2. Cas.
- $OP:OA::P:\sqrt[3]{-l}$; $\odot=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{1}{ll}}\times-\beta(BP:BO)+(DP:DO)+\downarrow(PBO)$.
- $OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{-p}{e}}$; $①=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{ee}{pp}}\times-(AP:AO)+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO)$.
- $OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{-q}{e}}$; $②=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{ee}{qq}}\times-(AP:AO)+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO)$.

θ	FORMÉ LXXIX. $\frac{Dz^{k-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[4]{k+lz^n}}$ 1. *Cas.*
&c.	
3.	$\frac{4}{3ngl}DP^3 - \frac{+\overline{fl+a}^2}{nggla}D①+\frac{\overline{fl-a}^2}{nggla}D②.$
2.	$\frac{2a+2fl}{nga}D①+\frac{2a-2fl}{nga}D②.$
1.	$\frac{-4l}{na}D①+\frac{4l}{na}D②.$ Voyez fig. 30.
0.	$\frac{-4}{ne}D◎+\frac{2fl-2a}{nea}D①-\frac{+2fl+2a}{nea}D②.$
&c.	

$P=\sqrt[4]{k+lz^n}$. $a=\sqrt[2]{ffll-4egll}$. $p=\frac{1}{2}fl-gk+\frac{1}{2}a$.

$q=\frac{1}{2}fl-gk-\frac{1}{2}a$.

1. *Cas.*

$OP:OA::P:\sqrt[4]{l}$; $◎=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{1}{k}}\times-(AP:AO)+(EP:EO)-\chi(PCO)$.

$OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{p}{g}}$; $①=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{g}{p}}\times\beta(BP:BO)-\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO)$.

$OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{q}{g}}$; $②=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{g}{q}}\times\beta(BP:BO)-\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO)$.

2. *Cas.*

$OP:OA::P:\sqrt[4]{-k}$; $◎=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-1}{k}}\times\beta(BP:BO)-\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO)$.

$OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{-p}{g}}$; $①=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-g}{p}}\times-(AP:AO)+(EP:EO)-\chi(PCO)$.

$OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{-q}{g}}$; $②=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-g}{q}}\times-(BP:BO)+(EP:EO)-\chi(PCO)$.

θ	FORME LXXX. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[4]{k+lz^n}}$ 1. Cas.
&c.	
2.	$\frac{+4}{ng}D\odot-\frac{+2fk-2a}{nga}D①+\frac{2fk+2a}{nga}D②.$
1.	$\frac{+4k}{na}D①-\frac{4k}{na}D②.$ Voyez fig. 30.
0.	$-\frac{+2fk+2a}{nea}D①+\frac{2fk-2a}{nea}D②.$
−1.	$\frac{-4}{3nek}DP^3+\frac{\overline{fk+a}^2}{neeka}D①-\frac{+\overline{fk-a}^2}{neeka}D②.$
&c.	

$$P=\sqrt[4]{\frac{k+lz^n}{z^n}}.\quad a=\sqrt{ffkk-4egkk}.\quad p=\tfrac{1}{2}fk-el+\tfrac{1}{2}a.$$
$$q=\tfrac{1}{2}fk-el-\tfrac{1}{2}a$$

1. Cas.
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[4]{l};\ \odot=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{1}{l}}\times-(AP:AO)\\ \quad+(EP:EO)-\chi(PCO)\\ OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{p}{e}};\ ①=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{e}{p}}\times\beta(BP:BO)\\ \quad-\beta(DP:DO)\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO).\\ OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{q}{e}};\ ②=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{e}{q}}\times\beta(BP:BO).\\ \quad-\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO). \end{cases}$$

2. Cas.
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[4]{-l};\ \odot=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-1}{l}}\times\beta(BP:BO)\\ \quad-\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO).\\ OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{-p}{e}};\ ①=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-e}{p}}\times-(AP:AO)\\ \quad+(EP:EO)-\chi(PCO).\\ OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{-q}{e}};\ ②=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-e}{q}}\times-(AP:AO)\\ \quad+(EP:EO)-\chi(PCO). \end{cases}$$

θ	FORME LXXIX. $\frac{Dz^{n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[4]{k+lz^n}}$ 2. Cas.
&c.	
2.	$\frac{-akr}{2nqs}D\times①+②+M;+\frac{+akr}{2nqs}D\times③+④+N.$
	Voyez fig. 30.
1.	$\frac{+alr}{2nqs}D\times①+②+M;+\frac{-alr}{2nqs}D\times③+④+N.$
0.	$\frac{-4}{ne}D\odot+\frac{-ar,\overline{fl-gk}}{2neqs}D\times①+②+M;+\frac{ar,\overline{fl-gk}}{2neqs}D\times③+④+N.$
&c.	

$$P=\sqrt[4]{k+lz^n}. \quad q=ell-fkl+gkk.$$

$$r=\sqrt{gq}. \quad s=\sqrt{-fgl+2ggk+2\sqrt{qg^3}}. \quad a=\sqrt[4]{qg^3}.$$

$$b=\sqrt{+\sqrt{-fg^3l+2g^4k+2\sqrt{qg^7}}+2\sqrt[4]{qg^7}}.$$

$$c=\sqrt{-\sqrt{fg^3l+2g^4k+2\sqrt{qg^7}}+2\sqrt[4]{qg^7}}.$$

$$M=\tfrac{1}{c}(a+cP+gPP:a-cP+gPP).$$

$$N=\tfrac{1}{b}(a+bP+gPP:a-bP+gPP.$$

1. *Cas.*

$$\left\{\begin{array}{l}
OP : OA :: P : \sqrt[4]{k}\,; \ldots \quad \odot = +\tfrac{1}{4}\sqrt[4]{\tfrac{1}{k}} \times -(AP : AO) \\
\quad + (EP : EO) - \chi(PCO). \\
OP : OA :: \pm\tfrac{1}{2}c + gP : \sqrt[2]{\tfrac{1}{4}cc - ag}\,; \ (1) = +\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{\frac{1}{4}cc - ag}} \times \\
\quad (EP : AP). \\
OP : OA :: -\tfrac{1}{2}c + gP : \sqrt[2]{\tfrac{1}{4}cc - ag}\,; \ (2) = +\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{\frac{1}{4}cc - ag}} \times \\
\quad (EP : AP). \\
OP : OA :: \pm\tfrac{1}{2}b + gP : \sqrt[2]{\tfrac{1}{4}bb - ag}\,; \ (3) = +\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{\frac{1}{4}bb - ag}} \times \\
\quad (EP : AP). \\
OP : OA :: -\tfrac{1}{2}b + gP : \sqrt{\tfrac{1}{4}bb - ag}\,; \ (4) = +\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{\frac{1}{4}bb - ag}} \times \\
\quad (EP : AP).
\end{array}\right.$$

2. *Cas.*

$$\left\{\begin{array}{l}
OP : OA :: P : \sqrt[4]{-k}\,; \ldots \odot = -\tfrac{1}{4}\sqrt[4]{\tfrac{-1}{k}} \times +\beta(BP : BO) \\
\quad -\beta(DP : DO) + \downarrow(PBO) + \downarrow(PDO). \\
OP : OA :: +\tfrac{1}{4}c + gP : \sqrt[2]{ag - \tfrac{1}{4}cc}\,; \ (1) = -\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{ag - \frac{1}{4}cc}} \times \\
\quad \chi(PCO). \\
OP : OA :: -\tfrac{1}{2}c + gP : \sqrt[2]{ag - \tfrac{1}{4}cc}\,; \ (2) = -\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{ag - \frac{1}{4}cc}} \times \\
\quad \chi(PCO). \\
OP : OA :: \pm\tfrac{1}{2}b + gP : \sqrt[2]{ag - \tfrac{1}{4}bb}\,; \ (3) = -\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{ag - \frac{1}{4}bb}} \times \\
\quad \chi(PCO). \\
OP : OA :: -\tfrac{1}{2}b + gP : \sqrt[2]{ag - \tfrac{1}{4}bb}\,; \ (4) = -\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{ag - \frac{1}{4}bb}} \times \\
\quad \chi(PCO).
\end{array}\right.$$

θ	FORME LXXX. $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[4]{k+lz^n}}$ 2. Cas.
&c.	
2.	$\frac{4}{ng}D\odot+\frac{ar,\overline{fk-el}}{2ngqs}Dx\textcircled{1}+\textcircled{2}+M;+\frac{-ar,\overline{fk-el}}{2ngqs}Dx\textcircled{3}+\textcircled{4}+N.$
	Voyez fig. 30.
1.	$\frac{-akr}{2nqs}Dx\textcircled{1}+\textcircled{2}+M;+\frac{akr}{2nqs}Dx\textcircled{3}+\textcircled{4}+N.$
0.	$\frac{+alr}{2nqs}Dx\textcircled{1}+\textcircled{2}+M;+\frac{-alr}{2nqs}Dx\textcircled{3}+\textcircled{4}+N.$
&c.	

$$P=\sqrt[4]{\frac{k+lz^n}{z^n}}.\quad q=ell-fkl+gkk.$$

$$r=\sqrt{eq}.\quad s=\sqrt{-efk+2eel+2\sqrt{qe^3}}.\quad a=\sqrt[4]{qe^3}.$$

$$b=\sqrt{+\sqrt{-e^3fk+2e^4l+2\sqrt{qe^7}}+2\sqrt[4]{qe^7}}.$$

$$c=\sqrt{-\sqrt{-e^3fk+2e^4l+2\sqrt{qe^7}}+2\sqrt[4]{qe^7}}.$$

$$M=\tfrac{1}{c}(a+cP+ePP:a-cP+ePP).$$

$$N=\tfrac{1}{b}(a+bP+ePP:a-bP+ePP).$$

OP e

1. Cas.

$OP : OA :: P : \sqrt[4]{l}$; .... $\odot = +\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{1}{l}} \times -(AP : AO) + (EP : EO) - \chi(PCO)$.

$OP : OA :: +\frac{1}{2}c + eP : \sqrt[2]{\frac{1}{4}cc - ae}$; $① = +\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{\frac{1}{4}cc - ae}} \times (EP : AP)$.

$OP : OA :: -\frac{1}{2}c + eP : \sqrt[2]{\frac{1}{4}cc - ae}$; $② = +\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{\frac{1}{4}cc - ae}} \times (EP : AP)$.

$OP : OA :: +\frac{1}{2}b + eP : \sqrt[2]{\frac{1}{4}bb - ae}$; $③ = +\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{\frac{1}{4}bb - ae}} \times (EP : AP)$.

$OP : OA :: -\frac{1}{2}b + eP : \sqrt[2]{\frac{1}{4}bb - ae}$; $④ = +\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{\frac{1}{4}bb - ae}} \times (EP : AP)$.

2. Cas.

$OP : OA :: P : \sqrt[4]{-l}$; .... $\odot = -\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-1}{l}} \times + \beta(BP : BO) - \beta(DP : DO) + \downarrow(PBO) + \downarrow(PDO)$.

$OP : OA :: +\frac{1}{2}c + eP : \sqrt[2]{ae - \frac{1}{4}cc}$; $① = -\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{ae - \frac{1}{4}cc}} \times \chi(PCO)$.

$OP : OA :: -\frac{1}{2}c + eP : \sqrt[2]{ae - \frac{1}{4}cc}$; $② = -\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{ae - \frac{1}{4}cc}} \times \chi(PCO)$.

$OP : OA :: +\frac{1}{2}b + eP : \sqrt[2]{ae - \frac{1}{4}bb}$; $③ = -\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{ae - \frac{1}{4}bb}} \times \chi(PCO)$.

$OP : OA :: -\frac{1}{2}b + eP : \sqrt[2]{ae - \frac{1}{4}bb}$; $④ = -\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{ae - \frac{1}{4}bb}} \times \chi(PCO)$.

θ	FORME LXXXI. $\frac{Dz^{n-1}dz\sqrt[4]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 1. Cas.
&c.	
3.	$\frac{-20fl}{+4gk+4qlz^n}$ D P $+\frac{p,\overline{fl+a}^2}{ng^3la}$ D ① $+\frac{-q,\overline{fl-a}^2}{ng^3la}$ D ②.
2.	$\frac{+4}{ng}$ D P $+\frac{-2p,\overline{fl+a}}{nggz}$ D ① $+\frac{2q,\overline{fl-a}}{nggz}$ D ②.
1.	$\frac{+4pl}{ngz}$ D ① $-\frac{4ql}{ngz}$ D ②. Voyez fig. 30.
0.	$\frac{-4k}{ne}$ D ◎ $+\frac{2k,\overline{fl-a}}{\frac{-4ell}{nez}}$ D ① $+\frac{-2k,\overline{fl+a}}{\frac{+4ell}{nez}}$ D ②.
&c.	

$P=\sqrt[4]{k+lz^n}$. $a=\sqrt{ffll-4egll}$. $p=\frac{1}{2}fl-gk+\frac{1}{2}a$.

$q=\frac{1}{2}fl-gk-\frac{1}{2}a$.

1. Cas.

OP : OA :: P : $\sqrt[4]{k}$; ◎ $=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{1}{k^3}}\times-$ (AP : AO) + (EP : EO) + χ (PCO).

OP : OA :: P : $\sqrt[4]{\frac{p}{g}}$; ① $=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{g^3}{p^3}}\times-\beta$ (BP : BO) + β (DP : DO) + ↓ (PBO) + ↓ (DPO).

OP : OA :: P : $\sqrt[4]{\frac{q}{g}}$; ② $=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{g^3}{q^3}}\times-\beta$ (BP : BO) + β (DP : DO) + ↓ (PBO) + ↓ (PDO).

2. Cas.

OP : OA :: P : $\sqrt[4]{-k}$; ◎ $=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-1}{k^3}}\times-\beta$ (BP : BO) + β (DP : DO) + ↓ (PBO) + ↓ (PDO).

OP : OA :: P : $\sqrt[4]{\frac{-p}{g}}$; ① $=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-g^3}{p^3}}\times-$ (AP : AO) + (EP : EO) + χ (PCO).

OP : OA :: P : $\sqrt[4]{\frac{-q}{g}}$; ② $=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-g^3}{q^3}}\times-$ (AP : AO) + (EP : EO) + χ (PCO).

θ	FORME LXXXII. $\frac{Dz^{\theta n}+\frac{1}{4}n-1\,dz\sqrt[4]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$	II. Cas.
&c.		
1.	$\frac{+4l}{ng}D\odot+\frac{-2l,\overline{fk-a}}{nga}D\textcircled{1}+\frac{+2l,\overline{fk+a}}{nga}D\textcircled{2}$.	2
0.	$\frac{-4pk}{nea}D\textcircled{1}+\frac{4qk}{nea}D\textcircled{2}$. Voyez fig. 30.	
1.	$\frac{-4}{ne}DP+\frac{2p,\overline{fk+a}}{neea}D\textcircled{1}+\frac{-2q,\overline{fk-a}}{neea}D\textcircled{2}$.	1
2.	$\frac{-4ek-4elz^n+20fkz^n}{5neekz^n}DP+\frac{-p,\overline{fk+a}^2}{ne^3ka}D\textcircled{1}+\frac{q,\overline{fk-a}^2}{ne^3ka}D\textcircled{2}$.	2
&c.		

$P=\sqrt[4]{\frac{k+lz^n}{z^n}}$. $a=\sqrt{ffkk-4egkk}$. $p=\frac{1}{2}fk-el+\frac{1}{2}a$.

$q=\frac{1}{2}fk-el-\frac{1}{2}a$.

1. Cas.

OP : OA :: P : $\sqrt[4]{l}$; $\odot=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{1}{l^3}}\times$ (AP : AO)
+ (EP : EO) + χ (PCO).

OP : OA :: P : $\sqrt[4]{\frac{p}{e}}$; $\textcircled{1}=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{e^3}{p^3}}\times-\beta$ (BP : BO)
+ β (DP : DO) + ↓ (PBO) + ↓ (PDO).

OP : OA :: P : $\sqrt[4]{\frac{q}{e}}$; $\textcircled{2}=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{e^3}{q^3}}\times-\beta$ (BP : BO)
+ β (DP : DO) + ↓ (PBO) + ↓ (PDO).

2. Cas.

OP : OA :: P : $\sqrt[4]{-l}$; $\odot=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-1}{l^3}}\times-\beta$ (BP : BO).
+ β (DP : DO) + ↓ (PBO) + ↓ (PDO).

OP : OA :: P : $\sqrt[4]{\frac{-p}{e}}$; $\textcircled{1}=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{e^3}{p^3}}\times-$ (AP : AO)
+ (EP : EO) + χ (PCO).

OP : OA :: P : $\sqrt[4]{\frac{-q}{e}}$; $\textcircled{2}=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{e^3}{q^3}}\times-$ (AP : AO)
+ (EP : EO) + χ (PCO).

θ. FORME LXXXI. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[n]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 2. Cas.

&c.

2. $\frac{4}{ng}DP+\frac{-g,\overline{fl-gk}}{2ng^s}D\times\textcircled{1}+\textcircled{2}-M;+\frac{+g,\overline{fl-gk}}{2ng^s}D\times\textcircled{3}+\textcircled{4}-N.$

Voyez fig. 30.

1. $\frac{gl}{2ns}D\times\textcircled{1}+\textcircled{2}-M;+\frac{-gl}{2ns}D\times\textcircled{3}+\textcircled{4}-N.$

0. $\frac{-4k}{ne}D\odot+\frac{-gr-as}{2nes}D\times\textcircled{1}+\textcircled{2}-M;+\frac{+gr-as}{2nes}D\times\textcircled{3}+\textcircled{4}-N.$

&c.

$$P=\sqrt[n]{k+lz^n}.\quad q=ell-fkl+gkk.$$

$$r=\sqrt{gq}.\quad s=\sqrt{-fgl+2ggk+2\sqrt{qg^3}}.\quad a=\sqrt[n]{qg^3}.$$

$$b=\sqrt{+\sqrt{-fg^3l+2g^4k+2\sqrt{qg^7}}+2\sqrt[n]{qg^7}}.$$

$$c=\sqrt{-\sqrt{-fg^3l+2g^4k+2\sqrt{qg^7}}+2\sqrt[n]{qg^7}}.$$

$$M=\tfrac{1}{c}(a+cP+gPP:a-cP+gPP).$$

$$N=\tfrac{1}{b}(a+bP+gPP:a-bP+gPP).$$

1. *Cas.*

$$\left\{\begin{array}{l}
OP : OA :: P : \sqrt[4]{k}; \ldots \ \odot = +\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{1}{k^3}} \times -(AP : AO) \\
\quad + (EP : EO) + \chi(PCO). \\
OP : OA :: \pm\frac{1}{2}c + gP : \sqrt[2]{\frac{1}{4}cc - ag}; \ \textcircled{1} = +\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{\frac{1}{4}cc - ag}} \times \\
\quad (EP : AP). \\
OP : OA :: -\frac{1}{2}c + gP : \sqrt[2]{\frac{1}{4}cc - ag}; \ \textcircled{2} = +\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{\frac{1}{4}cc - ag}} \times \\
\quad (EP : AP). \\
OP : OA :: \pm\frac{1}{2}b + gP : \sqrt[2]{\frac{1}{4}bb - ag}; \ \textcircled{3} = +\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{\frac{1}{4}bb - ag}} \times \\
\quad (EP : AP). \\
OP : OA :: -\frac{1}{2}b + gP : \sqrt[2]{\frac{1}{4}bb - ag}; \ \textcircled{4} = +\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{\frac{1}{4}bb - ag}} \times \\
\quad (EP : AP).
\end{array}\right.$$

2. *Cas.*

$$\left\{\begin{array}{l}
OP : OA :: P : \sqrt[4]{-k}; \ldots \ \odot = -\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-1}{k^3}} \times -\beta(BP : BO) \\
\quad + \beta(DP : DO) + \downarrow(PBO) + \downarrow(PDO). \\
OP : OA :: +\frac{1}{2}c + gP : \sqrt[2]{ag - \frac{1}{4}cc}; \ \textcircled{1} = -\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{ag - \frac{1}{4}cc}} \times \\
\quad \chi(PCO). \\
OP : OA :: -\frac{1}{2}c + gP : \sqrt[2]{ag - \frac{1}{4}cc}; \ \textcircled{2} = -\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{ag - \frac{1}{4}cc}} \times \\
\quad \chi(PCO). \\
OP : OA :: \pm\frac{1}{2}b + gP : \sqrt[2]{ag - \frac{1}{4}bb}; \ \textcircled{3} = -\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{ag - \frac{1}{4}bb}} \times \\
\quad \chi(PCO). \\
OP : OA :: -\frac{1}{2}b + gP : \sqrt[2]{ag - \frac{1}{4}bb}; \ \textcircled{4} = -\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{1}{ag - \frac{1}{4}bb}} \times \\
\quad \chi(PCO).
\end{array}\right.$$

θ	FORME LXXXII. $\frac{Dz^{\frac{1}{4}n+\frac{1}{4}n-1}dz\sqrt[4]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$ 2. Cas.
&c.	
1.	$\frac{4l}{ng}D\odot+\frac{+er+as}{2ngs}Dx①+②-M;+\frac{-er+as}{2ngs}Dx③+④-N.$ Voyez fig. 30.
0.	$\frac{-ek}{2ns}Dx①+②-M;+\frac{ek}{2ns}Dx③+④-N.$
— 1.	$\frac{-4}{ne}DP+\frac{-as-er}{2nes}Dx①+②-M;+\frac{-as+er}{2nes}Dx③+④-N.$
&c.	

$+e,\sqrt{fk-el}$ $\quad -e,\sqrt{fk-el}$

$$P=\sqrt[4]{\frac{k+lz^n}{z^n}}. \quad q=ell-fkl+gkk.$$

$$r=\sqrt{eq}. \quad s=\sqrt{-efk+2eal+2\sqrt{qe^3}}. \quad a=\sqrt[4]{qe^3}.$$

$$b=\sqrt{+\sqrt{-e^3fk+2e^4l+2\sqrt{qe^7}}+2\sqrt[4]{qe^7}}.$$

$$c=\sqrt{-\sqrt{-e^3fk+2e^4l+2\sqrt{qe^7}}+2\sqrt[4]{qe^7}}.$$

$$M=\tfrac{1}{c}(a+cP+ePP:a-cP+ePP).$$

$$N=\tfrac{1}{b}(a+bP+ePP:a-bP+ePP).$$

1. *Cas.*

$$\left\{\begin{array}{l}
OP : OA :: P : \sqrt[4]{l}\,; \ldots \quad \odot = +\tfrac{1}{4}\sqrt[4]{\tfrac{1}{l^3}}\,x - (AP : AO) \\
\qquad + (EP : EO) + \chi(PCO). \\
OP : OA :: +\tfrac{1}{2}c + eP : \sqrt[2]{\tfrac{1}{4}cc - ae}\,; \ \textcircled{1} = +\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{\frac{1}{4}cc - ae}} \times \\
\qquad (EP : AP). \\
OP : OA :: -\tfrac{1}{2}c + eP : \sqrt[2]{\tfrac{1}{4}cc - ae}\,; \ \textcircled{2} = +\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{\frac{1}{4}cc - ae}} \times \\
\qquad (EP : AP). \\
OP : OA :: +\tfrac{1}{2}b + eP : \sqrt[2]{\tfrac{1}{4}bb - ae}\,; \ \textcircled{3} = +\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{\frac{1}{4}bb - ae}} \times \\
\qquad (EP : AP). \\
OP : OA :: -\tfrac{1}{2}b + eP : \sqrt[2]{\tfrac{1}{4}bb - ae}\,; \ \textcircled{4} = +\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{\frac{1}{4}bb - ae}} \times \\
\qquad (EP : AP).
\end{array}\right.$$

2. *Cas.*

$$\left\{\begin{array}{l}
OP : OA :: P : \sqrt[4]{-l}\,; \ldots \quad \odot = -\tfrac{1}{4}\sqrt[4]{\tfrac{-1}{l^3}}\,x - \beta(BP : BO) \\
\qquad + \beta(DP : DO) + \downarrow(PBO) + \downarrow(PDO). \\
OP : OA :: +\tfrac{1}{2}c + eP : \sqrt[2]{ae - \tfrac{1}{4}cc}\,; \ \textcircled{1} = -\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{ae - \frac{1}{4}cc}} \times \\
\qquad \chi(PCO). \\
OP : OA :: -\tfrac{1}{2}c + eP : \sqrt[2]{ae - \tfrac{1}{4}cc}\,; \ \textcircled{2} = -\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{ae - \frac{1}{4}cc}} \times \\
\qquad \chi(PCO). \\
OP : OA :: +\tfrac{1}{2}b + eP : \sqrt[2]{ae - \tfrac{1}{4}bb}\,; \ \textcircled{3} = -\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{ae - \frac{1}{4}bb}} \times \\
\qquad \chi(PCO). \\
OP : OA :: -\tfrac{1}{2}b + eP : \sqrt[2]{ae - \tfrac{1}{4}bb}\,; \ \textcircled{4} = -\tfrac{1}{2}\sqrt[2]{\tfrac{1}{ae - \frac{1}{4}bb}} \times \\
\qquad \chi(PCO).
\end{array}\right.$$

θ	FORME LXXXIII. $Dz^{n-1}dz\sqrt[2]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}$
&c.	$+eh$
2.	$\frac{-3fg+2fhz^n\times\overline{g+hz^n}}{4nfhh}DP+\frac{-eh}{\frac{-3fg\times\overline{eh-fg}}{4nfh^3}}D①.$
1.	$+\frac{g+hz^n}{nh}DP+\frac{eh-fg}{nhh}D①.$
0.	$+\frac{2f}{nh}D①-\frac{2e}{ng}D②.$ Voyez fig. 28.
— 1.	$-\frac{+g+hz^n}{ngz^n}DP-\frac{+fg-eh}{ngg}D②.$
— 2.	$\frac{-fgz^n}{\frac{-2eg+3ehz^n\times\overline{g+hz^n}}{4neggz^{2n}}}DP+\frac{+fg}{+3eh\times\overline{fg-eh}}{4neg^3}D②.$
&c.	

$$P=\sqrt[2]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}.$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{f}{h}};\ ①=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{h}{f}}\times-(AP:AO) \\ \quad +(CP:CO). \\ OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{e}{g}};\ ②=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{g}{e}}\times-(AP:AO) \\ \quad +(CP:CO). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{-f}{h}};\ ①=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-h}{f}}\times\downarrow(PBO). \\ OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{-e}{g}};\ ②=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-g}{e}}\times\downarrow(PBO). \end{cases}$$

FORME

θ	FORME LXXXIV. $Dz^{n-1}dz\sqrt[3]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}$
&c.	$+eh$
2.	$\frac{-4fg+3fhz^n\times\overline{g+hz^n}}{6nfhh}DP+\frac{\overline{-eh}\times\overline{-2fg\times\overline{eh-fg}}}{3nfh^3}D①.$
1.	$+\frac{g+hz^n}{nh}DP+\frac{eh-fg}{nhh}D①.$
0.	$+\frac{3f}{nh}D①-\frac{3e}{ng}D②.$ Voyez fig. 29.
1.	$-\frac{+g+hz^n}{ngz^n}DP-\frac{+fg-eh}{ngg}D②.$
2.	$\frac{-3eg+4ehz^n\times\overline{g+hz^n}}{6negg\overline{z^n}^2}DP+\frac{+fg\times\overline{+2eh\times\overline{fg-eh}}}{3neg^3}D②.$
&c.	

$$P=\sqrt[3]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}.$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{f}{h}};\ ①=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{hh}{ff}}\times-(AP:AO)\\ \quad+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO).\\ OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{e}{g}};\ ②=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{gg}{ee}}\times-(AP:AO)\\ \quad+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{-f}{h}};\ ①=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{hh}{ff}}\times-\beta(BP:BO)\\ \quad+(DP:DO)+\downarrow(PBO).\\ OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{-e}{g}};\ ②=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{gg}{ee}}\times-\beta(BP:BO)\\ \quad+(DP:DO)+\downarrow(PBO). \end{cases}$$

θ	FORME LXXXV. $Dz^{\frac{1}{n}-1}dz\sqrt[4]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}$
&c.	$+eh$ $\quad -3eh$
2.	$\frac{-5fg+4fhz^n\times\overline{g+hz^n}}{8nfhh}DP+\frac{-5fg\times\overline{eh-fg}}{8nfh^3}D①.$
1.	$+\frac{g+hz^n}{nh}DP+\frac{eh-fg}{nhh}D①.$
0.	$+\frac{4f}{nh}D①-\frac{4e}{ng}D②.$ Voyez fig. 30.
— 1.	$-\frac{+g+hz^n}{ngz^n}DP-\frac{+fg-eh}{ngg}D②.$
— 2.	$\frac{-fgz^n}{-4eg+5ehz^n\times\overline{g+hz^n}}DP+\frac{+3fg}{+5eh\times\overline{fg-eh}}D②.$
&c.	$8neggz^{2n}$ $\quad 8neg^3$

$$P=\sqrt[4]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}.$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{f}{h}};\ ①=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{h^3}{f^3}}\times-(AP:AO)\\ \quad+(EP:EO)+\chi(PCO).\\ OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{e}{g}};\ ②=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{g^3}{e^3}}\times-(AP:AO)\\ \quad+(EP:EO)+\chi(PCO). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{-f}{h}};\ ①=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-h^3}{f^3}}\times-\beta(BP:BO)\\ \quad+\beta(DP:DO)+\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO).\\ OP:OA::P:\sqrt[4]{\frac{-e}{g}};\ ②=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-g^3}{e^3}}\times-\beta(BP:BO)\\ \quad+(DP:DO)+\frac{1}{g}\downarrow(PBO)+\downarrow(PDO). \end{cases}$$

θ	FORME LXXXVI. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{k+lz^n}\sqrt[2]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}$
&c.	
2.	$+\frac{g+hz^n}{nhl}DP+\frac{2kp}{nllq}D①+\frac{ehl-fgl-2fhk}{nhhll}D②.$
1.	$\frac{-2p}{nlq}D①+\frac{2f}{nhl}D②.$
	Voyez fig. 28.
0.	$\frac{+2p}{nkq}D①-\frac{2e}{ngk}D③.$
1.	$-\frac{+g+hz^n}{ngkz^n}DP-\frac{2lp}{nkkq}D①+\frac{ehk-fgk+2egl}{nggkk}D③.$
&c.	

$$P=\sqrt[2]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}.\quad p=el-fk.\quad q=hk-gl.$$

1. *Cas.*

$OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{p}{q}}$; $①=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{q}{p}}\times\downarrow(PBO)$.

$OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{f}{h}}$; $②=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{h}{f}}\times-(AP:AO)+(CP:CO)$.

$OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{e}{g}}$; $③=+\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{g}{e}}\times-(AP:AO)+(CP:CO)$,

2. *Cas.*

$OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{-p}{q}}$; $①=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-q}{p}}\times-(AP:AO)+(CP:CO)$.

$OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{-f}{h}}$; $②=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-h}{f}}\times\downarrow(PBO)$.

$OP:OA::P:\sqrt[2]{\frac{-e}{g}}$; $③=-\frac{1}{2}\sqrt[2]{\frac{-g}{e}}\times\downarrow(PBO)$.

θ	FORME LXXXVII. $\frac{Dz^{n-1}dz}{k+lz^n}\sqrt[3]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}$
&c.	
2.	$+\frac{g+hz^n}{nhl}DP+\frac{3kp}{nllq}D①+\frac{ehl-fgl-3fhk}{nhhll}D②.$
1.	$\frac{-3p}{nlq}D①+\frac{3f}{nhl}D②.$
	Voyez fig. 29.
0.	$\frac{+3p}{nkq}D①-\frac{3e}{ngk}D③.$
— 1.	$-\frac{+g+hz^n}{ngkz^n}DP-\frac{3lp}{nkkq}D①+\frac{ehk-fgk+3egl}{nggkk}D③.$
&c.	

$$P=\sqrt[3]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}.\quad p=el-fk.\quad q=hk-gl.$$

1. *Cas.*

$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{p}{q}}; & ①=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{qq}{pp}}\,x-\beta(BP:BO)\\ & \quad+(DP:DO)+\downarrow(PBO).\\ OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{f}{h}}; & ②=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{hh}{ff}}\,x-(AP:AO)\\ & \quad+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO).\\ OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{e}{g}}; & ③=+\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{ee}{ee}}\,x-(AP:AO)\\ & \quad+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO). \end{cases}$$

2. *Cas.*

$$\begin{cases} OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{-p}{q}}; & ①=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{qq}{pp}}\,x-(AP:AO)\\ & \quad+\beta(CP:CO)+\downarrow(PCO).\\ OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{-f}{h}}; & ②=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{hh}{ff}}\,x-\beta(BP:BO)\\ & \quad+(DP:DO)+\downarrow(PBO).\\ OP:OA::P:\sqrt[3]{\frac{-e}{g}}; & ③=-\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{gg}{ee}}\,x-\beta(BP:BO)\\ & \quad+(DP:DO)+\downarrow(PBO). \end{cases}$$

θ	FORME LXXXVIII. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{k+lz^n}\sqrt[4]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}$
&c.	
2.	$+\frac{g+hz^n}{nhl}\mathrm{D\,P}+\frac{4kp}{nllq}\mathrm{D}①+\frac{ehl-fgl-4fhk}{nhhll}\mathrm{D}②.$
1.	$\frac{-4p}{nlq}\mathrm{D}①+\frac{4f}{nhl}\mathrm{D}②.$
	Voyez fig. 30.
0.	$\frac{+4p}{nkq}\mathrm{D}①-\frac{4e}{ngk}\mathrm{D}③.$
$-$ 1.	$-\frac{+g+hz^n}{ngkz^n}\mathrm{D\,P}-\frac{4lp}{nkkq}\mathrm{D}①+\frac{ehk-fgk+4egl}{nggkk}\mathrm{D}③.$
&c.	

$$\mathrm{P}=\sqrt[4]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}.\quad p=el-fk.\quad q=hk-gl.$$

1. *Cas.*

$\mathrm{OP}:\mathrm{OA}::\mathrm{P}:\sqrt[4]{\frac{p}{q}}$; ① $=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{q^3}{p^3}}\times-\beta(\mathrm{BP}:\mathrm{BO})+\beta(\mathrm{DP}:\mathrm{DO})+\downarrow(\mathrm{PBO})+\downarrow(\mathrm{PDO})$.

$\mathrm{OP}:\mathrm{OA}::\mathrm{P}:\sqrt[4]{\frac{f}{h}}$; ② $=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{h^3}{f^3}}\times-(\mathrm{AP}:\mathrm{AO})+(\mathrm{EP}:\mathrm{EO})+\chi(\mathrm{PCO})$.

$\mathrm{OP}:\mathrm{OA}::\mathrm{P}:\sqrt[4]{\frac{e}{g}}$; ③ $=+\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{g^3}{e^3}}\times-(\mathrm{AP}:\mathrm{AO})+(\mathrm{EP}:\mathrm{EO})+\chi(\mathrm{PCO})$.

2. *Cas.*

$\mathrm{OP}:\mathrm{OA}::\mathrm{P}:\sqrt[4]{\frac{-p}{q}}$; ① $=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-q^3}{p^3}}\times-(\mathrm{AP}:\mathrm{AO})+(\mathrm{EP}:\mathrm{EO})+\chi(\mathrm{PCO})$.

$\mathrm{OP}:\mathrm{OA}::\mathrm{P}:\sqrt[4]{\frac{-f}{h}}$; ② $=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-h^3}{f^3}}\times-\beta(\mathrm{BP}:\mathrm{BO})+\beta(\mathrm{DP}:\mathrm{DO})+\downarrow(\mathrm{PBO})+\downarrow(\mathrm{PDO})$.

$\mathrm{OP}:\mathrm{OA}::\mathrm{P}:\sqrt[4]{\frac{-e}{g}}$; ③ $=-\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{-g^3}{e^3}}\times-\beta(\mathrm{BP}:\mathrm{BO})+\beta(\mathrm{DP}:\mathrm{DO})+\downarrow(\mathrm{PBO})+\downarrow(\mathrm{PDO})$.

θ	FORME LXXXIX. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}$
&c.	
3.	$\frac{-3f+2gz^n}{4ngg}DP+\frac{3ff-4eg}{8ngg}D①.$
2.	$\frac{+1}{ng}DP-\frac{f}{2ng}D①.$
1.	$\frac{+1}{n}D①.$ Voyez fig. 28.
0.	$\frac{-1}{n}D②.$
— 1.	$\frac{-1}{ncz^n}DP+\frac{f}{2ne}D②.$
— 2.	$\frac{-2e+3fz^n}{4nccz^{2n}}DP+\frac{4eg-3ff}{8nee}D②.$
&c.	

$$P=\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}.$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::\frac{\frac{1}{2}f+gz^n}{P}:\sqrt{g}; & ①=+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{g}}\times(CP:AP). \\ OP:OA::\frac{e+\frac{1}{2}fz^n}{P}:\sqrt{e}; & ②=+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{e}}\times(CP:AP). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::\frac{\frac{1}{2}f+gz^n}{P}:\sqrt{-g}; & ①=-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{-1}{g}}\times\downarrow(PBO). \\ OP:OA::\frac{e+\frac{1}{2}fz^n}{P};\sqrt{-e}; & ②=-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{-1}{e}}\times\downarrow(PBO). \end{cases}$$

FORME XC. $Dz^{\theta n-1}dz\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}$.

θ	
&c.	$+8eg$
2.	$\frac{-3ff+2fgz^n+8ggz^{2n}}{24ngg}DP+\frac{f^3-4efg}{16ngg}D①.$
1.	$\frac{f+2gz^n}{4ng}DP+\frac{4eg-ff}{8ng}D①.$
0.	$\frac{+1}{n}DP+\frac{f}{2n}D①-\frac{e}{n}D②.$ Voyez fig. 28.
— 1.	$\frac{-1}{nz^n}DP-\frac{f}{2n}D②+\frac{g}{n}D①.$
— 2.	$\frac{-2e-fz^n}{4nez^{2n}}DP+\frac{ff-4eg}{8ne}D②.$
— 3.	$\frac{+8egz^{2n}-8ee-2efz^n+3ffz^{2n}}{24neez^{3n}}DP+\frac{4efg-f^3}{16nee}D②.$
&c.	

$$P=\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}.$$

1. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::\frac{\frac{1}{2}f+gz^n}{P}:\sqrt{g}; & ①=+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{g}}\times(CP:AP). \\ OP:OA::\frac{e+\frac{1}{2}fz^n}{P}:\sqrt{e}; & ②=+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{e}}\times(CP:AP). \end{cases}$$

2. *Cas.*
$$\begin{cases} OP:OA::\frac{\frac{1}{2}f+gz^n}{P}:\sqrt{-g}; & ①=-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{-1}{g}}\times\downarrow(PBO) \\ OP:OA::\frac{e+\frac{1}{2}fz^n}{P}:\sqrt{-e}; & ②=-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{-1}{e}}\times\downarrow(PBO). \end{cases}$$

θ	FORME XCI. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{k+lz^n\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}$
&c.	
3.	$\frac{+1}{ngl}$ D P $-\frac{kk}{nll}$ D① $+\frac{-fl-2gk}{2ngll}$ D②.
2.	$\frac{+k}{nl}$ D ① $+\frac{1}{nl}$ D②.
1.	$\frac{-1}{n}$ D①. Voyez fig. 28.
0.	$\frac{+l}{nk}$ D ① $-\frac{1}{nk}$ D③.
$\frac{-}{1}$.	$\frac{-1}{nekz^n}$ D P $-\frac{ll}{nkk}$ D ① $+\frac{fk+2el}{2nekk}$ D③.
&c.	

$P = \sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}$. $p = ell - fkl + gkk$.

1. *Cas.*

$$\begin{cases} OP : OA :: \dfrac{l, \overline{e+\frac{1}{2}fz^n} - k, \overline{\frac{1}{2}f+gz^n}}{P} : \sqrt{p}; \\ \qquad ① = {}^{+\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{1}{p}} \times (CP : AP). \\ OP : OA :: \dfrac{\frac{1}{2}f+gz^n}{P} : \sqrt{g}; \quad ② = {}^{+\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{1}{g}} \times (CP : AP). \\ OP : OA :: \dfrac{e+\frac{1}{2}fz^n}{P} : \sqrt{e}; \quad ③ = {}^{+\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{1}{e}} \times (CP : AP). \end{cases}$$

2. *Cas.*

$$\begin{cases} OP : OA :: \dfrac{l, \overline{e+\frac{1}{2}fz^n} - k, \overline{\frac{1}{2}f+gz^n}}{P} : \sqrt{-p}; \\ \qquad ① = {}^{-\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{-1}{p}} \times \downarrow(PBO). \\ OP : OA :: \dfrac{\frac{1}{2}f+gz^n}{P} : \sqrt{-g}; \quad ② = {}^{-\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{-1}{g}} \times \downarrow(PBO). \\ OP : OA :: \dfrac{e+\frac{1}{2}fz^n}{P} : \sqrt{-e}; \quad ③ = {}^{-\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{-1}{e}} \times \downarrow(PBO). \end{cases}$$

FORME

θ	FORME XCII. $\frac{Dz^{\theta n-1}\,dz\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}{k+lz^n}$
&c.	$+fl$ $\quad -ffll-4fgkl$
2.	$\frac{-4gk+2glz^n}{4ngll}DP+\frac{kp}{nl^3}D①+\frac{+4egll+8ggkk}{8ngl^3}D②.$
1.	$\frac{+1}{nl}DP-\frac{p}{nll}D①+\frac{fl-2gk}{2nll}D②.$
0.	$\frac{+p}{nkl}D①+\frac{g}{nl}D②-\frac{e}{nk}D③.$ Voyez fig. 28.
1.	$\frac{-1}{nkz^n}DP-\frac{p}{nkk}D①+\frac{2el-fk}{2nkk}D③.$
2.	$\frac{-2ek+4elz^n-fkz^n}{4nekkz^{2n}}DP+\frac{lp}{nk^3}D①+\frac{+ffkk+4efkl-4egkk-8eell}{8nek^3}D③.$
&c.	

$P=\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}.\quad p=ell-fkl+gkk.$

1. *Cas.*

$OP:OA::\frac{l,\overline{e+\frac{1}{2}fz^n}-k,\overline{\frac{1}{2}f+gz^n}}{P}:\sqrt{p};$

$①=+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{p}}\times(CP:AP).$

$OP:OA::\frac{\frac{1}{2}f+gz^n}{P}:\sqrt{g};\quad ②=+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{g}}\times(CP:AP).$

$OP:OA::\frac{e+\frac{1}{2}fz^n}{P}:\sqrt{e};\quad ③=+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{e}}\times(CP:AP).$

2. *Cas.*

$OP:OA::\frac{l,\overline{e+\frac{1}{2}fz^n}-k,\overline{\frac{1}{2}f+gz^n}}{P}:\sqrt{-p};$

$①=-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{-1}{p}}\times\downarrow(PBO).$

$OP:OA::\frac{\frac{1}{2}f+gz^n}{P}:\sqrt{-g};\quad ②=-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{-1}{g}}\times\downarrow(PF$

$OP:OA::\frac{e+\frac{1}{2}fz^n}{P}:\sqrt{-e};\quad ③=-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{-1}{e}}\times\downarrow(P$

θ	FORME XCIII. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{k+lz^n+mz^{2n}\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}$
&c.	
3.	$\frac{pp}{nam}D①-\frac{qq}{nam}D②+\frac{1}{nm}D③.$
2.	$\frac{-p}{na}D①+\frac{q}{na}D②.$ Voyez fig. 28.
1.	$\frac{m}{na}D①-\frac{m}{na}D②.$
0.	$\frac{-mm}{nap}D①+\frac{mm}{naq}D②-\frac{1}{nk}D④.$
&c.	

$a=\sqrt{ll-4km}$. $p=\frac{1}{2}l+\frac{1}{2}a$. $q=\frac{1}{2}l-\frac{1}{2}a$. $P=\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}$.

$r=emm-fmp+gpp$. $s=emm-fmq+gqq$.

1. *Cas.*

$$\left\{\begin{array}{l} OP:OA::\frac{m,\overline{e+\frac{1}{2}fz^n}-p,\overline{\frac{1}{2}f+gz^n}}{P}:\sqrt{r}; \\ \quad ①=\pm\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{r}}\times(CP:AP). \\ OP:OA::\frac{m,\overline{e+\frac{1}{2}fz^n}-q,\overline{\frac{1}{2}f+gz^n}}{P}:\sqrt{s}; \\ \quad ②=\pm\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{s}}\times(CP:AP). \\ OP:OA::\frac{\frac{1}{2}f+gz^n}{P}:\sqrt{g}; \quad ③=\pm\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{g}}\times(CP:AP). \\ OP:OA::\frac{e+\frac{1}{2}fz^n}{P}:\sqrt{e}; \quad ④=\pm\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{e}}\times(CP:AP). \end{array}\right.$$

θ	FORME XCIV. $\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}{k+lz^n+mz^{2n}}$
&c.	
2.	$\frac{1}{nm}DP-\frac{pr}{namm}D①+\frac{qs}{namm}D②+\frac{fm-2gl}{2nmm}D③.$
1.	$\frac{r}{nam}D①-\frac{s}{nam}D②+\frac{g}{nm}D③.$
	Voyez fig. 28.
0.	$\frac{-r}{nap}D①+\frac{s}{naq}D②-\frac{e}{nk}D④.$
— 1.	$\frac{-1}{nkz^n}DP+\frac{rm}{napp}D①-\frac{sm}{naqq}D②+\frac{2el-fk}{2nkk}D④.$
&c.	

Les valeurs des quantités a, p, q; P, r, s, ſe trouvent dans la page précédente.

2. *Cas.*

$$OP:OA::\frac{m,\overline{e+\frac{1}{2}fz^n}-p,\overline{\frac{1}{2}f+gz^n}}{P}:\sqrt{-r};$$

$$①=-\tfrac{1}{2}\sqrt{\frac{-1}{r}}\times\downarrow(PBO).$$

$$OP:OA::\frac{m,\overline{e+\frac{1}{2}fz^n}-q,\overline{\frac{1}{2}f+gz^n}}{P}:\sqrt{-s};$$

$$②=-\tfrac{1}{2}\sqrt{\frac{-1}{s}}\times\downarrow(PBO).$$

$$OP:OA::\frac{\frac{1}{2}f+gz^n}{P}:\sqrt{-g};\quad ③=-\tfrac{1}{2}\sqrt{\frac{-1}{g}}\times\downarrow(PBO).$$

$$OP:OA::\frac{e+\frac{1}{2}fz^n}{P}:\sqrt{-e};\quad ④=-\tfrac{1}{2}\sqrt{\frac{-1}{e}}\times\downarrow(PBO).$$

TABLE DES FORMES.

PREMIERE SUITE.

Formes				Pag.
1.	2.	$\frac{Dz^{n}-1dz}{e+fz^{n}}$	$\frac{Dz^{n+\frac{1}{2}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	302
3.	4.	$\frac{Dz^{n+\frac{1}{3}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	$\frac{Dz^{n+\frac{2}{3}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	304
5.	6.	$\frac{Dz^{n+\frac{1}{4}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	$\frac{Dz^{n+\frac{3}{4}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	306
7.	8.	$\frac{Dz^{n+\frac{1}{5}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	$\frac{Dz^{n+\frac{4}{5}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	308
9.	10.	$\frac{Dz^{n+\frac{2}{5}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	$\frac{Dz^{n+\frac{3}{5}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	310
11.	12.	$\frac{Dz^{n+\frac{1}{6}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	$\frac{Dz^{n+\frac{5}{6}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	312
13.	14.	$\frac{Dz^{n+\frac{1}{7}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	$\frac{Dz^{n+\frac{6}{7}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	314
15.	16.	$\frac{Dz^{n+\frac{2}{7}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	$\frac{Dz^{n+\frac{5}{7}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	316
17.	18.	$\frac{Dz^{n+\frac{3}{7}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	$\frac{Dz^{n+\frac{4}{7}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	318
19.	20.	$\frac{Dz^{n+\frac{1}{8}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	$\frac{Dz^{n+\frac{7}{8}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	320
21.	22.	$\frac{Dz^{n+\frac{3}{8}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	$\frac{Dz^{n+\frac{5}{8}n}-1dz}{e+fz^{n}}$	322

SECONDE SUITE.

Formes		Pag.
23. 24.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n \times g+hz^n}$ $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n \times g+hz^n}$	324
25. 26.	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n \times g+hz^n}$ $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n \times g+hz^n}$	326
27. 28.	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n \times g+hz^n}$ $\frac{Dz^{\theta n+\frac{3}{4}n-1}dz}{e+fz^n \times g+hz^n}$	328

TROISIE'ME SUITE.

29. 30.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$	331
31. 32.	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$	217 & 334
33. 34.	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$ $\frac{Dz^{\theta n+\frac{3}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}}$	336

QUATRIE'ME SUITE.

35. 36.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n} \times k+lz^n}$ $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n} \times k+lz^n}$	341
37. 38.	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n} \times k+lz^n}$ $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n} \times k+lz^n}$	221 & 344
39. 40.	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n} \times k+lz^n}$ $\frac{Dz^{\theta n+\frac{3}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n} \times k+lz^n}$	346

CINQUIE'ME SUITE.

41. 42.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$ $\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$	350
43. 44.	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$ $\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$	236 & 354

Formes			Pag.
45. 46.	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{3}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}+hz^{3n}}$	356

SIXIEME SUITE.

47. 48.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\sqrt{e+fz^n}}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{\sqrt{e+fz^n}}$	360
49. 50.	$Dz^{\theta n-1}dz\sqrt{e+fz^n}$	$Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz\sqrt{e+fz^n}$	362
51. 52.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\sqrt[3]{e+fz^n}}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{\sqrt[3]{e+fz^n}}$	364
53. 54.	$Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[3]{e+fz^n}$	$Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz\sqrt[3]{e+fz^n}$	366
55. 56.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\sqrt[4]{e+fz^n}}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{\sqrt[4]{e+fz^n}}$	368
57. 58.	$Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[4]{e+fz^n}$	$Dz^{\theta n+\frac{3}{4}n-1}dz\sqrt[4]{e+fz^n}$	370

SEPTIEME SUITE.

59. 60.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{g+hz^n\sqrt{e+fz^n}}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{g+hz^n\sqrt{e+fz^n}}$	372
61. 62.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt{e+fz^n}}{g+hz^n}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz\sqrt{e+fz^n}}{g+hz^n}$	374
63. 64.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{g+hz^n\sqrt[3]{e+fz^n}}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{g+hz^n\sqrt[3]{e+fz^n}}$	376
65. 66.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[3]{e+fz^n}}{g+hz^n}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz\sqrt[3]{e+fz^n}}{g+hz^n}$	378
67. 68.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{g+hz^n\sqrt[4]{e+fz^n}}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{g+hz^n\sqrt[4]{e+fz^n}}$	380
69. 70.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[4]{e+fz^n}}{g+hz^n}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz\sqrt[4]{e+fz^n}}{g+hz^n}$	382

HUITIEME SUITE.

Formes			Pag.
71. 72.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt{k+lz^n}}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt{k+lz^n}}$	384
73. 74.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{2}n-1}dz\sqrt{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$	388
75. 76.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[3]{k+lz^n}}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{3}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[3]{k+lz^n}}$	225 & 392
77. 78.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[3]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{2}{3}n-1}dz\sqrt[3]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$	227, 394
79. 80.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[4]{k+lz^n}}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{1}{4}n-1}dz}{e+fz^n+gz^{2n}\sqrt[4]{k+lz^n}}$	396
81. 82.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[4]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$	$\frac{Dz^{\theta n+\frac{3}{4}n-1}dz\sqrt[4]{k+lz^n}}{e+fz^n+gz^{2n}}$	402

NEUVIEME ET DIXIEME SUITE.

83. 84.	$Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[2]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}$	$Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[3]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}$	408
85. 86.	$Dz^{\theta n-1}dz\sqrt[4]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}$	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{k+lz^n}\sqrt[2]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}$	410
87. 88.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{k+lz^n}\sqrt[3]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}$	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{k+lz^n}\sqrt[4]{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}$	412

DERNIERE SUITE.

89. 90.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}$	$Dz^{\theta n-1}dz\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}$	414
91. 92.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{k+lz^n\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}$	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}{k+lz^n}$	416
93. 94.	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz}{k+lz^n+mz^{2n}\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}$	$\frac{Dz^{\theta n-1}dz\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}{k+lz^n+mz^{2n}}$	418

AVERTISSEMENT.

PLUSIEURS perſonnes m'ayant demandé le Mémoire ſur la Théorie des Cométes que je préſentai à l'Académie des Sciences en 1747, j'ai cru qu'il ſeroit à propos de le joindre ici : J'y ai ajouté les Elémens de l'orbite décrite par la Cométe qui a parue depuis en 1748.

LA

LA THÉORIE DU MOUVEMENT DES COMÉTES.

LE mouvement des Cométes, qui parut ſi ſurprenant & ſi irrégulier aux Anciens, a été déterminé & fixé dans le dernier ſiécle par M. NEWTON. Ce célébre Géométre ayant développé le vrai principe qui fait le reſſort de la Nature & modére tous les mouvemens céleſtes, a démontré que toutes les Planétes & Cométes décrivent des ſections coniques dont le Soleil occupe le foyer commun, & comme il eſt très-vraiſemblable que les Cométes ont leurs temps périodiques de même que les Planetes, il s'enſuit que leurs orbites ſont des Ellipſes très-excentriques, dont les petites portions que nous leur voyons décrire ne différent pas ſenſiblement d'arcs de Paraboles. Par ce moyen il a ouvert le chemin pour aſſujettir à la Géométrie & au calcul ces mouvemens qui paroiſſoient auparavant n'être réglés par aucune loi conſtante. La vérité de cette théorie fut premiérement confirmée par la Cométe de l'année

1680. dont il détermina lui-même l'orbite, & enſuite par les orbites de toutes les Cométes qui ont été obſervées, leſquelles ayant été calculées par pluſieurs Aſtronomes, on a toujours trouvé les réſultats entiérement d'accord avec les obſervations. La méthode Trigonométrique dont je me ſers pour déterminer la grandeur & la poſition de ces Trajectoires par rapport à l'Ecliptique eſt fondée ſur des fauſſes poſitions par leſquelles on commence le calcul, mais qu'enſuite on réduit aux véritables par une régle très-ſimple.

Comme les ſuppoſitions qu'on eſt obligé de faire regardent les diſtances de la Cométe au Soleil, il ſeroit à propos de connoître à peu-près ces diſtances : pour cet effet on peut ſe ſervir du Problême LVI. de l'Arithmétique univerſelle de M. NEWTON, par lequel au moyen de quatre obſervations on trouvera la diſtance de la Cométe au Soleil pour un temps donné ; j'employai cette méthode pour la Cométe de 1706 ; mais on peut ſe diſpenſer de ce calcul qui eſt aſſez pénible, parce qu'il ſera facile de corriger les diſtances qu'on n'aura priſes que par conjecture, comme on verra ci-après.

Pour faire mieux comprendre la théorie, & faciliter davantage le calcul du mouvement des Cométes, il eſt à propos de mettre ici quelques propoſitions.

PROPOSITION I.

SI d'un point quelconque pris dans le périmétre d'une parabole on tire une ligne au foyer de cette parabole, on aura cette proportion : comme le quarré du rayon eſt au quarré du ſinus de la moitié du ſupplement de l'angle qui s'étend depuis le ſommet de la parabole, ainſi la ligne tirée eſt à la quatriéme partie du paramétre.

DEMONSTRATION.

SOIT donnée une parabole AOP (*fig.* 59.) qui ait pour axe la ligne AS, le ſommet en A, & le foyer en S; qu'on prenne dans le périmétre un point P & qu'on tire PS; enſuite qu'on tire par le point P une tangente PM qui rencontre l'axe prolongé en M, & du foyer S une perpendiculaire SN à la tangente, & du point N une perpendiculaire NA à l'axe. Maintenant par la propriété de la parabole SM eſt égale à SP, par conſéquent SN coupe en deux également l'angle ASP, & l'angle ANS eſt égal à l'angle NPS; on ſçait encore que la perpendiculaire NA doit tomber ſur le ſommet A; ainſi nommant R le rayon, & S le ſinus de l'angle SPN qui eſt la moitié du ſupplement de l'angle ASP, on aura dans le triangle SPN, R . S :: SP . SN, & dans le triangle ANS, R . S :: SN . AS: donc en multipliant ces deux proportions on trouve, RR . SS :: SP . AS. *C. Q. F. D.*

REMARQUE.

COMME dans les tables que M. HALLEY a dreſſées pour calculer le mouvement des Cométes, les différences des logarithmes qui expriment les diſtances de la Cométe au Soleil ſont fort conſidérables, & ne croiſſent pas uniformement, ſi on veut avoir plus exactement les diſtances intermédiaires, on les trouvera par cette propoſition : pareillement la diſtance SP & l'angle ASP étant connus, on trouvera la diſtance périhelie AS.

PROPOSITION II.

LES temps qu'employent deux corps à parcourir des angles égaux dans deux paraboles quelconques, ſont comme les racines quarrées des cubes des paramétres.

DEMONSTRATION.

DANS les paraboles égales les aires décrites ſont proportionnelles aux temps, & dans différentes paraboles, les temps étant égaux, les aires ſont comme les racines quarrées des paramétres (*par la prop. 14. du 1. livre des Principes de M. Newton*) : donc ſi on ſuppoſe les paraboles différentes & les temps inégaux, les aires décrites ſeront en raiſon compoſée des temps & des racines quarrées des paramétres ; ainſi en nommant A & *a* les aires, T & *t* les temps, P & *p* les paramétres, on aura, $A . a :: T\sqrt{P} . t\sqrt{p}$: mais parce que les paraboles ſont des courbes ſem-

blables, & que les angles ſont ſuppoſés égaux, on a, A . a :: PP . pp ; donc T$\sqrt{}$P . $t\sqrt{}p$ :: PP . pp, d'où l'on tire T . t :: $P^{\frac{1}{2}}$. $p^{\frac{1}{2}}$. *C. Q. F. D.*

COROLLAIRE.

Il ſuit de cette propoſition qu'ayant une table telle que celle qui a été conſtruite par M. HALLEY, dans laquelle ſe trouvent calculés pour une parabole donnée les angles formés par l'axe & les lignes tirées du foyer à la parabole, au côté deſquels ſoient marqués les temps qui y répondent, on peut facilement trouver le temps qu'une Cométe employeroit à décrire un angle quelconque dans toute autre parabole; ou, le temps étant donné on peut trouver l'angle : car le moyen mouvement marqué dans la table pouvant être regardé comme la meſure du temps, on n'a qu'à le réduire en jours réels, ce qui eſt facile puiſque l'on ſçait que 100 parties de ce mouvement répondent à 109, 6154 jours réels, & enſuite ſe ſervir de la proportion marquée ci-deſſus.

Par exemple. Le 25 Février 1744 à 5^{h}. $35\frac{1}{2}'$ temps moyen à Paris, la Cométe étant éloignée de ſon périhelie de $56°$. $28'$. $6''$, on demande le temps qu'elle doit employer pour parcourir cet angle ; pour le trouver, il faut prendre dans la table le temps ou le moyen mouvement qui y répond, on le trouve de 44, 144 dont le logarithme eſt 1, 644871, auquel ajoutant le logarithme 0, 039872, on aura 1, 684743 pour le logarithme des jours réels ; enſuite ſuppoſant la diſtance moyenne de la Terre au

égale à 100000, & par conſéquent ſon logarithme égal à 5, 000000, ôtant 4, 349749 logarithme de la diſtance périhelie de la Cométe du logarithme 5, 000000, & prenant la $\frac{1}{2}$me partie de cette différence, on trouvera 0, 975376, lequel étant ôté du logarithme 1, 684743 laiſſe 0, 709367, pour le logarithme du temps cherché ; ce logarithme répond à 5, 121 jours, qui étant ajoutés au temps de l'obſervation, on aura l'inſtant du périhelie le 1 Mars à 8^{h}. 30′.

PROPOSITION III.

SI dans deux paraboles BDE, ANO (fig. 60.) *qui ont le même axe* BAS *& le même foyer* S, *on prend un angle quelconque* BSD, *& ſi on diviſe les deux aires* BSD *&* ASN *compriſes dans cet angle en un nombre égal de parties ; le nombre de ces parties décrit en temps égaux par deux corps qui ſe meuvent dans ces paraboles eſt en raiſon réciproque des racines quarrées des cubes des paramétres.*

DEMONSTRATION.

SI les parties dont les aires BSD & ASN ſont compoſées, étoient ſuppoſées égales, le nombre des parties parcourues ſeroit comme les racines quarrées des paramétres (*par la prop.* 14. *du* 1. *liv. des Principes de M. Newton.*) : mais puiſque dans la ſuppoſition préſente la grandeur des parties augmente comme les quarrés des paramétres, & qu'ainſi le nombre qui en eſt parcouru diminue dans la même raiſon, on aura en nommant N & *n* les nombres des parties

décrites, & P & p les paramétres, N . n :: $\frac{\sqrt{P}}{PP} \cdot \frac{\sqrt{p}}{pp}$ :: $p^{\frac{1}{2}} \cdot P^{\frac{1}{2}}$. *C. Q. F. D.*

COROLLAIRE.

IL ſuit de cette propoſition que ſi on ſuppoſe un angle BSD de telle grandeur qu'on voudra, par exemple de 90 dégrés, diviſé en un certain nombre de parties comme en 100, & qu'on ait une table dans laquelle on trouve calculé l'angle au foyer qui répond à chacune de ces parties dans une parabole donnée, puiſque les paraboles ſont des figures ſemblables, les mêmes angles dans toutes les paraboles contiendront le même nombre de ces parties; & par conſéquent l'angle étant donné, on trouvera le nombre des parties qu'il contient. De plus comme dans une même parabole les aires parcourues ſont proportionnelles aux temps, & que dans les paraboles différentes en temps égaux elles ſont par cette propoſition en raiſon réciproque des racines quarrées des cubes des paramétres, par la compoſition de ces raiſons, & ſuppoſant le rayon de l'orbite Terreſtre égal à l'unité, nommant L le logarithme du nombre des parties décrites, M le logarithme du nombre des jours écoulés depuis le périhelie, & D le logarithme de la diſtance périhelie, ſçachant auſſi que 0,039872 eſt le logarithme du nombre des parties parcourues dans l'eſpace d'un jour, on tirera la formule ſuivante

$$L = M - 0,039872 \pm \tfrac{1}{2}D.$$

Dans cette formule c'eſt le ſigne + qu'il faut ſuppoſer devant D lorſque la diſtance périhelie eſt moindre que le rayon de l'orbite terreſtre, & le ſigne — lorſqu'elle eſt plus grande.

Par cette formule, des trois termes L, M, D, deux étant donnés, on trouvera facilement le troiſiéme.

Ces préparations étant ſuppoſées, il ſera plus aiſé de calculer les Elémens des orbites paraboliques, & de trouver les lieux des Cométes dans ces orbites pour des temps donnés, en faiſant uſage des tables que M. HALLEY donne dans ſa Cométographie. Pour ce qui regarde les élémens, on pourra les trouver en cette ſorte.

PROBLÊME I.

ETANT données trois obſervations d'une Cométe éloignées d'un aſſez grand intervalle les unes des autres, trouver la grandeur & la poſition de l'orbe parabolique qu'elle décrit.

SOLUTION.

PREMIEREMENT il faut calculer les diſtances accourcies de la Cométe au Soleil, ou les ſuppoſer d'une telle grandeur qu'on voudra pour la premiére & la derniére obſervation; par le moyen de ces diſtances on fera tout le calcul des triangles rectilignes & ſphériques très-connu des Aſtronomes, juſqu'à ce qu'on ait trouvé les diſtances vrayes de la Cométe au Soleil & l'angle compris entre ces diſtances,

tes, d'où par une propriété de la parabole assez connue on déterminera la position de l'axe ; ensuite par la proposition première on trouvera la distance périhelie, & par le Corollaire de la seconde ou celui de la troisiéme le temps que doit employer la Cométe à décrire l'angle compris entre les distances vrayes de la Cométe au Soleil : si le temps trouvé n'est point égal au temps écoulé entre la premiére & la derniére observation, il faut recommencer le calcul en gardant constante une des distances premiérement supposées, & changeant l'autre jusqu'à ce qu'on trouve une parabole qui répond au temps entre les deux observations : lorsqu'on aura rempli cette condition, on poursuivra le calcul jusqu'à ce qu'on ait déterminé tous les élémens de l'orbite ; ensuite on calculera pour le temps de la seconde observation le lieu de la Cométe dans cette orbite, & si le lieu calculé est conforme à l'observation, on a trouvé la véritable orbite, mais s'il y a une différence considérable, il faut

Secondement recommencer le calcul en augmentant ou diminuant de telle grandeur qu'on jugera à propos la distance qu'on avoit gardée constante dans la premiére supposition, (on pourra souvent distinguer s'il faut l'augmenter ou la diminuer,) & en la gardant encore constante on changera l'autre jusqu'à ce qu'on ait trouvé comme ci-dessus une nouvelle orbite, & le lieu de la Cométe dans cette orbite au temps de la seconde observation ; s'il differe encore trop du lieu observé, il faut

Troiſiémement prendre la différence entre les lieux calculés de la Cométe dans les deux ſuppoſitions précédentes, & prendre auſſi la quantité dont on a augmenté ou diminué dans la ſeconde ſuppoſition la diſtance qu'on avoit premiérement ſuppoſée, & enſuite faire cette proportion : comme cette différence eſt à cette quantité, ainſi la différence entre le lieu obſervé & celui des deux lieux calculés qui approche le plus de l'obſervation, eſt à une nouvelle quantité, qu'il faut ajouter ou ſouſtraire de la diſtance ſuppoſée dans le cas où on a le plus approché de l'obſervation, & on aura une nouvelle diſtance qui donnera à peu-près l'orbite cherchée.

Il peut arriver qu'après ce troiſiéme eſſai il reſte quelque légére correction à faire, ce qu'on pourra facilement exécuter par le moyen des ſuppoſitions précédentes.

Exemple de la Cométe de l'année 1707.

AYANT choiſi trois obſervations, dont M. DE LA CAILLE m'a fait l'honneur de me communiquer la premiére ; il l'a tirée par le moyen des interpolations de pluſieurs obſervations faites en Italie pendant que la Cométe étoit proche de l'Eclyptique, & l'a réduit au nœud : le 25 Novembre à 20 ^{h}. 44′. temps moyen à Paris la Cométe étoit dans 4°. 46′. 20″. ♒ ſans latitude. Les deux autres obſervations ſont tirées des Mémoires de l'Académie, ſçavoir le

10. Décembre à 7 h. 13′ T. M. la Cométe étoit dans 8°. 33′. 40″. ♒ avec une latitude Boréale de 39°. 36′; & le 25. Décembre à 7 h. 32′. la Cométe étoit dans 7°. 37′. 40″. ♒ avec une latitude Boréale de 46°. 34′. 20″. Maintenant ſuppoſant le demi-diamétre de l'orbite Terreſtre de 10000 parties, je prends pour la premiére obſervation la diſtance accourcie de la Cométe au Soleil de 8920 que je garde conſtante, tandis que je cherche pour la troiſiéme obſervation une autre diſtance que je trouve après pluſieurs eſſais devoir être de 5748 pour que l'aire décrite par la Cométe ſoit proportionnelle au temps entre les deux obſervations. Ayant donc déterminé dans cette ſuppoſition tous les Elémens de l'orbite, je trouve qu'ils donneroient pour le temps de la ſeconde obſervation la longitude de la Cométe de 8°. 27′. 58″. ♒ avec une latitude Boréale de 37°. 32′. 16″.

Enſuite pour la ſeconde ſuppoſition au lieu de 8920 je prends 9050 pour la diſtance accourcie au temps de la premiére obſervation, & pour avoir une aire proportionnelle au temps je trouve que l'autre diſtance doit être de 5763, & par le moyen de ces nouvelles diſtances ayant déterminé une ſeconde orbite, je trouve qu'elle donne pour le temps de la ſeconde obſervation la longitude de la Cométe de 8°. 31′. 16″. ♒ & ſa latitude Boréale de 39°. 6′. 6″.

Maintenant voyant que le mouvement de la Cométe ſe faiſoit preſque tout en latitude, je me ſers des latitudes pour corriger les ſuppoſitions précéden-

tes ; ainſi prenant, comme j'ai dit, la différence des latitudes calculées ci-deſſus, qui eſt de 1°. 33'. 50", & la quantité 130 dont j'ai augmenté la diſtance 8920 priſe dans la premiére ſuppoſition, je preſds auſſi la différence entre la latitude trouvée dans la ſeconde ſuppoſition & la latitude obſervée, qui eſt de 29'. 54" : je fais donc cette proportion, 1°. 33'. 50" : 29'. 54" :: 130 : 42 ; j'ajoute donc 42 à 9050, ce qui donne 9092 : mais comme cette proportion n'eſt qu'approchante du vrai, & non pas géométriquement exacte, le calcul m'a fait ſçavoir qu'il faut ajouter 43 au lieu de 42, ce qui donne 9093 pour la diſtance accourcie, & prenant pour la troiſiéme obſervation la diſtance de $5769\frac{1}{2}$, on trouve une nouvelle orbite dont l'aire décrite eſt proportionnelle au temps, & les élémens ſont tels que j'ai mis ci-après.

C'eſt de cette maniére que j'ai calculé les orbites de deux autres Cométes, ſçavoir de 1706 & 1744. Comme les obſervations qui ont été faites ſur la derniére ſont plus exactes que celles qu'on a fait ſur les Cométes de 1706 & 1707, M. CASSINI DE THURY m'ayant fait l'honneur de me les communiquer, j'ai calculé les lieux de la Cométe dans l'orbite parabolique pour les inſtans de toutes les obſervations ; la différence entre le calcul & l'obſervation ne monte jamais à une minute & demi, comme on peut voir par la table.

Quoiqu'il ſoit très-vraiſemblable que le mouvement des Cométes ſe fait dans des ellipſes très-excentri-

ques & non dans des paraboles, cependant comme elles ne ſont viſibles que pendant un petit eſpace de temps, il eſt très-difficile de pouvoir déterminer les temps de leurs révolutions, il faudroit pour cela s'aſſurer de certaines conditions, que peut-être on ne peut attendre d'un ſi petit nombre d'obſervations: néanmoins j'eſpére qu'on ne trouvera pas mauvais que j'inſére ici deux Problêmes, qui y ont rapport, & qui pourront être peutêtre de quelque uſage; ſurtout puiſqu'ils ſont applicables auſſi aux Planetes.

PROBLÈME II.

SUPPOSE' qu'on puiſſe connoître la diſtance périhelie AS (fig. 61.) *d'un corps qui ſe meut dans une ellipſe*, (*le Soleil étant ſuppoſé en* S,) *& une autre diſtance quelconque* SP *avec l'angle* ASP, *trouver le temps de la révolution & déterminer l'ellipſe.*

SOLUTION.

QU'ON prenne ſur l'axe prolongé la partie SB égale à SP, & du côté du point A oppoſé à celui de B, AD égale à AB; qu'on tire DP & la diviſant également en deux au point M, ſi de ce point on éléve la perpendiculaire MF, le point F ou elle coupe l'axe AS ſera l'autre foyer de l'ellipſe cherchée. Car par la conſtruction FP = FD, & SP = SB, donc FP + SP = FD + SB = FS + SD + SB = FS + 2SD + 2AD = FS + 2AS, ainſi FP + SP = FS + 2AS, qui eſt la propriété connue de l'ellipſe. On connoît donc la poſition des

deux foyers, & l'axe de l'ellipſe, par conſéquent on peut la décrire; & puiſque dans différentes ellipſes les temps périodiques ſont comme les racines quarrées des cubes des premiers axes, on connoîtra le temps de la révolution. *C. Q. F. T.*

COROLLAIRE.

IL ſuit donc de ce Problême, que ſi on trouve qu'une Cométe lorſqu'elle eſt éloignée de ſon périhelie ne décrit point la même courbe qu'elle décrivoit dans le temps du périhelie; en cherchant quelle doit être la diſtance de la Cométe au Soleil & l'angle depuis le périhelie pour répondre à une obſervation exacte; on pourra déterminer l'ellipſe qu'elle décrit, & le temps de ſa révolution.

PROBLÈME III.

SUPPOSÉ qu'on puiſſe connoître pour deux inſtans donnés les diſtances au ſoleil d'un corps qui ſe meut dans une ellipſe, & le rapport des vîteſſes de ſon mouvement pour ces deux inſtans, déterminer l'ellipſe & le temps de la révolution.

SOLUTION.

SOIT une orbe elliptique ABD, (*fig.* 62.) le grand axe AD, la moitié du petit axe OB, les foyers en S & F, le Soleil dans le foyer S; & ſoient connues deux diſtances quelconques, SP, SN; ſoit U la vîteſſe du corps au point P, u ſa vîteſſe en N, & *v* celle en B. Maintenant par ce qui a été démontré

par M. DE MOIVRE, on a, $U . v :: \sqrt{FP} . \sqrt{SP}$, & $v . u :: \sqrt{SN} . \sqrt{FN}$; en multipliant donc terme par terme ces deux proportions, on trouve, $UU . uu :: FP \times SN . SP \times FN :: \frac{SN}{SP} . \frac{FN}{FP}$; or la raiſon de U à u eſt ſuppoſée connue, donc $\frac{FN}{FP}$ ſera une quantité donnée ; par conſéquent ſuppoſant $\frac{FN}{FP} = a$, on aura $FN = a \times FP$, mais l'ellipſe donne $SN + NF = SP + PF$, ce qui donne $FP = \frac{SP - SN}{a - 1}$, & $FP + SP = AD = \frac{a \times SP - SN}{a - 1}$. Ayant auſſi trouvé FN, des centres P, N, & des rayons PF, NF, décrivant deux arcs de cercle, le point d'interſection F ſera l'autre foyer ; mais la poſition des deux foyers & l'axe étant donnés, l'ellipſe & le temps de la révolution ſont déterminés. *C. Q. F. T.*

Les Elémens de l'orbite décrite par la Cométe de l'année 1706.

EN prenant deux obſervations comme elles ſont marquées dans les Mémoires de l'Académie, ſçavoir celle du 20 Mars à $11^h . 38'$. temps vrai, la Cométe étant dans $1°. 49'. 48''$ ♏ avec une latitude boréale de $49°. 44'$; & celle du 13 Avril à $9^h . 21'$, la Cométe étant dans $23°. 22'. 48''$ ♍ avec une latitude boréale de $5°. 26'. 58''$; en ſuppoſant la diſtance accourcie de

la Cométe au Soleil au temps de la premiére obſervation de 11722½ parties dont le rayon de l'orbite Terreſtre contient 10000, & de 16049 au temps de la ſeconde obſervation, on trouve les élémens ſuivans.

Le nœud aſcendant dans 13°. 12'. 26" ♎.

L'inclinaiſon de l'orbite au plan de l'Ecliptique de 55°. 5'. 12".

Le lieu du périhelie dans l'orbite, 12°. 14'. 30" ♓.

Le lieu du périhelie dans l'Ecliptique, 26°. 51'. 11" ♉.

La latitude Boréale du Périhélie, 44°. 40'. 48".

Le Logarithme de la diſtance périhelie, 9,626327.

Le temps du périhelie le 30 Janvier à 7ʰ. 7'. temps moyen à Paris.

Le mouvement de la Cométe direct.

Ces élémens donnent pour le 1. Avril à 8ʰ. 18'. temps vrai la longitude de la Cométe de 1°. 53'. 17". ♎, la longitude obſervée étoit de 1°. 54'. 18", la différence eſt de 1'. 1"; & la latitude boréale de 20°. 47'. 5", la latitude obſervée étoit de 20°. 46'. 18", la différence eſt de 47".

Les

Les Elémens de l'orbite décrite par la Cométe de l'année 1707.

En prenant l'obſervation du 25 Novembre à 20^{h}. 44′. temps moyen, la Cométe étant dans 4°. 46′. 20″. ♒ ſans latitude, & l'obſervation du 25 Décembre à 7^{h}. 32′, la Cométe étant dans 7°. 37′. 40″ ♒ avec une latitude Boréale de 46°. 34′. 20″; en ſuppoſant la diſtance accourcie de la Cométe au Soleil au temps de la premiére obſervation de 9093 parties dont le rayon de l'orbite Terreſtre contient 10000, & de $5769\frac{1}{2}$ au temps de la ſeconde obſervation, on trouve les élémens ſuivans.

Le nœud deſcendant dans 22°. 46′. 35″ ♉.

L'inclinaiſon de l'orbite de 88°. 37′. 53″.

Le lieu du périhelie dans l'orbite, 19°. 51′. 14″ ♓.

Le lieu du périhelie dans l'Ecliptique, 23°. 28′. 33″ ♉.

La latitude Boréale du Périhelie, 27°. 4′. 10″.

Le Logarithme de la diſtance périhelie, 9, 934228.

Le temps du périhelie le 11 Décembre à 22^{h}. 38′. temps moyen à Paris.

Le mouvement de la Cométe direct.

Ces élémens donnent pour l'obſervation du 10 Décembre à 7^{h}. 13′. 20″. temps moyen la longitude de la Cométe de 8°. 33′. 10″. ♒, la longitude obſervée étoit de 8°. 33′. 40″, la différence eſt de 30″; & la latitude boréale de 39°. 35′. 10″, elle étoit obſervée de 39°. 36′, la différence eſt de 50″.

Si au lieu de l'obſervation du 25. Novembre on ſe ſert de celle qui eſt marquée dans les Mémoires de l'Académie pour le 29. du même mois, prenant encore comme ci-deſſus l'obſervation du 25. Décembre, & ſuppoſant pour la premiére la diſtance accourcie de la Cométe de 8867, & de 5770½ pour la ſeconde, on trouve les Elémens ſuivans.

Le nœud deſcendant dans 22°. 49'. 23" ♉.

L'inclinaiſon de l'orbite de 88°. 37'. 8'.

Le lieu du Périhelie dans l'orbite, 19°. 57'. 50" ♊.

Le lieu du Périhelie dans l'Ecliptique, 23°. 31'. 50" ♉.

La latitude Boréale du Périhelie de 27°. 7'. 56".

Le logarithme de la diſtance Périhelie, 9,9341187.

Le temps du Périhelie le 12. Décembre à 0ʰ. 8'. temps moyen.

Ces Elémens donnent pour le temps de l'obſervation du 10. Décembre la longitude de la Cométe de 8°. 34'. 10". ♒ avec une latitude Boréale de 39°. 34'. 35". la longitude obſervée étoit de 8°. 33'. 40", ou plutôt de 8°. 33'. 50", & la latitude obſervée étoit de 39°. 36', ou plutôt de 39°. 35'. 20", comme il réſulte des aſcenſions droites & déclinaiſons marquées dans les Mémoires de l'Académie, ce qui donne 20" pour la différence en longitude, & 45" pour la différence en latitude.

Les Elémens de l'orbite de la Cométe de l'année 1744.

En prenant l'obſervation du 7 Janvier, au temps de laquelle la longitude de la Cométe étoit de 12°. 3′. 21″. ♈, & ſa latitude Boréale de 17°. 51′. 17″; & celle du 25 Février, au temps de laquelle la longitude de la Cométe étoit de 9°. 54′. 10″ ♌; & ſa latitude boréale de 14°. 40′. 36″; en ſuppoſant la diſtance accourcie de la Cométe au Soleil au temps de la premiére des deux obſervations de 134693 parties dont le demi-diamétre de l'orbite Terreſtre contient 100000, & de 19798 au temps de la ſeconde obſervation, on trouve les Elémens ſuivans.

Le nœud deſcendant dans 15°. 40′. 53″ ♉.

L'inclinaiſon de l'orbite de 46°. 50′. 5″.

Le lieu du Périhelie dans l'orbite, 17°. 00′. 00″ ♎.

Le lieu du périhelie dans l'Eclyptique, 25°. 9′. 47″ ♎.

La latitude Boréale du périhelie de 20°. 29′. 27″.

Le logarithme de la diſtance périhelie, 9, 349749.

Le temps du périhélie le 1. Mars à 8ʰ. 30′ temps moyen à Paris.

Le mouvement de la Cométe direct, quoiqu'il ait paru pendant tout le temps retrograde.

Comparaiſon des lieux calculés avec les lieux obſervés.

Jours des mois.	Temps vrai.	Longitude obſervée.	Longitude calculée.	Différence.	Latitude obſervée.	Latitude calculée.	Différence
1743.							
Déc. 21.	6 h. 58′	♈. 22°. 23′. 4″.	♈. 22°. 22′. 12″.	— 0′. 52″.	16°. 18′. 58″. B.	16°. 19′. 23″. B.	+ 0′. 25″.
30.	5. 54½	16. 29. 41.	16. 28. 40.	— 1. 1.	17. 12. 57.	17. 12. 57.	0. 0
31.	10. 39.	15. 45. 58.	15. 46. 0.	+ 0. 2.	17. 19. 29.	17. 19. 10.	— 0. 19.
1744.							
Janvier 1.	5. 41.	15. 19. 30.	15. 18. 10.	— 1. 20.	17. 23. 22.	17. 23. 2.	— 0. 20.
3.	5. 27½	14. 11. 16.	14. 10. 30.	— 0. 46.	17. 32. 40.	17. 32. 42.	+ 0. 2.
4.	5. 21.	13. 38. 1.	13. 37. 49.	— 0. 12.	17. 37. 33.	17. 37. 24.	— 0. 9.
5.	5. 14½	13. 5. 48.	13. 5. 33.	— 0. 15.	17. 42. 21.	17. 42. 3.	— 0. 18.
6.	5. 8.	12. 34. 17.	12. 34. 6.	— 0. 11.	17. 46. 27.	17. 46. 34.	+ 0. 7.
7.	5. 1½	12. 3. 21.	12. 3. 16.	— 0. 5.	17. 51. 17.	17. 51. 1.	— 0. 16.
8.	4. 55.	11. 33. 9.	11. 33. 12.	+ 0. 3.	17. 55. 46.	17. 55. 23.	— 0. 23.
11.	8. 59.	9. 59. 53.	10. 1. 21.	+ 1. 28.	18. 9. 29.	18. 9. 1.	— 0. 28.
12.	9. 11½	9. 32. 26.	9. 33. 11.	+ 0. 45.	18. 14. 0.	18. 13. 19.	— 0. 41.
13.	7. 53.	9. 6. 40.	9. 7. 14.	+ 0. 34.	18. 18. 34.	18. 17. 21.	— 1. 13.
16.	8. 42.	7. 47. 16.	7. 47. 13.	— 0. 3.	18. 30. 45.	18. 30. 2.	— 0. 43.
17.	7. 40½	7. 21. 45.	7. 22. 53.	+ 1. 8.	18. 35. 4.	18. 33. 57.	— 1. 7.
18.	7. 0.	6. 57. 34.	6. 58. 20.	+ 0. 46.	18. 38. 54.	18. 38. 1.	— 0. 53.
Février 7.	7. 55.	☽. 28. 18. 16.	☽. 28. 18. 42.	+ 0. 26.	19. 54. 10.	19. 54. 22.	+ 0. 12.
10.	7. 17.	26. 33. 14.	26. 33. 45.	+ 0. 31.	19. 57. 53.	19. 58. 7.	+ 0. 14.
11	6. 54½	25. 56. 8.	25. 55. 6.	— 1. 2.	19. 57. 41.	19. 57. 51.	+ 0. 10.
12.	5. 51.	25. 14. 7.	25. 15. 10.	+ 1. 3.	19. 56. 32.	19. 56. 40.	+ 0. 8.
13.	5. 39.	24. 31. 52.	24. 30. 43.	— 1. 9.	19. 54. 39.	19. 55. 9.	+ 0. 30.
15.	6. 46.	22. 49. 41.	22. 50. 18.	+ 0. 37.	19. 44. 11.	19. 44. 13.	+ 0. 2.
16.	6. 19.	21. 56. 25.	21. 55. 58.	— 0. 27.	19. 36. 38.	19. 36. 1.	— 0. 37.
17.	6. 30½	20. 57. 41.	20. 57. 7.	— 0. 34.	19. 24. 34.	19. 25. 44.	+ 1. 10.
18.	6. 3.	19. 54. 50.	19. 54. 11.	— 0. 39.	19. 11. 21.	19. 11. 38.	+ 0. 17.
23.	5. 34.	13. 15. 17.	13. 13. 48.	— 1. 29.	16. 41. 5.	16. 42. 6.	+ 1. 1.
25.	5. 22.	9. 54. 10.	9. 54. 9.	— 0. 1.	14. 40. 36.	14. 40. 35.	— 0. 1.
29.	18 43.	2. 32. 16.	2. 32. 43.	+ 0. 27.	6. 32. 29.	6. 32. 47.	+ 0. 18.

Les Elémens de l'orbite décrite par la Cométe de l'année 1748.

En ſuivant la même méthode & me ſervant des obſervations faites à l'Obſervatoire Royal, j'ai trouvé pour l'orbite de cette Cométe les Elémens ſuivans.

Le nœud deſcendant dans 22°. 51′. 20″ m.

L'inclinaiſon de l'orbite de 85°. 27′. 50″.

Le lieu du Périhelie dans l'orbite, 4°. 47′. 55″ m.

Le lieu du périhelie dans l'Ecliptique, 21°. 22′. 44″ m.

La latitude Boréale du périhelie de 17°. 59′. 54″.

Le logarithme de la diſtance périhelie, 9, 9251189.

Le temps du périhelie le 28 Avril à 23 h. 55′. temps moyen à Paris.

Le mouvement de la Cométe rétrograde.

FIN.

TABLE

De ce qui eſt contenu dans cet Ouvrage.

PREMIERE PARTIE.

DE la Réduction des Intégrales aux Logarithmes. Pag. 13
Des Meſures des Rapports. 14

SECONDE PARTIE.

De la Réduction des Intégrales aux arcs de Cercle. 51
Des Meſures des Angles. 53
De la Réduction des Différentielles compoſées. 66

TROISIEME PARTIE.

De la Réduction des Intégrales aux Logarithmes & aux arcs de Cercle pris enſemble. 71
Des Différentielles binomes. 102
Autre méthode pour les Différentielles binomes. 114
Des Différentielles trinomes. 194
Des Différentielles quadrinomes & autres. 232

QUATRIEME PARTIE.

Application de la Théorie. 239
Uſage de la Théorie dans la rectification des courbes. 240
Uſage de la Théorie dans la Quadrature des courbes. 255
Uſage de la Théorie dans la ſolution des Problèmes de Méchanique. 272
Théorie du mouvement des Comètes. 425

Fin de la Table.

Extrait des Regiſtres de l'Académie Royale des Sciences.

Du 22. Mars 1747.

MESSIEURS MARALDI & DE LA CAILLE, qui avoient été nommés pour examiner un Mémoire *de D. C. Walmeſley*, ſur la *Théorie du mouvement des Cométes*, en ayant fait leur rapport; l'Académie a jugé que cet Ouvrage étoit très-clair & très-méthodique, & qu'il marquoit dans l'Auteur une grande connoiſſance non ſeulement de la Théorie des Cométes & du calcul Aſtronomique, mais encore des autres parties de l'Aſtronomie Phyſique, en foi de quoi j'ai ſigné le préſent Certificat: A Paris, ce dix-neuviéme Avril 1747.

GRANDJEAN DE FOUCHY,

Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Sciences.

Extrait des Regiſtres de l'Académie Royale des Sciences.

Du 21. Août 1748.

MESSIEURS CLAIRAULT & D'ALEMBERT, qui avoient été nommés pour examiner un Ouvrage de *D. C. Walmeſley*: intitulé, *Analyſe des Meſures des Rapports & des Angles, &c.* en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé que cet Ouvrage étoit fait avec beaucoup d'intelligence & de clarté, qu'il marque dans l'Auteur une connoiſſance très-étendue du calcul infinitéſimal, & qu'il ſera très-utile à ceux qui voudront s'inſtruire de ce Calcul. En foi de quoi j'ai ſigné le préſent Certificat; à Paris, ce 13 Septembre 1748.

GRANDJEAN DE FOUCHY,

Sécrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Sciences.

APPROBATION.

J'Ai lu par l'Ordre de Monſeigneur le Chancelier un Manuſcrit intitulé, *Analyſe des Meſures des Rapports & des Angles, &c.* & j'ai cru cet Ouvrage très digne de l'impreſſion. A Paris ce 16 Septembre 1748.

CLAIRAUT.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE : A nos Amés & Féaux Conſeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conſeil, Prevôts de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Juſticiers qu'il appartiendra, SALUT : notre amé GABRIEL-FRANÇOIS QUILLAU, Pere, Imprimeur-Libraire à Paris, Ancien Adjoint de ſa Communauté, Nous a fait expoſer qu'il déſireroit imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre, *Analyſe des Meſures, des Rapports & des Angles*, ou *Reduction des Intégrales aux Logarithmes & aux Arcs de Cercle*, s'il nous plaiſoit lui accorder nos lettres de Permiſſion pour ce néceſſaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'expoſant, nous lui avons permis & permettons par ces Préſentes d'imprimer ledit Ouvrage, en un ou pluſieurs volumes, & autant de fois que bon lui ſemblera ; & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de trois années conſécutives, à compter du jour de la date deſdites Préſentes. Faiſons déſenſes à tous Libraires, Imprimeurs & autres perſonnes de quelque qualité & condition qu'elles ſoient d'en introduire d'impreſſion étrangére dans aucun lieu de notre obéiſſance ; à la charge que ces Preſentes ſeront enregiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreſſion dudit Ouvrage ſera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractéres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modéle ſous le contre-ſcel deſdites Préſentes ; que l'Impétrant ſe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; qu'avant de l'expoſer en vente le Manuſcrit qui aura ſervi de copie à l'impreſſion dudit Ouvrage ſera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher féal Chevalier le ſieur DAGUESSEAU, Chancelier de France,

ce, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France ; le tout à peine de nullité des Préſentes. Du contenu deſquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expoſant & ſes ayans cauſes pleinement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu'il leur ſoit fait aucun trouble ou empêchement : voulons qu'à la copie deſdites Préſentes, qui ſera imprimées tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi ſoit ajoutée comme à l'original ; commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceſſaires ſans demander autre permiſſion, & nonobſtant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires : Car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris le vingt-neuviéme jour du mois de Novembre l'an de grace mil ſept quarante-huit, & de notre Régne le trente-quatriéme.

PAR LE ROY en ſon Conſeil.

SAINSON.

Regiſtré ſur le Regiſtre XII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, Num. 48. *fol.* 40. *conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du* 28. *Février* 1723. *A Paris le* 3. *Décembre* 1748.

G. CAVELIER, *Syndic.*

Fautes à corriger dans la Matière.

PAge 39. ligne 14. $\frac{v}{e}$ liſez $\frac{v}{c}$. Pag. 72. lig. 21. HD . OD + HO liſ. OD + HO . HD. Pag. 79. lig. 15. = 1 liſ. — 1. Pag. 109. lig. 11. $\frac{D}{nf}\left\{\frac{CP}{AP}\right\}$ liſ. $\frac{D}{nf}\sqrt{\frac{f}{e}}\left\{\frac{CP}{AP}\right\}$. Pag. 132. lig. 13. $\frac{x^0}{1+x^\lambda}$ liſ. $\frac{x^0}{1+x^\lambda}=$. Pag. 137. lig. 11. $Cfxx$ liſ. $Cffxx$. Pag. 140. lig. 6. 7. & 16. z liſ. x. Pag. 141. lig. 2. $c+\sqrt{cc=1}$ liſ. $c+\sqrt{cc-1}$. Pag. 143. lig. 19. $\frac{1+xx}{xx}$ liſ. $\frac{1+xx}{2x}$. Pag. 151. lig. 2. + χ(PDO) liſ. — χ(PDO). Pag. 166. lig. 3. $z^{n-1}dx$ liſ. $z^{n-1}dz$, lig. 5. $x^{0+1}dx$ liſ. $x^{0-1}dx$. Pag. 174. lig. 3. *ffgr* liſ. *ffqr*. Pag. 183. lig. dern. $R^{\mu+1}$ liſ. $R^{\mu+2}$. Pag. 204. lig. 3. $c+sz^{\frac{1}{2}n}+z^n$ liſ. $c+sz^{\frac{1}{2}n}+gz^n$. Pag. 206. lig. 1. $\frac{4Dx^{3n-1}dx}{r+sx^n+gx^{2n}}$ liſ. $\frac{4Dx^{3n-1}dx}{r+sx^{2n}+gx^{4n}}$. Pag. 210. lig. 11. $+m^{\lambda-\delta+1}\ldots-m^{\lambda-\delta-1}$ liſ. $-m^{\lambda-\delta+1}\ldots+m^{\lambda-\delta-1}$, Pag. 214. lig. 10. *étant* liſ. θ *étant*.

Fautes à corriger dans les Tables.

Pag. 222. lig. 3. $+\frac{3Dx\overline{fk-el}}{ng}$ ③ liſ. $-\frac{3Dx\overline{fk-el}}{ng}$ ③. Pag. 326. & 328. lig. 4. |2| liſ. |1|. Pag. 355. lig. 4. $\frac{4Dl}{n}$ ② liſ. $\frac{3Dl}{n}$ ②. Pag. 363. lig. 7. $15nez^{2n}$ liſ. $15neez^{2n}$. Pag. 364. lig. 9. $17ne^3$ liſ. $27ne^3$. Pag. 368. lig. 3. $231nfz^n$ liſ. $231nf^3$. & lig. 13. $\sqrt[3]{-e}$ liſ. P : $\sqrt[3]{-e}$. Pag. 384. lig. dern. (CP : CO) liſ. + (CP : CO). Pag. 396. lig. pénult. (BP : BO) liſ. (AP : AO). Pag. 397. lig. 11. ↓(PBO) liſ. + ↓ (PBO). Pag. 410. lin. dern. (DP : DO) liſ. β (DP : DO).











P.L. Charpentier sc.


16
17
D
M
M
A
O
B
E
19
C
B
A
L
F
E
18
C
L
D
B
D
A
F
E
20
B
C
A
L
D
E
D
Q
E
22
D
B
F
A
P
O
F
K
G
I
H
23
C
D
E
B
F
A
P
O
G
M
H
L
K
I
Q
25
B
U
S
R
C
H
L
A P N O M Q
26
U
B
S
H
R
L
C
A N P O M Q
28
L
βB
A P O C
B
29
L
L
βB
Cβ
A P O D


30
31
32
34
35
37
38
39
41
42
44
45




47
48
50
51
53
54
55
57
58
59
61
62